

مذكره

الحجر: الدوال الحقيقية

الصف الثاني الثانوي

القسم العلمي

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠




الدوال الحقيقية ورسم الدوال

- الدوال الحقيقية
- اطراد الدوال
- العمليات على الدوال - تركيب دالتين
- الدالة الزوجية - والدوال الفردية - الدوال الأحادية
- التمثيل البياني للدوال والتحويلات الهندسية
- حل المعادلات ومتباينات القيمة المطلقة
- مستوى توجيه الرياضيات
- د. عادل إمام

مجال الدالة




- * إذا كانت S ، V مجموعتين جزئيتين غير خاليتين من المجموعة C فإن العلاقة من S إلى V تسمى دالة إذا ارتبط كل عنصر من S بعنصر واحد فقط من V ، تسمى S مجال الدالة ، V المجال المقابل لها
- * مدى الدالة هو مجموعة صور عناصر المجال ، وهو مجموعة جزئية من المجال المقابل.
- * العلاقة لا تمثل دالة إذا وجد مستقيم واحد على الأقل يوازي محور الصادات ويقطع الشكل البياني للدالة فى أكثر من نقطة

مثال ١- أى من الأشكال يمثل دالة وأى لا يمثل دالة



لا يمثل دالة لأن كل قيمة حقيقية للمتغير S يناظرها قيمتان مختلفتان V	يمثل دالة لأن كل عنصر فى المجال له صورة واحدة على الأكثر	يمثل دالة لأن كل عنصر فى المجال له صورة واحدة على الأكثر
---	--	--

مثال ٢- بين أى من الأشكال البيانية يمثل دالة أيها لا



لا يمثل دالة لأن يوجد خط مستقيم // محور الصادات يقطع الشكل البياني فى أكثر من نقطة	يمثل دالة لأن كل خط رأسى يقطع المنحنى فى نقطة واحدة على الأكثر	لا يمثل دالة لأنه يوجد خط رأسى عند النقطة ١ \in المجال يقطع المنحنى فى أكثر من نقطة
--	--	---

تحديد مجال الدالة الحقيقية

[١] مجال الدالة كثيرة الحدود: هو \mathbb{R} مالم تكن معرفة على مجموعة جزئية منها

[٢] مجال الدالة الكسرية: هو \mathbb{R} - مجموعة أصفار المقام

[٣] مجال الدالة الجذرية: إذا كانت: $\sqrt[n]{f(x)}$ (س) حيث $n \in \mathbb{N}^+$

(!) عندما: (n) عدد فردى فإن مجال الدالة = \mathbb{R}

(!!) عندما (n) عدد زوجى فإن مجال الدالة هو مجموعة قيم s بشرط $f(s) \geq 0$.

مثال ١: عين مجال الدالة: $f(x) = x^3 - 5x + 4$

الدالة كثيرة الحدود: \therefore مجال الدالة هو \mathbb{R}

مثال ٢: عين مجال الدالة: $f(x) = \frac{x^3 - 9x}{x^2 - 9}$

الدالة الكسرية الجبرية: مجالها = $\mathbb{R} - \{ \text{أصفار المقام} \}$

بوضع المقام = 0 $\Leftrightarrow x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) = 0 \Rightarrow x = 3, -3$

\therefore مجال الدالة = $\mathbb{R} - \{ -3, 3 \}$

مثال ٣: عين مجال الدالة: $f(x) = \sqrt{x^3 - 5x + 3}$

الدالة على صورة دالة جذرية: $\sqrt{f(x)}$ (س)

مجالها جميع الأعداد الحقيقية التى تجعل $f(x) \geq 0$ (ما تحت الجذر ≥ 0 صفر)

مجال الدالة = $\{ x : x \geq 3, x \geq 0 \}$

$= \{ x : x \geq 3 \} = [3, \infty)$

مثال ٤: عين مجال الدالة: $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 5x + 6}$

الدالة الكسرية الجبرية: مجالها = $\mathbb{R} - \{ \text{أصفار المقام} \}$

بوضع المقام = 0 $\Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2, 3$

\therefore مجال الدالة = $\mathbb{R} - \{ 2, 3 \}$

مثال ٥: عين مجال الدالة : $f(x) = \sqrt{x+8}$

الدالة على صورة دالة جذرية : $f(x) = \sqrt{x+8}$

مجالها جميع الأعداد الحقيقية مجال الدالة هو \mathbb{R}




مثال ٦: عين مجال الدالة : $f(x) = \frac{x^2}{x^2+4}$

الدالة الكسرية الجبرية : مجالها $\mathbb{R} - \{ \text{أصفار المقام} \}$

بوضع المقام = ٠ $\Leftrightarrow x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -4 \Leftrightarrow$ ليس لها حل فى \mathbb{R}

\therefore مجال الدالة هو \mathbb{R}

مثال ٧: عين مجال ومدى كل من الدوال الممثلة



المجال = $[-2, 2]$
المدى = $[-2, 3]$

المجال = $\mathbb{R} - \{0\}$
المدى = $[1, 3]$

المجال = \mathbb{R}
المدى = $\mathbb{R} - [1, 1]$

العمليات على الدوال

إذا كانت : f, g دالتين مجالهما M, N على الترتيب فإن:

• $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x) \Leftrightarrow$ حيث مجال $(f \pm g)$ هو $M \cap N$

• $(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) \Leftrightarrow$ حيث مجال $(f \times g)$ هو $M \cap N$

• $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \Leftrightarrow$

حيث مجال $\left(\frac{f}{g}\right)$ هو $M \cap N - \text{مجموعة أصفار } g$

مثال ٨ : عين مجال د(س) = $\sqrt{3 - س} + \sqrt{س - ٥}$

الحل

مجال الدالة $\sqrt{3 - س} = م١$ $م١ = \{س : س \geq ٣ - س, س \geq ٥\}$

مجال الدالة $\sqrt{س - ٥} = م٢$ $م٢ = \{س : س \geq ٥ - س, س \geq ٥\}$

مجال الدالة $= م١ \cap م٢ = \{س : س \geq ٥, س \leq ٣\} = [٥, ٣]$

مثال ٩ : عين مجال د(س) = $\frac{\sqrt{٢ - س}}{٣ - س}$

الحل

مجال البسط $م١ = \{س : س \geq ٢ - س, س \geq ٣\}$

مجال المقام $م٢ = ٣ - س$

مجال الدالة $= م١ \cap م٢ - \{أصفار المقام\}$

$= \{س : س \geq ٢ - س, س \geq ٣\} - \{٣\} = [٣, \infty) - \{٣\}$

مثال ١٠ : عين مجال د(س) = $\frac{س + ٥}{١ + س}$

الحل

مجال البسط $م١ = س$ ، مجال المقام $م٢ = \{س : س \geq ٢ + س, س < ٠\}$

مجال الدالة $= \{س : س \geq ١ - س, س \geq ١\} = [١, \infty)$

مثال ١١ : عين مجال د(س) = $\frac{١}{\sqrt{٨ - س^٢}} + \sqrt{٢ - س}$

الحل

$م١ = \{س : س \geq ٢ - س, س \leq ٢\} = [٢, ٢]$

$م٢ = \{س : س \geq ٨ - س^٢, س < ٠\} = [٤, \infty)$

مجال الدالة $= م١ \cap م٢ = [٢, ٤] = [٢, ٤] \cap [٤, \infty)$

مثال ١٢ : عين مجال د(س) = $\sqrt{\frac{س + ٣}{س + ٢}}$


(٤)

منتدك توجبه الرياضيات

إعداد / عادل إدوار

الحل

مجال الدالة هو $[-2, 1] \cup [1, 3]$
 $= [-2, 3]$



تركيب دالتين

إذا كانت : د ، ر دالتين فإن تركيب الدالة د مع الدالة ر ينتج دالة جديدة يرمز لها بالرمز $(د \circ ر)$ وتقرأ د تركيب ر أو (د بعد ر) ويكون $(د \circ ر)(س) = د(ر(س))$ وتطبق قاعدة الدالة ر أولاً ثم قاعدة الدالة د

❖ لتعيين مجال الدالة : د \circ ر نتبع الخطوات التالية

(١) نوجد م_١ = مجال الدالة ر(س)

(٢) نوجد م_٢ = قيم س التى تجعل ر(س) فى مجال د

(٣) نوجد م_١ \cap م_٢ وهو مجال د \circ ر

❖ $(د \circ ر)(س) \neq (ر \circ د)(س)$ عملية تركيب دالتين ليست عملية إبدالية

مثال ٣١ : إذا كانت : د(س) = $س^٢ + ٣$ ، ر(س) = $س + ١$ فأوجد كلاً من التركيبات

① $(د \circ ر)(س)$ ② $(ر \circ د)(س)$ ③ $(د \circ د)(س)$

الحل

$$\textcircled{1} (د \circ ر)(س) = د(ر(س)) = (س + ١)^٢ + ٣ = ٥ + ٢س + س^٢$$

$$\textcircled{2} (ر \circ د)(س) = ر(د(س)) = ر(س^٢ + ٣) = (س^٢ + ٣) + ١ = ١ + س^٢ + ٣ = ٤ + س^٢$$

$$\textcircled{3} (د \circ د)(س) = د(د(س)) = د(س^٢ + ٣) = (س^٢ + ٣)^٢ + ٣ = ١٠ + ٦س^٢ + س^٤$$

$$١ + ٩ + ٦س + ٣س^٢ + ٣ = ١٠ + ٦س + ٣س^٢ + ٣ = ١٣ + ٦س + ٣س^٢$$


$$١٠ + ٦س + ٣س^٢ + ٣ = ١٣ + ٦س + ٣س^٢$$

[نلاحظ من المثال أن : $(د \circ ر)(س) \neq (ر \circ د)(س)$]

$$\textcircled{4} (د \circ د)(س) = د(د(س)) = د(س^٢ + ٣) = (س^٢ + ٣)^٢ + ٣ = ١٠ + ٦س + ٣س^٢ + ٣ = ١٣ + ٦س + ٣س^٢$$

$$١٠ + ٦س + ٣س^٢ + ٣ = ١٣ + ٦س + ٣س^٢$$


اطراد الدوال



(١) يقال للدالة d إنها تزايدية فى الفترة $[a, b]$

إذا كان : $s_1 < s_2 \Rightarrow d(s_1) < d(s_2)$


لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$



(٢) يقال للدالة d إنها تناقصية فى الفترة $[a, b]$

إذا كان : $s_1 < s_2 \Rightarrow d(s_1) > d(s_2)$

لكل $s_1, s_2 \in [a, b]$






(٣) يقال للدالة d إنها ثابتة فى الفترة $[a, b]$

إذا كان : $d(s) = k$ مقدار ثابت

لكل $s \in [a, b]$

مثال ١٦ : من الرسم البيانى اذكر المجال والمدى وابحث اطرادها



المجال = $[-2, 2]$

المدى = $[-2, 2]$

الدالة تناقصية فى $[-2, 0]$

الدالة تزايدية فى $[0, 2]$

المجال = $\{-3, 3\}$

المدى = $[1, 2]$

الدالة تناقصية فى $[-3, 0]$

الدالة ثابتة فى $[0, 3]$




المجال = \mathbb{R}

المدى = $[-1, 1]$

الدالة تزايدية فى $[-1, 0]$

الدالة تزايدية فى $[0, 1]$

مثال ١٧ - عین مجال ومدى كل من الدوال الممثلة



المجال $[-2, 2]$

المدى $[-1, 1]$

الدالة تزايدية فى $[-2, 0]$

الدالة تناقصية فى $[0, 2]$

المجال $[-2, 2]$

المدى $[-1, 1]$

الدالة تناقصية فى $[-2, 0]$

الدالة ثابتة فى $[0, 2]$

المجال \mathbb{R}

المدى $[-1, 0]$

الدالة تزايدية فى $[-2, 0]$

الدالة تناقصية فى $[0, 2]$

الدالة الزوجية والدالة الفردية

(١) إذا كان $f(-x) = f(x)$ تكون الدالة زوجية

ويكون منحناها متماثلاً حول محور الصادات

مثل : $f(x) = x^2$ ، $f(x) = x^4$ ، $f(x) = \cos x$ ، $f(x) = \sin^2 x$

(٢) إذا كان $f(-x) = -f(x)$ تكون الدالة فردية

ويكون منحناها متماثلاً حول نقطة الأصل

مثل : $f(x) = x$ ، $f(x) = x^3$ ، $f(x) = \sin x$ ، $f(x) = \cos x$

(٣) معظم الدوال لزوجية ولا فردية إذا كانت : $f(-x) = f(x)$ أو $f(-x) = -f(x)$

(٤) عند بحث نوع الدالة f يجب تحقق شرط انتماء العنصرين x ، $-x$ إلى المجال

(٥) $f(x) = \sqrt{x}$ تكون زوجية إذا كان \sqrt{x} عدد زوجي ، فردية إذا كان \sqrt{x} عدد فردي

(٦) $f(x) = x^2$ ، $f(x) = x^4$ ، $f(x) = \cos x$ ، $f(x) = \sin^2 x$

(٥) إذا كان : الدالة فردية $f(x)$ أو الدالة زوجية $f(x)$ فإن $f(x) \pm f(x)$ دالة زوجية

، $f(x) \pm f(x)$ دالة فردية ، $f(x) \pm f(x)$ دالة ليست زوجية ولا فردية

منتهى توجبه الرياضيات

(٨)

إعداد / عادل إدوار

مثال ١٨- ابحث نوع الدوال الآتية من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك:

$$\textcircled{1} \text{ د (س) } = \frac{\text{جا س}}{\text{س}} \quad \textcircled{2} \text{ د (س) } = \text{س}^2 \text{ جا س} + \text{س}$$

$$\textcircled{3} \text{ د (س) } = \text{س جتا س ظا س} + \text{جا}^2 \text{ س}$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ د (-س) } = \text{جا} (-\text{س}) = \frac{-\text{جا س}}{-\text{س}} = \frac{\text{جا س}}{\text{س}} = \text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة زوجية}$$

$$\textcircled{2} \text{ د (-س) } = (-\text{س})^2 \text{ جا} (-\text{س}) + (-\text{س}) = \text{س}^2 \text{ جا س} - \text{س} = \text{س}^2 \text{ جا س} - \text{س}$$

$$= -\text{س}^2 \text{ جا س} + \text{س} = -\text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة فردية}$$

$$\textcircled{3} \text{ د (-س) } = (-\text{س}) \text{ جتا} (-\text{س}) \text{ ظا} (-\text{س}) + [\text{جا} (-\text{س})]^2 =$$

$$= -\text{س} \text{ جتا س ظا س} + [\text{جا س}]^2 =$$

$$= \text{س} \text{ جتا س ظا س} + \text{جا}^2 \text{ س} = \text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة زوجية}$$

مثال ١٩- ابحث نوع الدوال الآتية من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك:

$$\textcircled{1} \text{ د (س) } = \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} + 1} \quad \textcircled{2} \text{ د (س) } = \frac{\text{س}^5}{\text{س}} + \text{س} \times \text{س} (0) = \text{س}^4 + \text{س}^2$$

$$\textcircled{3} \text{ د (س) } = \frac{1}{\text{س} - 1} \left(\frac{\text{س} - 1}{\text{س} + 1} \right)^2 + \frac{1}{\text{س} - 1} \left(\frac{\text{س} + 1}{\text{س} - 1} \right)^2$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ د (-س) } = \frac{(-\text{س})^2 \text{ جا}^3 (-\text{س})}{(-\text{س}) + 1} = \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} - 1} = \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} - 1} \times \frac{\text{س} - 1}{\text{س} - 1} =$$

$$= \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} - 1} \times \frac{\text{س} - 1}{\text{س} - 1} = \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} - 1} \times \frac{\text{س} - 1}{\text{س} - 1} = \frac{\text{س}^2 \text{ جا}^3 \text{ س}}{\text{س} - 1} \times \frac{\text{س} - 1}{\text{س} - 1} = \text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة ليست زوجية ولا فردية}$$

$$\textcircled{2} \text{ د (-س) } = \frac{(-\text{س})^5}{(-\text{س})} + (-\text{س}) \times (-\text{س}) (0) = \frac{\text{س}^5}{\text{س}} + \text{س}^2 = \text{س}^4 + \text{س}^2 = \text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة زوجية}$$




$$\therefore \text{د (س) } = \text{د (-س)}$$

$$\textcircled{3} \text{ د (-س) } = \frac{1}{(-\text{س}) - 1} \left(\frac{(-\text{س}) - 1}{(-\text{س}) + 1} \right)^2 + \frac{1}{(-\text{س}) - 1} \left(\frac{(-\text{س}) + 1}{(-\text{س}) - 1} \right)^2 =$$

$$= \frac{1}{-\text{س} - 1} \left(\frac{\text{س} + 1}{\text{س} - 1} \right)^2 + \frac{1}{-\text{س} - 1} \left(\frac{\text{س} - 1}{\text{س} + 1} \right)^2 = \text{د (س)} \quad \therefore \text{الدالة زوجية}$$

مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثـ ٢٠ـ الـ حدد من الرسم ما إذا كانت الدالة زوجية أم فردية أم غير ذلك



المجال = ح
المنحنى متماثل حول نقطة الأصل
∴ الدالة فردية


المجال = $[-3, \infty)$
المنحنى ليس متماثل حول محور
الصادات ولا حول نقطة الأصل
∴ الدالة ليست زوجية ولا فردية

المجال = ح
المنحنى متماثل حول محور
الصادات ∴ الدالة زوجية

مثـ ٢١ـ الـ ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر

نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : د(س) = $\begin{cases} 2-s, & s \leq 0 \\ s-2, & s > 0 \end{cases}$

الحـ



س - ٢ : س ≤ ٠				س - ٢ : س > ٠			
س	٢	١	٠	س	٠	١	٢
د(س)	٠	١	٢	د(س)	٢	١	٠


المجال ح ، المدى = $[-2, \infty)$

الدالة متناقصة فى $[-\infty, 0]$ ، متزايدة فى $[0, \infty)$
وهى دالة زوجية لأن منحنائها متماثل حول محور الصادات

مثـ ٢٢ـ الـ ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر

نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : د(س) = $\begin{cases} 3+s, & s < 0 \\ 3-s, & s \geq 0 \end{cases}$

الحـ



س + ٣ : س < ٠				س - ٣ : س ≥ ٠			
س	٢	١	٠	س	٠	١	٢
د(س)	٣	٤	٣	د(س)	٣	٢	١

المجال ح ، المدى = $[-3, \infty)$

الاطراد: الدالة ثابتة فى $[-\infty, 0]$ ، متزايدة فى $[0, \infty)$
، الدالة ليست زوجية ولا فردية

إعداد / عادل إدوار

(١٠)

منذى توجبه الرياضيات

الدوال الأحادية :


تعريف : الدالة د : س ← ص تسمى دالة أحادية إذا كان :

لكل $m, b \in S, m \neq b$ ، فإن : $D(m) = D(b)$ ، فإن : $m = b$

أ ، لكل $m, b \in S, m \neq b$ ، فإن : $D(m) \neq D(b)$

يعنى أنه لا يوجد عنصران فى مجال الدالة الأحادية لهما نفس الصورة

اختبار الخط الأفقى



دالة ليست أحادية

دالة أحادية

إذا وجد خط أفقى يقطع منحنى الدالة فى أكثر من نقطة فإن المنحنى لا يمثل دالة أحادية

ملاحظة: الدوال الزوجية بصفة عامة ليست دوال أحادية حيث $D(-m) = D(m)$

مثـ ٢٣ـال: فى كل من الدوال حدد ما إذا كانت الدالة أحادية أم لا مع توضيح السبب

$$\textcircled{1} D(s) = s^3 + 1 \quad \textcircled{2} D(s) = s^2 + 5 \quad \textcircled{3} D(s) = \frac{s^2 - 3}{s^3 + 2}$$

الحل

① بفرض : $m, b \in \text{مجال الدالة}$

$$\therefore D(m) = m^3 + 1, D(b) = b^3 + 1 \quad \text{وبوضع } D(m) = D(b) \quad \therefore m^3 + 1 = b^3 + 1 \quad \therefore m^3 = b^3 \quad \therefore m = b$$

الدالة أحادية

② بفرض : $m, b \in \text{مجال الدالة}$

$$\therefore D(m) = m^2 + 5, D(b) = b^2 + 5 \quad \text{وبوضع } D(m) = D(b) \quad \therefore m^2 + 5 = b^2 + 5 \quad \therefore m^2 = b^2 \quad \therefore m = \pm b$$

الدالة ليست أحادية

③ بفرض : $m, b \in \text{مجال الدالة}$

$$\therefore D(m) = \frac{m^2 - 3}{m^3 + 2}, D(b) = \frac{b^2 - 3}{b^3 + 2} \quad \text{وبوضع } D(m) = D(b)$$


$$\therefore \frac{m^2 - 3}{m^3 + 2} = \frac{b^2 - 3}{b^3 + 2} \quad \therefore (m^2 - 3)(b^3 + 2) = (b^2 - 3)(m^3 + 2)$$

∴ الدالة أحادية


$$\therefore m = b$$

تمارين


١ استنتج من الشكل البياني مجال الدالة ومداها في كل مما يأتي:




د



ج



ب



أ

٢ إذا كانت د: $[-2, 6]$ ← ح

$$\left. \begin{array}{l} \text{عندما } -2 \leq x < 1 \\ \text{عندما } 1 \leq x \leq 6 \end{array} \right\} = (x)$$

ارسم الشكل البياني للدالة د، واستنتج من الرسم مدى الدالة وابحث اطرادها.

٣ باستخدام أحد البرامج الرسومية : ارسم منحنى الدالة د في كل من ما يأتي ، ومن الرسم استنتج مدى الدالة وابحث اطرادها.

أ د(س) = $s^2 - 5$ ب د(س) = $s^2 - 4$ ج د(س) = $(s-1)^2 + 1$

٤ في كل من الدوال المعرفة كما يلي حدد ما إذا كانت الدالة المعطاة أحادية أم لا ، مع توضيح السبب.

أ د(س) = $s^3 + 1$ ب د(س) = $\frac{s^2 + 1}{s^2}$ ج د(س) = $s^2 + 1$

٥ إذا كانت د ، ر دالتين حقيقيتين حيث د(س) = $(s-3)^2$ ، ر(س) = $(s+3)^2$ بين أي الدوال الآتية فردية وأيها زوجية وأيها غير ذلك.

أ د + ر ب $\frac{د}{ر}$ ج د - ر

٦ باستخدام أحد البرامج الرسومية : ارسم منحنى الدالة د في كل من ما يأتي ، ومن الرسم استنتج مدى الدالة وابحث اطرادها.


أ د(س) = s^3 ب د(س) = $s^3 - s^2$ ج د(س) = $\frac{1-s}{s-2}$

٧ ابحث نوع الدالة د من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

أ د(س) = $s^4 + s^2 - 1$ ب د(س) = $s^3 - s^2 - 4s^3$ ج د(س) = 0
 د د(س) = $s^3 - s^2$ ه د(س) = $\frac{s^2 + s^3}{s^3 - s}$ و د(س) = s حتا س

التمثيل البيانى للدوال والتحويلات الهندسية

أولاً : دوال كثيرات الحدود



[١] الدالة الثابتة: الصورة العامة هى: $d(s) = p$: p ثابت


وتمثل بيانياً بمستقيم يوازى محور السينات

ويقطع محور الصادات فى النقطة $(0, p)$

كما فى الشكل

* مجاله $= \mathbb{R}$ ، مداها $= \{p\}$

الدالة زوجية (متماثلة حول محور الصادات)



[٢] الدالة الخطية: أبسط صورة لدالة الدرجة الأولى هى:


• $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، $d(s) = s$ وتمثل بيانياً

بخط مستقيم يمر بنقطة الأصل $(0, 0)$ ميله $= 1$

* مجالها $= \mathbb{R}$ ، مداها $= \mathbb{R}$

* الدالة تزايدية على مجالها

* الدالة فردية (متماثلة حول نقطة الأصل)



[٣] الدالة التربيعية: أبسط صورة للدالة التربيعية هى:


• $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، $d(s) = s^2$

وتمثل بيانياً بمنحنى مفتوح لأعلى

* مجالها $= \mathbb{R}$ ، مداها $= [0, \infty)$


* الدالة تناقصية فى $[-\infty, 0]$ ، تزايدية فى $[0, \infty)$

* الدالة زوجية (متماثلة حول محور الصادات)




[٤] الدالة التكعيبية : أبسط صورة للدالة التربيعية هي:

- د : ع ← ع ، د (س) = س^٣ وتمثل بيانياً بمنحنى متمائل حول نقطة الأصل (٠،٠) الدالة فردية
- * مجال الدالة = ع ، مدى الدالة = ع
- * ، تزايدية فى على مجالها ع




ثانياً : دالة المقياس

- أبسط صورة لدالة المقياس هي:
- د : ع ← ع ، د (س) = | س |
- د (س) = $\begin{cases} س : س \leq 0 \\ - س : س > 0 \end{cases}$
- * مجالها = ع ، مداها = $[-\infty, \infty]$
- * الدالة تناقصية فى $[-\infty, 0]$ ، تزايدية فى $[0, \infty]$
- * الدالة زوجية (متمائلة حول محور الصادات)



ثانياً : الدالة الكسرية

- أبسط صورة لدالة المقياس هي:
- د : ع - {٠} ← ع ، د (س) = $\frac{1}{س}$
- تمثل بمنحنى من جزئين أحدهما فى الربع الأول والآخر فى الربع الثالث دون أن يقطعا المحورين
- س = س' ، ص = ص' ومتمائل حول نقطة الأصل (٠،٠)
- * مجالها = ع - {٠} ، مداها = ع - {٠}
- * الدالة تناقصية فى $[-\infty, 0]$ ، تناقصية فى $[0, \infty]$
- * الدالة فردية (متمائل حول نقطة الأصل)




مثال ١- ارسم الدالة $f(x) = 2$ ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك :

الحل

المجال x ، المدى $\{ 2 \}$
الدالة ثابتة ، الدالة زوجية (متماثلة حول محور الصادات)

مثال ٢- ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : $f(x) = \begin{cases} x-3 & x < 3 \\ x & x \geq 3 \end{cases}$




الحل

المجال x ، المدى $\{ x-3, x \}$
الدالة ثابتة فى $[-\infty, 0]$ ، فى $[0, \infty]$
الدالة ليست زوجية ولا فردية

مثال ٣- ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : $f(x) = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ x^2 & x < 0 \end{cases}$

الحل



الدالة معرفة بقاعدتين

١، $f(x) = x$: $x \geq 0$ يمثلها دالة خطية

بخط مستقيم يمر بالنقطة $(0, 0)$ وميله $= 1$

٢، $f(x) = x^2$: $x < 0$ يمثلها دالة تربيعية

بخط منحنى مفتوح لأعلى


المجال x ، المدى $[-\infty, \infty]$

الآطراد : الدالة تناقصية فى $[-\infty, 0]$ ، الدالة تزايدية فى $[0, \infty]$

الدالة ليست زوجية ولا فردية

إعداد / عادل إدوار

مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠



مثال: ارسم د(س) = $\frac{x^2 - 2}{x^2 - 1}$

حيث س $\neq \pm 1$ مع ذكر المجال والمدى واذكر نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك :

الحل

$$د(س) = \frac{(1 + س)(1 - س)}{(1 + س)(1 - س)} = \frac{(1 - س)}{(1 - س)} = 1$$


مجال د = ح - { 1 ، -1 }

مدى الدالة = { 2 } ، الدالة زوجية

مثال: ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرادها واذكر نوعها من

حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : د(س) = $\begin{cases} س^3 : س < 1 \\ |س| : س \geq 1 \end{cases}$

الحل



الدالة معرفة بقاعدتين

١ د(س) = س^٣ : س < 1 [١ ، ∞] يمثلها دالة تكعيبية


٢ د(س) = |س| : س >= 1 [١ ، ∞]

حسب تعريف دالة المقياس د(س) = - س

المجال ح ، المدى = [٠ ، ∞]

الاطراد : الدالة تناقصية فى [-∞ ، -١] ، تناقصية فى [-١ ، ٠] ، تزايدية فى [٠ ، ∞]

الدالة ليست زوجية ولا فردية



مثال: ارسم د(س) = $\frac{x^3 - 2x^2 + x}{x^2 - 1}$

: س $\neq 1, -1$ مبيناً المجال والمدى وابحث اطرادها

الحل

$$د(س) = \frac{س(س - ٢)(س + ١)}{(س - ١)(س + ١)} = \frac{س(س - ٢)}{(س - ١)}$$

المجال = ح - { 1 ، -1 } ، المدى = ح - { 2 ، -1 }

د متزايدة على مجالها

الدالة ليست زوجية ولا فردية

منتدى توحيد الرياضيات


(١٦)

إعداد / عادل إدوار

مثـ ٧ـال: ارسم الدالة الآتية ومن الرسم اذكر المدى وابحث اطرافها واذكر نوعها من

حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك : د(س) = $\begin{cases} \frac{1}{s} \\ s^2 \end{cases}$: س < ٠
: س > ٠

الحـل



الدالة معرفة بقاعدتين

د_١ (س) = س^٢ : س ≥ ٠ ، ∞ [يمثلها دالة تربيعية

بخط منحنى مفتوح لأعلى

د_٢ (س) = $\frac{1}{s}$: س > ٠ ، ∞ [دالة كسرية

تمثل بمنحنى فى الربع الثالث دون أن يقطعا المحورين

المجال ح - {٠} ، المدى = ح - {٠}

الأطراف : الدالة تناقصية فى [- ∞ ، ٠] ، الدالة تزايدية فى [٠ ، ∞]

الدالة ليست زوجية ولا فردية

التحويلات الهندسية لمنحنيات الدوال

أولاً : الإزاحة الرأسية لمنحنى الدالة




لأى دالة د يكون المنحنى ص = د(س) + م ، م ≥ ٠ ، م ≤ ٠ هو نفس المنحنى

ص = د(س) بإزاحة رأسية قدرها |م| فى اتجاه $\begin{cases} \overleftarrow{\text{وص}} \\ \overrightarrow{\text{وص}} \end{cases}$: م < ٠
: م > ٠

منحنى ص = س^٢ + ١ هو نفسه
منحنى ص = س^٢
بإزاحة رأسية قدرها ١
فى اتجاه $\overleftarrow{\text{وص}}$ (الموجب)

منحنى ص = ١/س - ٣ هو نفسه
منحنى ص = ١/س
بإزاحة رأسية قدرها ٣
فى اتجاه $\overleftarrow{\text{وص}}$ (الموجب)

منحنى ص = س^٢ - ٣ هو نفسه
منحنى ص = س^٢
بإزاحة رأسية قدرها ٣
فى اتجاه $\overrightarrow{\text{وص}}$ (السالـب)



إعداد م/ عادل إدوار

(١٧)


متمدى توجيـه الرياضيات

ثانيا : الإزاحة الأفقية لمنحنى الدالة


لأى دالة د يكون المنحنى $ص = د(س + ب)$ ، $ب \in \mathbb{R}$ ، $\{0\}$ هو نفس المنحنى

ص = د(س) بإزاحة أفقية قدرها $|ب|$ فى اتجاه : $\left. \begin{array}{l} \text{وس} \leftarrow \text{وس} \\ \text{وس} \rightarrow \text{وس} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ب} : < 0 \\ \text{ب} : > 0 \end{array}$


منحنى $ص = د(س - ٢)$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة أفقية قدرها ٢
فى اتجاه $\text{وس} \leftarrow$ (الموجب)



منحنى $ص = د(س - ١)$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة أفقية قدرها ١
فى اتجاه $\text{وس} \leftarrow$ (الموجب)



منحنى $ص = د(س + ٣)$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة أفقية قدرها ٣
فى اتجاه $\text{وس} \rightarrow$ (السالب)



نقطة تماثل (٠، ٢) ، المدى $[-٢, \infty)$
الاطراد: تناقصية فى $[-٢, \infty)$
تزايدية فى $[-٢, \infty)$


نقطة تماثل (٠، ١) ، المدى \mathbb{R}
الدالة تناقصية على مجالها

نقطة تماثل (٠، -٣) ، المدى $[-٣, \infty)$
الاطراد: تناقصية فى $[-٣, \infty)$
تزايدية فى $[-٣, \infty)$


ثالثا : لأى دالة د يكون المنحنى $ص = د(س + ب)$ ، $ب \in \mathbb{R}$ ، $\{0\}$ هو نفس

المنحنى $ص = د(س)$ بإزاحة رأسية قدرها $|ب|$ فى اتجاه $\left. \begin{array}{l} \text{وس} \leftarrow \text{وس} \\ \text{وس} \rightarrow \text{وس} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{عندما } ب > 0 \\ \text{عندما } ب < 0 \end{array}$
ثم إزاحة رأسية مقدارها $|ب|$ فى اتجاه $\left. \begin{array}{l} \text{وص} \leftarrow \text{وص} \\ \text{وص} \rightarrow \text{وص} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{عندما } ب < 0 \\ \text{عندما } ب > 0 \end{array}$


منحنى $ص = د(س + ١) + ٣$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة رأسية قدرها ٣ $\text{وص} \leftarrow$
بإزاحة أفقية قدرها ١ $\text{وس} \leftarrow$



منحنى $ص = د(س - ١) - ٣$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة رأسية قدرها ٣ $\text{وص} \rightarrow$
بإزاحة أفقية قدرها ١ $\text{وس} \rightarrow$



منحنى $ص = د(س + ١) - ٢$ هو نفسه
منحنى $ص = د(س)$
بإزاحة رأسية قدرها ٢ $\text{وص} \rightarrow$
بإزاحة أفقية قدرها ١ $\text{وس} \rightarrow$



مذكرى توجيب الرياضيات

رابعاً : لآى دالة د يكون المنحنى ص = ١ د(س) حيث ١ ≥ ١


• تمدد رأسى للمنحنى إذا كان ١ < ١ ، أنكماش رأسى للمنحنى إذا كان ١ > ١

$$\begin{aligned} ٣ > ٣ > ٣ \\ ٣ > ٣ > ٣ \\ ٣ > ٣ \end{aligned}$$

مثال ١: ارسم الشكل البياني للدالة : د(س) = |س|^٣

مع ذكر المجال والمدى ، ابحث اطرادها وبين أنها دالة زوجية .

الحل



١ : دالة ثابتة د(س) = ٣ فى ٣- ، ٥-]

٢ : دالة مقياس د(س) = |س|^٣ : س ≥ ٠ : س ≤ ٣

٣ : دالة ثابتة د(س) = ٣ فى ٣ ، ∞]

المجال = ٥- ، ∞] ، المدى = [٣ ، ٠]

ثابتة فى ٥- ، ٣-] ، د متناقصة فى ٣- ، ٠]

، تزايدية فى ٣ ، ٠] ، ثابتة فى ٣ ، ∞]


ادالة ليست زوجية وليست فردية

١ > ١ :

١ < ١ :

مثال ٢: ارسم منحنى الدالة د(س) = |س|^١ - ١

اذكر المجال والمدى وبين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية ، وبحث اطرادها :



الحل

١ : دالة مقياس د(س) = |س|^١ - ١ : س ≥ ٠ : س ≤ ١

٢ : دالة تربيعية بإزاحة مقدارها ١ فى اتجاه وس

المجال = ١ - {١} ، المدى = [٠ ، ∞]

الدالة متناقصة فى [٠ ، ∞]

تزايد فى [٠ ، ١] ، تزايد فى [١ ، ∞]

إعداد ١ / عادل إدوار

(١٩)

متمنى توفيقه الرياضيات


مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثانى الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثـ٣ـال: ارسم منحنى الدالة د(س) = س^٢ لتمثيل الدوال ر ، ه ، حيث

$$\textcircled{1} \text{ ر(س) = س}^2 - 1 \quad \textcircled{2} \text{ ه(س) = (س - 3)}^2 \quad \textcircled{3} \text{ ه(س) = 2 - س}^2$$

ومن الرسم حدد مجال ومدى الدالة وابحث اطرافها


الحـل



$$\textcircled{1} \text{ ر(س) = س}^2 - 1 \text{ إزاحة قدرها 1 فى اتجاه وص}^{\leftarrow}$$

رأس المنحنى (٠، ١) ، المدى =] ∞ ، ١]

، تناقصية [٠ ، ∞] ، تزايدية [∞ ، ٠]



$$\textcircled{2} \text{ ه(س) = (س - 3)}^2 \text{ قدرها 3 فى اتجاه وص}^{\leftarrow}$$


رأس المنحنى (٣، ٠) ، المدى =] ∞ ، ٠]

، تناقصية [٣ ، ∞] ، تزايدية [∞ ، ٣]

$$\textcircled{3} \text{ ه(س) = 2 - س}^2$$

انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

وإزاحة قدرها 2 فى اتجاه وص[←]



رأس المنحنى (٠، ٢) ، المدى = [٢ ، ∞ -]

، الدالة تزايدية فى [٠ ، ∞ -] ، تناقصية فى [∞ ، ٠]

مثـ٤ـال: ارسم فى شكل واحد منحنيات الدوال الآتية وعين مدى كل منها

واستنتج اطرافها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك :


$$(1) \text{ د(س) = س}^2 \quad (2) \text{ د(س) = 2س}^2 \quad (3) \text{ د(س) = } \frac{1}{س}^2$$

الحـل

جميع الدوال نقطة رأس منحناها (٠، ٠)

، مجالها ح ، مداها = [٠ ، ∞] ، جميع الدوال زوجية

، جميعها متناقصية فى [٠ ، ∞ -] ، متزايدة فى [∞ ، ٠]



متمنى توجبه الرياضيات

(٢٠)

إعداد / عادل إدوار

مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثانى الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثـ ٥ـال: ارسم فى شكل واحد منحنيات الدوال الآتية وعين مدى كل منها

واستنتج اطرادها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك :

(١) د (س) = س^٢ (٢) د (س) = - س^٢ (٣) د (س) = - س^٢

الحـل

جميع الدوال نقطة رأس منحناها (٠ ، ٠)

، مجالها ح ، جميع الدوال زوجية


، د_١ مفتوح لأعلى مداها = [٠ ، ∞] ،

د_٢ مفتوح لأسفل مداها = [-∞ ، ٠]

الدالة متزايدة فى [-∞ ، ٠] ، متناقصة فى [٠ ، ∞]

د_٣ مفتوح لأسفل مداها = [-∞ ، ٠]

الدالة متزايدة فى [-∞ ، ٠] ، متناقصة فى [٠ ، ∞]



مثـ ٦ـال: ارسم منحنى الدالة د(س) = س^٣ لتمثيل الدوال ر ، ح ، هـ حيث

① ر(س) = س^٣ + ١ ② ح(س) = (س - ٢)^٣ ③ هـ(س) = (س + ١)^٣ + ٢

ومن الرسم حدد مجال ومدى الدالة وابحث اطرادها


الحـل

① ر(س) = س^٣ + ١

إزاحة قدرها |١| فى اتجاه وصـ

رأس المنحنى النقطة (١ ، ٠) ، المدى ح

، الدالة تزايدية على مجالها





② ح(س) = (س - ٢)^٣

إزاحة قدرها |٢| فى اتجاه وصـ

رأس المنحنى النقطة (٢ ، ٠) ، المدى ح

، الدالة تزايدية على مجالها





$$\textcircled{ح} \quad h(s) = s^3 + 2s^2 - 1$$

إزاحة |٢| فى اتجاه $\overleftarrow{وس}$

وإزاحة |٢| فى اتجاه $\overrightarrow{وص}$

رأس المنحنى النقطة $(2, 1)$ ، المدى $ع$

، الدالة تزايدية على مجالها

مثال ٧- ارسم منحنى الدالة $د(s) = s^3$ لتمثيل الدوال $ر$ ، $هـ$ ، $ح$ حيث

$$\textcircled{١} \quad ر(s) = -s^3 \quad \textcircled{ب} \quad هـ(s) = 2s^3 - 2 \quad \textcircled{ح} \quad د(s) = 1 - (s + 2)^3$$

ومن الرسم حدد مجال ومدى الدالة وابحث اطرافها


الحل

$$\textcircled{١} \quad ر(s) = -s^3$$

انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

رأس المنحنى النقطة $(0, 0)$ ، المدى $ع$

، الدالة تناقصية على مجالها




$$\textcircled{ب} \quad هـ(s) = 2s^3 - 2$$

إزاحة قدرها |١| فى اتجاه $\overrightarrow{وص}$

يوجد تمدد فى الدالة

رأس المنحنى النقطة $(1, 0)$ ، المدى $ع$

، الدالة تزايدية على مجالها



$$\textcircled{ح} \quad د(s) = 1 - (s + 2)^3$$


انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

إزاحة |٢| فى اتجاه $\overleftarrow{وس}$

وإزاحة |٢| فى اتجاه $\overrightarrow{وص}$

رأس المنحنى النقطة $(-2, 1)$ ، المدى $ع$


، الدالة تناقصية على مجالها



مثـ ٨-ال: من رسم منحنى الدالة د(س) = |س| أرسم ومن الرسم حدد مجال ومدى

الدالة وابحث اطرافها ① $r(س) = |س + 3|$ ② $n(س) = |س| - 5$

الحل




① $r(س) = |س + 3|$ دالة مقياس

بإزاحة أفقية قدرها 3 فى اتجاه \leftarrow وسـ

نقطة التماثل (3, 0) مجال ح ، مدى $[0, \infty)$

تناقصية فى $[-\infty, 3]$ ، تزايدية فى $[3, \infty)$



② $n(س) = |س| - 5$ دالة مقياس

انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

بإزاحة رأسية قدرها 5 فى اتجاه \leftarrow وصـ


نقطة التماثل (0, 5) مجال ح ، مدى $[-5, \infty)$

الدالة تزايدية فى $[-\infty, 0]$ ، تناقصية فى $[0, \infty)$

مثـ ٩-ال: من رسم منحنى الدالة د(س) = |س| أرسم ومن الرسم حدد مجال ومدى

الدالة وابحث اطرافها ① $h(س) = |س - 4| - 3$ ② $k(س) = \frac{1}{2}|س + 4| + 2$

الحل



① $h(س) = |س - 4| - 3$ دالة مقياس


انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

بإزاحة رأسية قدرها 4 فى اتجاه \leftarrow وصـ

بإزاحة أفقية قدرها 3 فى اتجاه \leftarrow وسـ

نقطة التماثل (4, 3-) مجال ح ، مدى $[-3, \infty)$

تزايدية فى $[-\infty, 4]$ ، $[4, \infty)$



② $k(س) = \frac{1}{2}|س + 4| + 2$ دالة مقياس

بإزاحة أفقية قدرها 4 فى اتجاه \leftarrow وسـ ، \leftarrow وصـ

نقطة التماثل (2, 4-) مجال ح ، مدى $[-2, \infty)$


تناقصية فى $[-\infty, 2]$ ، تزايدية فى $[2, \infty)$

مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثـ ١٠ـ ال: من رسم منحنى الدالة د(س) = |س| أرسم الدوال الآتية ثم حدد مدى

الدالة وابحث اطرافها ① ه(س) = ٤ - |س| ② ر(س) = √(٤ + س + س²)


الحـل



① ه(س) = ٤ - |س| دالة مقياس

تمدد فى منحنى الدالة و انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب
بإزاحة رأسية قدرها |٤| فى اتجاه **وصـ**

نقطة التماثل (٠، ٤) مجال ح ، المدى [٤ ، ∞ -
الدالة تزايدية فى [٠، ∞ - ، تناقصية فى [∞ ، ٠]



② ر(س) = √(٤ + س + س²) = √((٢ + س)²)

ر(س) = |٢ + س| دالة مقياس

بإزاحة أفقية قدرها |٢| فى اتجاه **وصـ**

نقطة التماثل (٠، ٢) مجال ح ، المدى [٠ ، ∞]

تزايدية فى [٠، ∞ - ، [∞ ، ٠]

مثـ ١١ـ ال: ارسم د(س) = (٢ - س - س²) / |٢ - س| حيث س ≠ ٢

ومن الرسم عين المدى وابحث الاطراف


الحـل

$$د(س) = \begin{cases} \frac{(١ + س)(٢ - س)}{(٢ - س)} & س < ٢ \\ \frac{(١ + س)(٢ - س)}{-(٢ - س)} & س > ٢ \end{cases}$$

$$\therefore د(س) = \begin{cases} ١ + س & س < ٢ \\ ١ - س & س > ٢ \end{cases}$$

المجال = ح - {٢} ، المدى = [٣ ، ∞]

الدالة متناقصة فى [٢ ، ∞ - ، متزايدة فى [∞ ، ٢]



مثـ ١٢ـ ال: من رسم منحنى الدالة د(س) = $\frac{1}{س}$ أرسم الدوال الآتية ثم حدد مدى

الدالة وابحث اطرافها ① ر(س) = $\frac{1}{س-١}$ ② ر(س) = $٣ - (\frac{1}{س-٢})$

الحـل

① ر(س) = $\frac{1}{س-١}$ دالة كسرية

بإزاحة أفقية قدرها |١| فى اتجاه $\overleftarrow{\text{وسـ}}$

نقطة التماثل النقطه (٠، ١)

مجال ح - {١} ، المدى ح - {٠}

تناقصية فى $[-\infty, ١)$ ، تناقصية فى $(١, \infty]$

② ر(س) = $٣ - \frac{1}{س}$ دالة كسرية

بإزاحة رأسية قدرها |٣| فى اتجاه $\overleftarrow{\text{وصـ}}$

بإزاحة أفقية قدرها |٢| $\overleftarrow{\text{وسـ}}$ نقطة التماثل (٢، ٣)

مجال ح - {٢} ، المدى ح - {٣}

تناقصية فى $[-\infty, ٢)$ ، تناقصية فى $(٢, \infty]$

مثـ ١٣ـ ال: من رسم منحنى الدالة د(س) = $\frac{1}{س}$ أرسم الدوال الآتية ثم حدد مدى

الدالة وابحث اطرافها ① ه(س) = $\frac{1}{س} + ٢$ ② ر(س) = $\frac{1}{س-٢} + ٢$

① ه(س) = $\frac{1}{س} + ٢$ دالة كسرية

انعكاس للدالة لوجود إشارة سالب

بإزاحة رأسية قدرها |٢| فى اتجاه $\overleftarrow{\text{وصـ}}$

نقطة التماثل (٢، ٠)


مجال ح - {٠} ، المدى ح - {٢}

تزايدية فى $[-\infty, ٠)$ ، تزايدية فى $(٠, \infty]$

(٢٥)

منذى توجب الرياضيات

إعداد / عادل إدوار



٢) $f(x) = \frac{x-3}{x-2}$ دالة كسرية

بإزاحة رأسية قدرها ٣ فى اتجاه $\overrightarrow{OS'}$

بإزاحة أفقية قدرها ٢ فى اتجاه $\overrightarrow{OS'}$

نقطة التماثل (٢ ، ٣)

مجال ح - {٢} ، المدى ح - {٣}

تناقصية فى $[-\infty, 2]$ ، تناقصية فى $(2, \infty]$

عندما $s \in [-3, 3]$

عندما $s \in [3, 6]$

عندما $s \in [6, 8]$

عندما $s < 8$

s^2
٣
٩-
صفر

مثال ١- ارسم منحنى الدالة د(س) =

ثم عين مدى الدالة واستنتج اطرادها

الحل

من الرسم : مدى الدالة $[0, 9]$


الدالة متناقصة فى $[-3, 0]$ ،

الدالة متزايدة فى $[0, 3]$

الدالة ثابتة فى $[3, 6]$

الدالة متناقصة فى $[6, 8]$

الدالة ثابتة فى $[8, \infty]$



مثال ١٥- ابحث نوع د(س) = $s^3 |s|$ من حيث كونها زوجية أو فردية

الحل

د(س) = د(-س) = $(-س)^3 |-س| = -س^3 |س| = -د(س)$ ∴ الدالة فردية

مثال ١٦- ابحث نوع د(س) = $|س+٥| + |س-٥|$ من حيث كونها زوجية أو فردية

الحل

د(س) = د(-س) = $|س+٥| + |س-٥| = |-س+٥| + |-س-٥| = د(س)$ ∴ الدالة زوجية

إعداد / عادل إدوار

تمارين

١ ارسم منحنى الدالة د ، ومن الرسم حدد مداها وابحث اطرافها

$$\left. \begin{array}{l} \text{أ} \text{ د(س)} = \left\{ \begin{array}{l} |س| \text{ عندما } س \geq 0 \\ س^2 \text{ عندما } س < 0 \end{array} \right. \\ \text{ب} \text{ د(س)} = \left\{ \begin{array}{l} ٤ \text{ عندما } س > 2 \\ س^2 \text{ عندما } س \leq 2 \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

٢ اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

منحنى ر(س) = س^٢ + ٤ هو نفس منحنى د(س) = س^٢ بازاحة مقدارها ٤ وحدات فى اتجاه:

$$\left. \begin{array}{l} \text{أ} \text{ وس} \\ \text{ب} \text{ وس} \\ \text{ج} \text{ وس} \\ \text{د} \text{ وس} \end{array} \right\}$$

نقطة رأس منحنى الدالة د(س) = (س - ٢) + ٣ هي:


$$\left. \begin{array}{l} \text{أ} (٣, ٢) \\ \text{ب} (٢, ٣) \\ \text{ج} (٢, -٣) \\ \text{د} (-٢, ٣) \end{array} \right\}$$

نقطة تماثل منحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{١}{٣-س}$ + ٤ هي:


$$\left. \begin{array}{l} \text{أ} (٣, -٤) \\ \text{ب} (-٣, -٤) \\ \text{ج} (٣, ٤) \\ \text{د} (-٣, ٤) \end{array} \right\}$$

٣ رُسم منحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{١}{س}$ ، ثم أزيح فى اتجاه محورى الإحداثيات . اكتب قاعدة كل دالة التي تمثلها المنحنيات الآتية:


ج



ب



أ



٤	<p>استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = س^٢ لتمثيل ما يأتي بيانياً.</p> <p>أ) د_١(س) = س^٢ - ٤ ب) د_٢(س) = (س - ٣)^٢ ج) د_٣(س) = (س - ١) - ٢</p>
٥	<p>استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = س^٣ لتمثيل ما يأتي بيانياً:</p> <p>أ) د_١(س) = د(س) - ٣ ب) د_٢(س) = د(س - ٢) ج) د_٣(س) = د(س) + (٣ + ٢)</p> <p>◀ ثم حدد نقطة التماثل لمنحنى كل دالة.</p>
٦	<p>إذا كانت الدالة د حيث د(س) = $\frac{١}{س}$ فارسم الشكل البياني للدالة ق وحدد نقطة التماثل لمنحنى الدالة:</p> <p>أ) ق(س) = د(س - ٣) ب) ق(س) = د(س) + ٢ ج) ق(س) = د(س - ٢) + ٢</p>
٧	<p>استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = س لتمثيل ما يأتي بيانياً.</p> <p>أ) د_١(س) = س - ٢ ب) د_٢(س) = - س + ٥ ج) د_٣(س) = س - ٤ - ٢</p> <p>د) د_٤(س) = ٢ س هـ) د_٥(س) = ٢ - س - ١ و) د_٦(س) = ٥ - س - ٢ </p>
٨	<p>ارسم منحنى الدالة د في كل مما يأتي باستخدام التحويلات المناسبة ثم ابحث اطرافها</p> <p>أ) د_١(س) = $\left. \begin{array}{l} س^٢ + ٢ \text{ عندما } س \leq ٠ \\ س - ٢ \text{ عندما } س > ٠ \end{array} \right\}$ ب) د_٢(س) = $\left. \begin{array}{l} س^٢ + ١ \text{ عندما } س \geq ٤ \\ س - ١ \text{ عندما } س < ٤ \end{array} \right\}$</p>

حل معادلات ومتباينات القيمة المطلقة

١- حل معادلات القيمة المطلقة .

الطريقة البيانية: لحل المعادلة $|د(س)| = ر(س)$ نرسم التمثيل البياني (مجموعة الإحداثيات السينية) لنقط تقاطع منحني الدالتين $د$ ، $ر$

خواص مقياس العدد :

$$|س| \leq ٠ ، |س| = ٠ \text{ إذا وفقط إذا كان } س = ٠$$

$$|س| \times |ص| = |س + ص| ، |س| + |ص| \geq |س + ص|$$

$$|س| = |-س|$$

$$|٣ - س| = |٢ - س| \text{ فمثلاً}$$


$$|س| = ٥ \text{ فإن } س = \pm ٥$$

$$|س - ٣| = |س + ١| \text{ فإن } س - ٣ = \pm (س + ١)$$

$$|س| = \sqrt{س^٢} ، |س|^٢ = س^٢$$

مثال ١- حل المعادلة $|س + ١| = ٣$ بيانياً وتحقق من الحل جريباً

الحل



الحل بيانياً: نمثل الدالة $د(س) = |س + ١|$

والدالة $ر(س) = ٣$ وتحديد نقط تقاطع الدالتين

$$(٣، ٤-) ، (٣، ٢) \therefore \text{م.ع} = \{٢، ٤-\}$$

الحل الجبرى : $|س + ١| = ٣ \Leftrightarrow (س + ١) = \pm ٣$

$$\Leftrightarrow س + ١ = ٣ \text{ ، } س + ١ = -٣$$

$$\therefore س = ٢ = ٣ - ١ \text{ ، } س = -٤ = -٣ - ١ \therefore \text{م.ع} = \{٢، ٤-\}$$

مثال ٢- حل المعادلة $|س + ٢| + ٥ = ٠$

الحل


$$|س + ٢| + ٥ = ٠ \text{ وهذا مرفوض}$$

$$\therefore \text{م.ع} = \emptyset$$

منتدك توجبه الرياضيات

مثـ٣ـال: حل المعادلة $|س - ١| = |س + ٣|$ بيانياً وتحقق من الحل جريباً

الحـل



الدالة د(س) = $|س - ١|$ إزاحة أفقية $|١|$ فى اتجاه \leftarrow وسـ
والدالة ر(س) = $|س + ٣|$ إزاحة أفقية $|٣|$ فى اتجاه \leftarrow وسـ
من الرسم نقطة التقاطع للدالتين هي (٠ ، ١ -)

$$\therefore \text{م.ح} = \{٢ ، ٤ -\}$$

الحل الجبرى : $|س - ١| = |س + ٣|$ بتربيع الطرفين


$$\Leftarrow \cancel{س}^٢ - \cancel{س}^٢ + ٢س - ١ = \cancel{س}^٢ + \cancel{س}^٢ + ٦س + ٩$$

$$\Leftarrow ٢س - ١ = ٦س + ٩ \Rightarrow ٨ = ٤س \Rightarrow ٢ = س$$

$$\therefore \text{م.ح} = \{٢ -\}$$

مثـ٤ـال: حل المعادلة $|س - ٣| = |س + ٢|$ بيانياً وتحقق من الحل جريباً

الحـل



الدالة د(س) = $|س - ٣|$ إزاحة رأسية $|٣|$ فى اتجاه \leftarrow وسـ
والدالة ر(س) = $|س + ٢|$ إزاحة رأسية $|٢|$ فى اتجاه \leftarrow وسـ

من الرسم نقطة التقاطع للدالتين هي (١ ، ٢ -) ، (٢ ، ١ -)

$$\therefore \text{م.ح} = \{١ ، ٢ -\}$$

الحل الجبرى : بإستخدام إعادة التعريف

$$\left. \begin{array}{l} ٠ \leq س : س - ٣ = س + ٢ \\ ٠ > س : س - ٣ = -س - ٢ \end{array} \right\} \text{المعادلة هي}$$

$$\Leftarrow س - ٣ = س + ٢ \Rightarrow -٥ = ٠ \text{ (غير ممكن) ، } س - ٣ = -س - ٢ \Rightarrow ٢س = ١ \Rightarrow س = ٠.٥$$

$$\therefore \text{م.ح} = \{٠.٥ ، ١ -\}$$

مثـ٥ـال: أوجد الحل الجبرى للمعادلة : $\sqrt{٣س} - ٢ = |س - ١|$

الحـل

$$\sqrt{٣س} - ٢ = |س - ١| \Rightarrow \sqrt{٣س} = |س - ١| + ٢$$

$$\therefore س = ١ \pm \sqrt{٣س} - ٢$$


(٣٠)

متمنى توجبه الرياضيات

إعداد / عادل إدوار

مثال-٦: حل المعادلة $|٣ - ٢س| = ٣$ بيانياً وحقق الناتج جبرياً

الحل



الدالة $د(س) = |٣ - ٢س|$ إنكماش فى منحنى الدالة

،إزاحة أفقية $|٣/٢|$ فى اتجاه $\overleftarrow{س}$

والدالة $ر(س) = ٣$ دالة ثابتة توازى محور السينات

من الرسم نقطة التقاطع للدالتين هي $(٣, ٠)$ ، $(٣, ٣)$

$\therefore ح.م = \{٠, ٣\}$

الحل الجبرى: نضع المعادلة على الصورة : $٠ = ٣ - |٣ - ٢س|$

نفرض أن $د(س) = |٣ - ٢س| = ٣$

$$د(س) = \begin{cases} ٣ - ٢س \\ ٣ - ٢س + ٣ \end{cases} \quad \begin{cases} ٣ - ٢س \leq ٣/٢ \\ ٣ - ٢س > ٣/٢ \end{cases} = \begin{cases} ٢س - ٦ \\ ٢س \end{cases}$$

عندما $س \leq ٣/٢$ فإن : $٢س - ٦ = ٠ \therefore س = ٣$ تحقق

وعندما $س > ٣/٢$ فإن : $٢س = ٠ \therefore س = ٠$ تحقق

\therefore مجموعة الحل $= \{٣, ٠\}$

حل جبرى آخر

$$\therefore |٣ - ٢س| = ٣$$

إما : $٣ - ٢س = ٣$

أ، : $٣ - ٢س = -٣$

ومنها $٢س = ٦$ ومنها $س = ٣$ وهى تحقق المعادلة

ومنها $٢س = ٠$ ومنها $س = ٠$ وهى تحقق المعادلة

\therefore مجموعة الحل $= \{٣, ٠\}$

حل جبرى ثالث

بتربيع الطرفين

$$\therefore ٩ = ٩ + ١٢س - ٤س^٢$$

$$\therefore ٠ = ٤س^٢ - ١٢س + ٩$$

ومنها $س = ٠$ وهى تحقق المعادلة

ومنها $س = ٣$ وهى تحقق المعادلة

\therefore مجموعة الحل $= \{٣, ٠\}$

إما $س = ٠$

أ، $س = ٣$

مثـ٧ـال: أوجد الحل الجبرى للمعادلة : $\sqrt{2 - |س|} - ١ = ٠$

الحـل

$$\therefore \sqrt{2 - |س|} = ١$$

$$\therefore |س| - ١ = ٠ \Rightarrow |س| = ١ \Rightarrow س = ١ \text{ أو } س = -١$$

$$\text{إما } |س| = ١ \Rightarrow س = ١ \text{ ومنها } |س| = ١ \Rightarrow س = -١$$

$$\text{أ، } |س| = ١ \Rightarrow س = ١ \text{ ومنها } |س| = ١ \Rightarrow س = -١$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ١, -١, ٢, -٢ \}$$

مثـ٨ـال: أوجد الحل الجبرى للمعادلة : $\sqrt{٩ + ٦س - س^٢} = ٤$

الحـل

$$\sqrt{٩ + ٦س - س^٢} = ٤ \Leftrightarrow ٩ + ٦س - س^٢ = ١٦ \Leftrightarrow -س^٢ + ٦س - ٧ = ٠$$

$$\Leftrightarrow |س - ٣| = ١ \Rightarrow س = ٤ \text{ أو } س = ٢$$

$$\text{إما } س = ٣ \Rightarrow س = ٤ \text{ ومنها } س = ٢ \text{ تحقق المعادلة}$$

$$\text{أ، } س = ٣ \Rightarrow س = ٢ \text{ ومنها } س = ٤ \text{ تحقق المعادلة}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ٢, ٤ \}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ٢, ٤, ٣, -٣ \}$$

مثـ٩ـال: أوجد الحل الجبرى للمعادلة : $|١ + س| - ٣ = ١٠ - |١ + س|$

الحـل

$$\text{بالتحليل: } (|١ + س| + ٣) = (١٠ - |١ + س|) \Rightarrow |١ + س| = ٤$$

$$\text{ومنها } |١ + س| = ٤ \Rightarrow س = ٣ \text{ أو } س = -٥$$

$$\Leftrightarrow |١ + س| = ٤ \Rightarrow س = ٣ \text{ مرفوض } س = -٥$$

$$\therefore س = ٣ \text{ عندما } س \leq ١ \text{ تحقق التعريف}$$


$$\text{أ، } س = ٣ \text{ عندما } س > ١ \text{ تحقق التعريف}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{ ٣, -٥ \}$$

٢] حل متباينات القيمة المطلقة.

الحل البياني لمتباينة القيمة المطلقة

مثال: حل ١) $|س + ١| = ٣$ ، ٢) $|س + ١| > ٣$ ، ٣) $|س + ١| < ٣$ بيانياً



الحل

١) نمثل الدالة د(س) = $|س + ١|$

والدالة ر(س) = ٣ وتحديد نقط تقاطع الدالتين

$(٣, ٢), (٣, -٢)$ \therefore م.ح = $\{٢, -٢\}$


٢) حل المتباينة $|س + ١| > ٣$

هو $[-٣, ٤]$



٣) حل المتباينة $|س + ١| < ٣$


هو $[-٣, ٤] \cup [٣, \infty)$ أو $[-٣, ٤] \cup [٣, \infty)$



ملاحظة هامة:


٢) حل المتباينة $|س + ١| \geq ٣$

هو $[-٣, ٤]$



٣) حل المتباينة $|س + ١| \leq ٣$

هو $[-٣, ٤] \cup [٣, \infty)$ أو $[-٣, ٤] \cup [٣, \infty)$



الحل الجبري لمتباينة القيمة المطلقة

❖ إذا كان $|س| > م$ فإن $س > م$ أو $س < -م$ \Rightarrow $س \in (-\infty, -م) \cup (م, \infty)$

❖ إذا كان $|س| < م$ فإن $س < م$ أو $س > -م$ \Rightarrow $س \in (-م, م)$

❖ إذا كان $|س| \geq م$ فإن $س \geq م$ أو $س \leq -م$ \Rightarrow $س \in (-\infty, -م] \cup [م, \infty)$

❖ إذا كان $|س| \leq م$ فإن $س \leq م$ أو $س \geq -م$ \Rightarrow $س \in [-م, م]$

إعداد / عادل إدوار

مثال ٢- حل المتباينة $|س - ٣| > ٥$

الحل

القاعدة المستخدمة إذا كان $|س| > م$ فإن $س > م$ أو $س < -م$ $\Rightarrow س < -٣$ ، $س > ٣$

$\therefore |س - ٣| > ٥ \Rightarrow س - ٣ > ٥$ أو $س - ٣ < -٥$ بإضافة ٣ للمتباينة

$\therefore س > ٨$ أو $س < -٢$

$\therefore س \in (-\infty, -٢) \cup (٨, \infty)$



مثال ٣- حل المتباينة $|٣ - ٢س| \geq ٧$

الحل

القاعدة المستخدمة إذا كان $|س| \geq م$ فإن $س \geq م$ أو $س \leq -م$ $\Rightarrow س \geq ٢$ ، $س \leq -٢$

$\therefore |٣ - ٢س| \geq ٧ \Rightarrow ٣ - ٢س \geq ٧$ أو $٣ - ٢س \leq -٧$ بإضافة ٢س للمتباينة

$\therefore ٣ + ٧ \geq ٢س$ أو $٣ - ٧ \leq ٢س$

$\therefore ١٠ \geq ٢س$ أو $٤ \leq ٢س$

$\therefore ٥ \geq س$ أو $٢ \leq س$

$\therefore س \in [٢, ٥]$



مثال ٤- حل المتباينة $|٢س + ١| < ٧$

الحل

القاعدة المستخدمة

إذا كان $|س| < م$ فإن $س < م$ ، $س > -م$ $\Rightarrow س > -٣$ ، $س < ٣$

$\therefore |٢س + ١| < ٧ \Rightarrow ٢س + ١ < ٧$ أو $٢س + ١ > -٧$

$\therefore ٢س < ٦$ أو $٢س > -٨$ بطرح (١)

$\therefore س < ٣$ أو $س > -٤$

$\therefore س \in (-٤, ٣)$



\therefore حل المتباينة $س \in (-٤, ٣)$

مثال-٥: حل المتباينة $|3س + 2| + 5 > ٤$

الحل

$$\therefore |3س + 2| + 5 > ٤ \quad \therefore |3س + 2| + 5 > ١ \quad \text{مرفوضة}$$

\therefore حل المتباينة هو \emptyset

مثال-٦: حل المتباينة $|3س + 2| \leq ٧$

الحل

القاعدة المستخدمة

$$\text{إذا كان } |س| \leq م \text{ فإن } م \leq س \leq م \text{ ، } م \leq س \leq م \Leftrightarrow س \in [-م, م] \text{ ، } م > ٠$$


$$\therefore |3س + 2| \leq ٧$$

$$\therefore 3س + 2 \leq ٧ \quad \text{أ} \quad 3س + 2 \geq -٧ \quad \text{ب طرح (٢)}$$

$$\therefore 3س \leq ٥ \quad \text{أ} \quad 3س \geq -٩$$

$$\therefore س \leq \frac{٥}{٣} \quad \text{أ} \quad س \geq -٣$$

$$\therefore \text{حل المتباينة } س \in [-٣, \frac{٥}{٣}]$$



مثال-٧: حل المتباينة $|س - ٣| \geq ٦$

الحل

$$\text{القاعدة المستخدمة إذا كان } |س| \geq م \text{ فإن } م \geq س \geq م \text{ ، } م \geq س \geq م \Leftrightarrow س \in [-م, م] \text{ ، } م > ٠$$

$$\therefore |س - ٣| \geq ٦ \quad \therefore س - ٣ \geq ٦ \quad \text{ب طرح ٣ المتباينة}$$

$$\therefore س - ٦ \geq ٩ \quad \therefore س \geq ١٥$$

$$\therefore س - ٣ \leq -٦ \quad \text{ب الضرب } \times (-١) \text{ نعكس المتباينة}$$

$$\therefore س \leq ٣$$

$$\therefore \text{حل المتباينة } س \in (-\infty, ٣] \cup [٩, +\infty)$$



ملاحظة: يمكن المتباينة $|س - ٣| \geq ٦$ تكتب $|س - ٣| \geq ٦$

مثال ٨- حل المتباينة $\sqrt{25 + 10s - s^2} < 1$

الحل

$$\therefore \sqrt{25 + 10s - s^2} < 1 \Rightarrow |5 - s| = \sqrt{(5 - s)^2} = \sqrt{25 + 10s - s^2} < 1$$


القاعدة المستخدمة

إذا كان $|s| < p$ فإن $s < p$ ، $s > -p \Rightarrow s \in (-p, p)$

إما $s^2 - 5s + 1 < 0$ ، $s^2 - 5s + 1 > 0$ بجمع (٥) للمتباينة

$\therefore s^2 < 6$ ، $s^2 > 4$ بالقسمة على (٢)

$\therefore s < \sqrt{6}$ ، $s > 2$



$\therefore s \in (2, \sqrt{6})$

مثال ٩- حل المتباينة $|s^2 - 4| + |2 - s| \geq 6$

الحل

$$\therefore |s^2 - 4| + |2 - s| \geq 6 \Rightarrow |s^2 - 4| \geq 4 \Rightarrow |s - 2| \geq 2 \Rightarrow s \leq 0 \text{ or } s \geq 4$$

المتباينة $|s^2 - 4| + |2 - s| \geq 6$ تكتب $|s - 2| \geq 4$

المتباينة تكون $|s - 2| \geq 4$

القاعدة المستخدمة إذا كان $|s| \geq p$ فإن $s \geq p$ أو $s \leq -p \Rightarrow s \in (-\infty, -p] \cup [p, \infty)$

$\therefore |s - 2| \geq 4 \Rightarrow s - 2 \geq 4 \text{ or } s - 2 \leq -4 \Rightarrow s \geq 6 \text{ or } s \leq -2$

$\therefore s \geq 6 \text{ or } s \leq -2$



\therefore حل المتباينة $s \in (-\infty, -2] \cup [6, \infty)$

تمارين

أكمل مايتأتى:

- ١ مجموعة حل المعادلة $|س| = \frac{1}{3}$ هي
- ٢ مجموعة حل المعادلة $|س| + ٣ = ٠$ هي
- ٣ مجموعة حل المتباينة $|س - ٢| \geq ٠$ هي

اختر من القائمة التالية مجموعة الحل المناسبة لكل معادلة أو متباينة ممايتأتى:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| ٤ $ س - ٢ = ٣$ | أ $[-١, ٥]$ |
| ٥ $ س - ٢ > ٣$ | ب $ع$ |
| ٦ $ س - ٢ < ٣$ | ج $\{٥, -١\}$ |
| ٧ $ س - ٢ \geq ٣$ | د $ع - [-١, ٥]$ |
| ٨ $ س - ٢ < ٣$ | هـ ϕ |
| ٩ $ س - ٢ = -٣$ | و $[-١, ٥]$ |

أوجد جبرياً مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| ١٠ $ س + ٣ = ٦$ | ١١ $ ٢س - ٧ = ٥$ | ١٢ $ ٣ - ٢س = ٧$ |
| ١٣ $ س - ٣ = س + ١ $ | ١٤ $ ٢س + ١ = س - ٣ $ | ١٥ $\sqrt{٢س - ١} + ١ = ٤$ |

أوجد بيانياً مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية:

- | | | |
|------------------|------------------------|-------------------|
| ١٦ $ س + ٤ = ٣$ | ١٧ $ س - ١ = س + ٣ $ | ١٨ $ ٢س - ٥ = ٣$ |
|------------------|------------------------|-------------------|

أوجد بيانياً مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية:

- | | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| ١٩ $ س - ١ > ٣$ | ٢٠ $ س - ٢ \geq ٥$ | ٢١ $ س + ٣ < ٢$ |
|------------------|---------------------|------------------|

أوجد جبرياً مجموعة الحل لكل من المتباينات الآتية:

- | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| ٢٢ $ ٢س - ١ < ٣$ | ٢٣ $ ٢س + ٣ \geq ٧$ | ٢٤ $ ٣س - ٧ \leq ٢$ |
|-------------------|----------------------|----------------------|

أمثلة عامة

مثال ١- ارسم الشكل البياني للدالة د(س) = |س - ٢| - ٣ + ١٠ واستنتج من الرسم المدى وابحث اطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك واستنتج مجموعة حل المعادلة |س - ٢| - ٣ = ١٠ وحقق ذلك جبرياً :

الحل

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \leq 2 : 8 + \text{س}^2 \\ \text{س} > 2 : 12 + \text{س}^2 \end{array} \right\} = \text{د(س)} = \left. \begin{array}{l} \text{س} \leq 2 : 10 + \text{س}^2 - 2 - 3 \\ \text{س} > 2 : 10 + \text{س}^2 - 2 + 3 \end{array} \right\}$$

المجال ح ، المدى ح ، د متناقصة على مجالها ،

الدالة ليست زوجية ولا فردية

$$\text{المعادلة } |س - 2| - 3 = 10$$

$$\text{هى } |س - 2| - 3 + 10 = 0$$

$$\text{هى د(س)} = 0 \therefore \text{مجموعة الحل} = \{4\}$$


الاحداثى السينى لتقاطع الدالة مع محور السينات

الحل الجبرى

$$- 2 + \text{س}^2 = 8 : \text{س} \leq 2 \Rightarrow \text{س} = 4 \text{ تحقق}$$

$$- 4 + \text{س}^2 = 12 : \text{س} > 2 \Rightarrow \text{س} = 3 \text{ لا تحقق}$$

$$\therefore \text{مجموعة الحل} = \{4\}$$




مثال ٢- ارسم د(س) = |س - ٣| + ١ ومن الرسم استنتج المدى وابحث اطرادها واستنتج مجموعة حل المعادلة د(س) = ٠ وحقق ذلك جبرياً .

الحل

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \leq 3 : 1 + (3 - \text{س})^2 \\ \text{س} > 3 : 1 + (\text{س} - 3)^2 \end{array} \right\} = \text{د(س)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{س} \leq 3 : 5 - \text{س}^2 = 1 + 6 - \text{س}^2 \\ \text{س} > 3 : 7 + \text{س}^2 = 1 + 6 + \text{س}^2 \end{array} \right\} =$$

$$\text{المدى} = [1, \infty) \therefore \text{مجموعة الحل} = \emptyset$$



الدالة متناقصة فى $[-\infty, 3]$ ، و متزايدة فى $[3, \infty]$


الحل الجبرى : د(س) = $س^2 - ٥ = ٠$: $س \leq ٣ \Leftrightarrow س = \frac{٥}{٢}$ $٣ \leq ٣$ لا تحقق

د(س) = $س^2 - ٧ = ٠$: $س > ٣ \Leftrightarrow س = \frac{٧}{٢}$ $٣ \geq ٣$ لا تحقق

∅ = مجموعة الحل .:

مثـ ٣ـال: ارسم منحنى الدالة د(س) = $٣ - |٢ س|$ واستنتج المدى وابحث اطرادها

وأثبت أنها زوجية ، ثم أوجد حل ① $٣ - |٢ س| = ١$ ② $٣ - |٢ س| \geq ١$



الحل

$$د(س) = \begin{cases} ٣ - ٢س & س \leq ٠ \\ ٣ + ٢س & س > ٠ \end{cases}$$

المدى = $[-\infty, ٣]$


د متزايدة فى $[-\infty, ٠]$ ، متناقصة فى $[٠, \infty]$

د زوجية لأن منحناها متماثل حول محور الصادات

① نرسم د $٣ - |٢ س| = ١$ إزاحة رأسية مقدارها $|٣|$ فى اتجاه وصـ

وانكماش لمنحنى الدالة ونرسم د(س) = ١

ومن الرسم نجد نقط التقاطع للدالتين مجموعة الحل = $\{١, -١\}$



$$② |٢ س| \leq ٢ \Leftrightarrow ٢ \leq ٢س \leq ٢ \text{ ، } ٢ \geq ٢س \geq ٢$$

$$\therefore س \leq ١ \text{ ، } ١ \geq س \therefore س \in [-١, ١]$$

مثـ ٤ـال: عين مجال د(س) = $\sqrt{١ - |س|}$

الحل

$$\therefore ١ - |س| \geq ٠$$

$$\therefore |س| \leq ١$$

$$\therefore ١ - س \geq ٠ \text{ ، } ١ + س \geq ٠$$

$$\therefore |س| \leq ١$$

$$\therefore ١ \geq س \geq -١$$

$$\therefore ١ + ٠ \geq س \geq ١ + ٠$$

$$\therefore س \in [-١, ١]$$

$$\therefore ١ \geq س \geq -١$$



مذكرة الجبر (الدوال الحقيقية) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثال ٥- ارسـم منحنى الدالة د(س) = س |س| + ٤ ومن الرسم استنتج مدى الدالة واطرادها ، ثم حل المعادلة: س |س| + ٤ = (س+٢)٢ بيانياً

الحـل
 د(س) = $\begin{cases} س^2 + ٤ : س \leq ٠ \\ -س^2 + ٤ : س > ٠ \end{cases}$ إزاحة رأسية مقدارها ٤ فى اتجاه وص
 انعكاس للمنحنى ، إزاحة ٤ فى اتجاه وص
 المدى ح

د متزايدة على مجالها


الحل البيانى

نرسم د_١(س) = س |س| + ٤

ونرسم د_٢(س) = (س+٢)٢

ومن الرسم: الاحداثى السينى لنقط تقاطع الدالتين س

مجموعة الحل = { -٢ ، ٠ ، ٢ }




مثال ٥ ارسـم منحنى الدالة د(س) = $\frac{٣-س}{١-س}$ واذكر المجال والمدى وابحث اطرادها واذكر نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك :

الحـل

$$د(س) = \frac{١ + (١-س)^٣}{١-س} = \frac{٣ + ٢ - (٣-س)}{١-س}$$

$$د(س) = ٣ + \frac{١}{١-س}$$



إزاحة أفقية |١| ورأسية |٣| نقطة التماثل (٣ ، ١)




المجال = ح - {١} ، المدى = ح - {٣}

د متناقصة فى [١ ، ∞) ، [-∞ ، ١]

الدالة لا فردية ولا زوجية

تمارين عامة على الوحدة

١) في كل من الأشكال البيانية الآتية عين مدى الدالة، وابحث اطرادها ثم بين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك:



٢) أوجد مجال كل من الدوال المعرفة بالقواعد الآتية:

ج د_٣(س) = $\frac{1-2س}{1+2س}$

ب د_٤(س) = $\frac{س^2}{3-2س-س^2}$

أ د_١(س) = $س^2 + س + 3$

٣) استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = |س| لتمثيل الدالة ر بيانياً ثم ابحث اطرادها:

ج ر(س) = $3 - |2 + س|$

ب ر(س) = $|س| - 2$

أ ر(س) = $|س - 1|$

٤) استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = س^٢ لتمثيل ما يأتي بيانياً:

ج ر_٣(س) = $1 + (2 - س)^2$

ب ر_٢(س) = $س^2 - 2$

أ ر_١(س) = $3 - س^2$

ثم أوجد معادلة محور التماثل لكل منها.

٥) استخدم منحنى الدالة د، حيث د(س) = س^٣ لتمثيل ما يلي بيانياً:

ج ر_٣(س) = $2 - (1 - س)^3$

ب ر_٢(س) = $-(1 - س)^3$

أ ر_١(س) = $(3 + س)^3$

ثم عين نقطة تماثل منحنى الدالة.

٦) استخدم منحنى الدالة د حيث د(س) = $\frac{1}{س}$ ، س ≠ ٠ لتمثيل ما يلي بيانياً:

ج د_٣(س) = $\frac{1}{2-س}$

ب د_٤(س) = $2 - \frac{1}{س}$

أ د_١(س) = $1 + \frac{1}{س}$

٧) أوجد مجموعة حل المعادلات والمتباينات الآتية بيانياً .

ج $2 \leq |3 + س|$

ب $3 > |س - 5|$

أ $3 = |س - 5|$

٨) أوجد مجموعة حل المعادلات والمتباينات الآتية جبرياً:

ج $7 \geq |س - 5|$

ب $٥ = |٣ - ٢س|$

أ $٤ = |س - ٣|$

مذكر في الجبر

الأسس و اللوغاريتمات

الصف الثاني الثانوي

القسم العلمي

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠

الأسس واللوغاريتمات وتطبيقات عليها

- الأسس الكسرية
- الدالة الأسية وتطبيقاتها
- المعادلات الأسية • الدالة العكسية

• الدوال اللوغاريتمية وتمثيلها البياني

• بعض خواص اللوغاريتمات

متمنى توجيهِ الرياضيات

أ. عادل إمام

الأسس الصحيحة

تعريف ١ $\forall s \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } :$

$$s^n = s \times s \times s \times \dots \times s \text{ إلى } n \text{ من العوامل.}$$

مثال ١ $s^0 = s \times s \times s \times \dots \times s$ إلى ١٥ عوامل

تعريف ٢ $\forall s \in \mathbb{N}^* \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n} \text{ حيث } n \in \mathbb{N}^+$

مثال ٢ $(3)^{-1} = \frac{1}{3}$ ، $(-2)^{-1} = -\frac{1}{2}$ ، $(13)^{-1} = \frac{1}{13}$

تعريف ٣ $\forall s \in \mathbb{N}^* \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n} \text{ حيث } n \in \mathbb{N}^+$

مثال ٣ $s^{-n} = \frac{1}{s^n}$

قوانين الأسس الصحيحة

$\forall m, n \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } :$

(١) $s^m \times s^n = s^{m+n}$

$\forall s \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } s^0 = 1$

(٢) $s^m \div s^n = s^{m-n}$

$\forall s \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n}$

(٣) $(s^m)^n = s^{m \times n}$

$\forall s \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n}$

(٤) $(s^m \times s^n)^k = s^{m \times k} \times s^{n \times k}$

$\forall s \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n}$

(٥) $\left(\frac{s^m}{s^n}\right)^k = \frac{s^{m \times k}}{s^{n \times k}}$

$\forall s \in \mathbb{N}^+ \text{ فإن } s^{-n} = \frac{1}{s^n}$

مثال ١: اختصر لأبسط صورة $\frac{(64)^3 \times (27)^4}{(144)^0}$

الحل

$$\frac{9}{4} = \frac{(3)^2}{(2)^2} = \frac{{}^{12}(3) \times {}^{18}(2)}{{}^{10}(3) \times {}^{20}(2)} = \frac{[{}^3(3)] \times [{}^6(2)]}{[{}^2(3)] \times [{}^4(2)]} = \text{المقدار}$$

مثال ٢- اختصر لأبسط صورة
$$\frac{(4)^{2n+1} \times (2)^{n-1}}{(8)^{n+2}}$$

الحل

المقدار
$$\frac{(2)^{2n+1} \times (2)^{n-1}}{(2)^{3n+3}} = \frac{(2)^{2n+1} \times (2)^{n-1} [2^1]}{(2)^{3n+3} [2^1]} =$$

$$(2)^{2n+1+n-1-3n-3} = (2)^{-1} = \frac{1}{2}$$

مثال ٣- اختصر لأبسط صورة
$$\frac{(12)^2 \times (81)^{-2}}{(27)^{-3} \times 16}$$

الحل

المقدار
$$\frac{(2)^2 \times (3)^{-8} \times (2)^{-6}}{(3)^{-9} \times (2)^4} = \frac{(2)^{-4} \times (3)^{-8} [2^4 \times (3)^3]}{(3)^{-9} \times (2)^4 [2^4 \times (3)^3]} =$$

$$(2)^{-4+4-4} \times (3)^{-8+9-3} = (2)^{-4} \times (3)^{-2} = \frac{1}{144}$$

الجذر النونى: للعدد m هو العملية العكسية لرفع هذا العدد للقوة (n) ويرمز للجذر النونى

للععد m بالرمز $\sqrt[n]{m}$ ويسمى n دليل الجذر $[\sqrt[n]{m} = s \text{ إذا كان } s^n = m]$

ملاحظات:

المعادلة: $s^n = m$ لها n من الجذور وإذا كان

(١) n عدد زوجى ، $m < 0$ لها جذران حقيقيان أحدهما موجب والآخر سالب

وباقى الجذور أعداد مركبة غير حقيقية (عندما: $n < 2$) $[\sqrt[n]{a} = \pm \sqrt[n]{a}]$

(٢) n عدد زوجى ، $m > 0$ ليس لها جذور حقيقية أى أن الجذور أعداد مركبة

غير حقيقية [حل: $s^n = -64$ هو $s = \sqrt[n]{-64} = \pm 4i$]

(٣) n عدد فردى ، $m \neq 0$ لها جذر حقيقى وحيد وباقى الجذور أعداد

مركبة [حل: $s^3 = -27$ هو $s = \sqrt[3]{-27} = -3$ وجذرين مركبين]

إعداد m / عادل إدوار

(٢)

منتهى توجبه الرياضيات

مثـ٤ـال: مجموعة حل المعادلة (س - ٣) = ١٢٨ فى ح

الحـل: ∴ (س - ٣) = ١٢٨ = ٢ = ٢ ← س - ٣ = ٢ ∴ م.ع = {٥}

مثـ٥ـال: مجموعة حل المعادلة ٣ س - ٥ = ٢٣٩ فى ح

الحـل: ٣ س - ٥ = ٢٣٩ = ٢٤٣ ← س = ٢٤٣ ÷ ٣ = ٨١

∴ س = ٨١ = ٣ ± ∴ م.ع = {٣، -٣}

مثـ٦ـال: مجموعة حل المعادلة ٣ س - ٦٤ = ٦٤ فى ح

الحـل: ∴ س = ٦٤ = ٦٤ = ٤ ∴ م.ع = {٤}

مثـ٧ـال: مجموعة حل المعادلة ٦٢٥ = ٦٢٥ فى ح

الحـل: - ٦٢٥ > ٠ ، القوة زوجى ∴ م.ع = ∅

الأسس الكسرية

تعريف ١: $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ حيث $a > 0$ ، $n \in \mathbb{N}$ ويكون $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

فمثلاً: $\sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$ ، $\sqrt[4]{16} = 16^{\frac{1}{4}} = 2$ ، $\sqrt[5]{3125} = 3125^{\frac{1}{5}} = 5$

تعريف ٢: إذا كان $a > 0$ ، $m \in \mathbb{N}$ ، $n \in \mathbb{N}$ ، $n \neq 0$ ، $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$

فإن $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$

ملاحظة: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$

فمثلاً: $\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}} = 2$ ، $\sqrt[4]{16} = 16^{\frac{1}{4}} = 2$ ، $\sqrt[5]{3125} = 3125^{\frac{1}{5}} = 5$

ملاحظات: * إذا كان $a > 0$ ، $m \in \mathbb{N}$ ، $n \in \mathbb{N}$ ، $n \neq 0$ ، $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$

إذا كان $a < 0$ ، $m \in \mathbb{N}$ ، $n \in \mathbb{N}$ ، $n \neq 0$ ، $a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$

فمثلاً: $\sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = -2$ ، $\sqrt[4]{16} = 16^{\frac{1}{4}} = 2$ ، $\sqrt[5]{-3125} = (-3125)^{\frac{1}{5}} = -5$

مذكرة الجبر (الأسس واللوغاريتمات) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

* إذا كان $s = \sqrt[n]{m}$ فإن: $s = \sqrt[n]{m}$ حيث m عدد فردى
 * إذا كان $s = \sqrt[n]{m}$ فإن: $s = \pm \sqrt[n]{m}$ حيث m عدد زوجى

بشرط أن يكون m ، n ليس بينهما عامل مشترك

استخدام المقياس: $||m| = \sqrt[n]{m}$ إذا كان n عدد زوجى ، $m = \sqrt[n]{m}$ إذا كان n عدد فردى

مثال ١: أوجد فى أبسط صورة

① $\sqrt[5]{(5\sqrt{2}-2)}$ ② $\sqrt[4]{(3\sqrt{2}-2)}$ ③ $\sqrt[6]{(\sqrt{7}-1)}$

(الحل)

① $\sqrt[5]{(5\sqrt{2}-2)} = \sqrt[5]{(5\sqrt{2}-2)}$: القوى عدداً فردياً

② $\sqrt[4]{(3\sqrt{2}-2)} = |3\sqrt{2}-2| = \sqrt[4]{(3\sqrt{2}-2)}$: $3\sqrt{2} < 2$

③ $\sqrt[6]{(\sqrt{7}-1)} = |\sqrt{7}-1| = \sqrt[6]{(\sqrt{7}-1)}$: $\sqrt{7} > 1$

مثال ٢: أوجد فى أبسط صورة

① $\sqrt[10]{32\sqrt{2}}$ ② $\sqrt[12]{81\sqrt{2}}$ ③ $\sqrt[3]{(\frac{1}{\sqrt{7}}+7)}$

(الحل)

① $\sqrt[10]{32\sqrt{2}} = \sqrt[10]{2^5 \times 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt[10]{2^{\frac{11}{2}}} = \sqrt[10]{2^{\frac{11}{2}}}$

② $\sqrt[12]{81\sqrt{2}} = \sqrt[12]{3^4 \times 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt[12]{3^4 \times 2^{\frac{1}{2}}}$

③ $\sqrt[3]{(\frac{1}{\sqrt{7}}+7)} = \sqrt[3]{(\frac{1}{\sqrt{7}}+7)} = \sqrt[3]{(\frac{1}{\sqrt{7}}+7)} = \sqrt[3]{(\frac{1}{\sqrt{7}}+7)}$

④ $\sqrt[2]{(2\sqrt{2}-5)}$ ⑤ $\sqrt[4]{(5\sqrt{2}-2)}$

⑥ $\sqrt[3]{(4\sqrt{2}-2)}$

(الحل)

المقدار = $\frac{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}$

$\frac{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}$

$\frac{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}}}$

(٤)

منتدى توجيہ الرياضيات

إعداد / عادل إدوار

$$512\sqrt[12]{x} = \sqrt[3]{(8)}\sqrt[12]{x} = 8\sqrt[12]{x}$$

الترتيب هو $512\sqrt[12]{x}$ ، $625\sqrt[12]{x}$ ، $729\sqrt[12]{x}$ هو $8\sqrt[12]{x}$ ، $5\sqrt[12]{x}$ ، $3\sqrt[12]{x}$

مثال ١١ حل المعادلة $125 = x^3$

الحل

$$x = \sqrt[3]{(125)} = \sqrt[3]{(5^3)} = 5 \quad \therefore \text{م.ع.} = \{5\}$$

مثال ١٢ حل المعادلة : $32 = (x-1)^5$

الحل

$$8 = \sqrt[5]{(x-1)} = \sqrt[5]{(2^5)} = (x-1) \quad D \quad 32 = (x-1)^5 \quad \therefore \text{م.ع.} = \{5\}$$

مثال ١٣ حل المعادلة : $0 = x^3 + 4x - 4$

الحل

$$0 = (x^3 - 1) + (4x - 4) = (x-1)(x^2+x+1) + 4(x-1)$$

$$0 = (x-1)(x^2+x+1+4) = (x-1)(x^2+x+5)$$

$$\therefore x-1=0 \quad \text{أو} \quad x^2+x+5=0 \quad \therefore x=1 \quad \text{أو} \quad x = \frac{-1 \pm \sqrt{1-20}}{2}$$

$$\therefore \text{م.ع.} = \{1, \frac{-1 \pm \sqrt{1-20}}{2}\}$$

مثال ١٤ حل المعادلة $2 = x^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{2}{5}}$

الحل

$$2 = x^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{2}{5}} \quad \text{المعادلة}$$

$$2 = x^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{2}{5}} \quad \therefore (2) \times (x^{\frac{4}{5}})$$

$$2x^{\frac{4}{5}} = x^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{2}{5}} \quad \therefore (2) \times (x^{\frac{1}{5}}) \quad \therefore 2x^{\frac{1}{5}} = x^{\frac{1}{5}} - x^{\frac{2}{5}}$$

$$\therefore x = \frac{1}{4}$$

$$\text{بضرب كل من الطرفين} \times \frac{1}{4}$$

مثه ١٥ حل المعادلة $(س - \frac{1}{4})^{\frac{1}{3}} = (٨١)^{-\frac{1}{4}}$

الحـل

$$١-(٣) = \frac{1}{4}^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4}^{\frac{1}{3}} (س - \frac{1}{4})^{\frac{1}{3}}$$

$$\frac{1}{4}^{\frac{1}{3}} = (س - \frac{1}{4})^{\frac{1}{3}} \therefore ٣-(٣) = ٣[١-(٣)] = (س - \frac{1}{4})^{\frac{1}{3}}$$

$$\therefore س = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

مثه ١٦ إذا كان $س^{\frac{3}{4}} = ٢$ ص $٢ = ٢$ فأوجد قيمة: $س - ١٠$

الحـل

$$س^{\frac{3}{4}} = ٢ \therefore ٢ = ٢^{\frac{3}{4}} (س)^{\frac{3}{4}} \therefore ٢ = ٢^{\frac{3}{4}} [٢^{\frac{3}{4}}] = س \Leftarrow ٢ = ٢^{\frac{3}{4}} [٢^{\frac{3}{4}}] = س$$

$$٨ = ٢^{\frac{3}{4}} [٢^{\frac{3}{4}}] = س \therefore ٨ = ٢^{\frac{3}{4}} [٢^{\frac{3}{4}}] = س \therefore ٨ = ٢^{\frac{3}{4}} [٢^{\frac{3}{4}}] = س$$

$$\therefore س - ١٠ = ٨ - ٢٥٦ = ٨ \times ١٠ - ٢٥٦ = ٨٠ - ٢٥٦ = ١٧٦$$

مثه ١٧ أختصر لأبسط صورة : $\frac{(٤٩)^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}} \times (١٦)^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}}}{(٣٤٣)^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}} \times (٤)^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}}}$

الحـل

$$\frac{(٢)^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}} \times (٧)^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}}}{(٧)^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}} \times (٢)^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}}} = \frac{[٢^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}}] \times [٧^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}}]}{[٧^{\frac{1}{4} + س^{\frac{3}{4}}}] \times [٢^{\frac{1}{3} - س^{\frac{3}{4}}}]}$$

$$\frac{1}{7} = ١-(٧) = \frac{1}{7} - س^{\frac{3}{4}} - \frac{1}{7} + س^{\frac{3}{4}} (٧) =$$

مثال ١٨ اختصر لأبسط صورة :
$$\frac{(٦٢٥)^{\frac{١}{٤}} \times (٢٧)^{\frac{١}{٣}}}{(٢٢٥)^{\frac{٣}{٤}} \times ٢٥^{\frac{١}{٢}}}$$

المقدار
$$\frac{(٣)^{\frac{١}{٣}} \times (٥)^{\frac{٣}{٣}}}{٥ \times (٣)^{\frac{٣}{٣}}} = \frac{[٣]^{\frac{١}{٣}} \times [٥]^{\frac{٣}{٣}}}{٥ \times [٣]^{\frac{٣}{٣}}}$$

$$\frac{١}{١٥} = (٣)^{\frac{٣}{٣} - \frac{١}{٣}} \times (٥)^{\frac{١}{٣} - \frac{٣}{٣}} = (٣)^{\frac{٢}{٣}} \times (٥)^{-\frac{٢}{٣}} = \frac{١}{١٥}$$




تمارين على المعادلات الأسية

١	أوجد قيمة كل ممايأتى فى أبسط صورة: <p>أ $(١٦)^{\frac{٣}{٤}}$ ب $(٣٢)^{-\frac{٣}{٥}}$ ج $٢٧^{-\frac{٢}{٣}}$</p> <p>د $\frac{١}{٤}(\frac{١}{٤}) + \frac{١}{٨}(\frac{١}{٨})$ هـ $\frac{\sqrt[٤]{٤}}{\sqrt[٢]{٢}}$ و $\frac{١}{٢ - (\frac{٢}{٣} \times \frac{١}{٤} \times \frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢})}$</p>
٢	أوجد فى أبسط صورة ناتج العمليات لآتية: <p>أ $٢ - (\frac{٢}{٣} - ١)$ ب $\sqrt[٣]{٢} \times \sqrt[٣]{٢}$ ج $\sqrt[٣]{٢٤ + ٢٣}$</p> <p>د $(\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٢})(\sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٢})$ هـ $(\sqrt[٣]{٢} - \sqrt[٣]{٢})(\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٢})$ و $(\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٢})(\sqrt[٣]{٢} + \sqrt[٣]{٢})$</p>
٣	اختصر كلأ ممايأتى لأبسط صورة: <p>أ $\sqrt[٥]{١٢} + \sqrt[٥]{٢٤٣}$ ب $(\frac{١٦}{٨١})^{\frac{١}{٣}} \times (\frac{٧٢٩}{٨})^{\frac{١}{٣}}$ ج $\frac{٢}{٣}(٨) \div \frac{٢}{٣}(١٦)$</p> <p>د $\frac{٥}{٦}(٦٤) - \frac{٢}{٣}(٢٧)$ هـ $\sqrt[٥]{٢,٥} \times \sqrt[٥]{٠,٢١٦} \times \sqrt[٥]{٠,١}$ و $\frac{\frac{١}{٣} + \frac{١}{٩} \times \frac{١}{٣} - \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٩}}{\frac{١}{٣} + \frac{١}{٩} \times \frac{١}{٣} - \frac{١}{٣} \times \frac{١}{٩}}$</p>

الدالة العكسية

إذا كانت د أحادية من سـ إلى صـ فإن: الدالة د^{-١} تسمى دالة عكسية للدالة د

من صـ إلى سـ إذا كان: لكل (ب ، م) \Rightarrow بين د فإن (ب ، م) \Rightarrow د^{-١}



فمثلاً:

د^{-١}: صـ ← سـ دالة عكسية للدالة د
 $\{ (٤, ٦), (٣, ٥), (٢, ٢), (١, ٤) \} = د^{-١}$

الدالة: سـ ← صـ لها د^{-١} عكسية
 $\{ (٦, ٤), (٥, ٣), (٢, ٢), (٤, ١) \} = د$

د: سـ ← صـ ليست أحادية
 لا يمكن إيجاد دالة عكسية لها

مثال: ١- أى من الدوال الآتية لها دالة عكسية . ثم أوجد الدالة العكسية إن أمكن

① $د = \{ (٠, ٥), (١, ١), (٢, ٣), (١, ٤) \}$

② $د = \{ (٢, ٣), (٥, ٢), (٢, ١) \}$

③ $د = ٣ = ٥ + ٢س : س = \{ ٣, ١, ١ \}$

الحل

① د لها دالة عكسية ، د^{-١} = $\{ (٠, ٥), (١, ١), (٣, ٢), (٤, ١) \}$

② د ليس لها دالة عكسية : لأن العنصران ١- ، ٣ لهما نفس الصورة (الدالة غير أحادية)

③ $د = \{ (١١, ٣), (٧, ١), (٣, ١) \}$ لها دالة عكسية

د^{-١} = $\{ (٣, ١١), (١, ٧), (١, ٣) \}$

ملاحظات:

(١) يمكن إيجاد قاعدة د^{-١} مباشرة بتبديل المتغيرين س ، ص ثم إيجاد ص بدلالة س

فمثلاً: فى المثال السابق $د = ص = ٥ + ٢س$ وبتبديل المتغيرين

$س = ٥ + ٢ص \Rightarrow ٥ - س = ٢ص \Rightarrow د^{-١} = \frac{١}{٢(٥ - س)}$

حيث: $\frac{١}{٥ + ٢س} \neq \frac{١}{٢(٥ - س)}$

(٢) د^{-١} (س) $\neq \frac{١}{د(س)}$

إعداد / عادل إدوار


(١٠)

منتهى توجبه الرياضيات

مثال ٢- أوجد الدالة العكسية للدالة $D(s) = \frac{1}{3}s - 3$ ومثل الدالة ومعكوسها بيانياً فى شكل واحد

الحل

لإيجاد الدالة العكسية للدالة $D(s) = \frac{1}{3}s - 3$ بتبديل المتغيرين $s = \frac{1}{3}v + 1$ $\therefore \frac{1}{3}v = s - 1$ $\therefore v = 3s - 3$ $\therefore D^{-1}(s) = 3s - 3$



$D^{-1}(s) = 3s - 3$				$D(s) = \frac{1}{3}s - 3$			
٣	١	٠	س	٣	٠	٣-	س
٣	٠	٣-	$D^{-1}(s)$	٢	١	٠	$D(s)$

نلاحظ : أن الدالة $D(s)$ والدالة $D^{-1}(s)$

متماثلتان بالنسبة للمستقيم $v = s$

أى: أن D ، D^{-1} كلاهما صورة للأخرى بالانعكاس فى المستقيم $v = s$

خواص الدالة العكسية .

(١) يقال إن D ، r عكسية للأخرى إذا كان $(r \circ D)(s) = s$ ، $(D \circ r)(s) = s$

(٢) مجال الدالة $D =$ مدى الدالة العكسية $D^{-1}(s)$ ،

مدى الدالة $D =$ مجال الدالة العكسية $D^{-1}(s)$

مثال ٣- أوجد الدالة العكسية للدالة $D(s) = \frac{3+s}{2}$ ، $r(s) = \frac{3+s}{2}$ ، $r \circ D(s) = s$ ، $D \circ r(s) = s$

الحل

$$\therefore (r \circ D)(s) = s \Rightarrow r\left(\frac{3+s}{2}\right) = s \Rightarrow \frac{3 + \left(\frac{3+s}{2}\right)}{2} = s$$

$$\Rightarrow \frac{3 + \frac{3+s}{2}}{2} = s \Rightarrow \frac{3 + \frac{3+s}{2}}{2} = s \Rightarrow \frac{3 + \frac{3+s}{2}}{2} = s$$

$\therefore D$ ، r دالة عكسية للأخرى

مثـ٤ـال: حقق أن كلاً من : د ، ر حيث د(س) = س^٢ + ٤ : س ≤ ٠ ،
ر(س) = س - ٤ دالة عكسية للأخرى . ثم أوجد مجال ومدى كلاً منهما

الحـل

$$\therefore (د \circ ر)(س) = (ر(س)) د = (س - ٤) د = (س - ٤)(س^2 + ٤) = (س - ٤)(س + ٤) = س^2 - ١٦ = س،$$

$$(ر \circ د)(س) = (د(س)) ر = (س^2 + ٤) ر = (س^2 + ٤)(س - ٤) = س^3 - ٤س^2 + ٤س - ١٦ = س \quad \therefore س \leq ٠ \quad \therefore (ر \circ د)(س) = س \quad \therefore د ، ر دالة عكسية للأخرى$$

$$\text{الدالة د(س) المجال } [٠, \infty) \text{ والمدى لها }]-\infty, ٤]$$

$$\text{الدالة ر(س) المجال }]-\infty, ٤] \text{ والمدى لها } [٠, \infty)$$

مثـ٥ـال: إذا كانت الدالتين : د ، ر حيث د(س) = ٢س + ١ ، ر(س) = ٣ + س
دالة عكسية للأخرى . فما قيمة كلاً من ١ ، ب ؟

الحـل

$$\therefore د(س) = ٢س + ١ = ص \quad \text{بتبديل المتغيرين} \quad \therefore س = \frac{ص - ١}{٢} \quad \therefore ٢س + ١ = ص$$

$$\therefore ٢\left(\frac{ص - ١}{٢}\right) + ١ = ص \quad \therefore ص - ١ + ١ = ص \quad \therefore ص = ص \quad \therefore د(س) = ٢س + ١ = ص$$

$$\therefore ر(س) = ٣ + س = ص \quad \therefore س = ص - ٣ \quad \therefore ر(ص - ٣) = ٣ + (ص - ٣) = ص \quad \therefore ر(س) = ٣ + س = ص$$

تمارين على الدالة العكسية

١	<p>١ إذا كانت الدالة د = (١، ٤)، (٢، ٣)، (٣، ٢)، (٤، ١) فإن د^{-١} = _____</p> <p>٢ صورة النقطة (١، ٣) بالانعكاس في المستقيم ص = س هي النقطة _____</p> <p>٣ إذا كانت د دالة أحادية وكان د(٢) = ٦ فإن د^{-١}(٦) = _____</p>
٢	<p>أوجد الدالة العكسية لكل من الدوال الآتية:</p> <p>١ د(س) = $\frac{١}{٢}س + ٤$ ب د(س) = $\frac{١}{٢}س - ٤$</p>
٣	<p>في كل مما يأتي عين المجال الذي يكون فيه للدالة د دالة عكسية:</p> <p>١ د(س) = س^٢ ب د(س) = $\frac{١}{٢}س$</p>
٤	<p>في كل مما يأتي عين المجال الذي يكون فيه للدالة د دالة عكسية:</p> <p>١ د(س) = س^٢ ب د(س) = س^٢ ج د(س) = $\frac{١}{٢}س$</p>

الدالة الأسية

تعريف: إذا كان $m \in \mathbb{R}^+$ - $\{1\}$ فإن الدالة $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ حيث $d(s) = m^s$ تسمى دالة أسية أساسها m .

التمثيل البياني للدالة الأسية

إذا كانت: m عدداً حقيقياً موجباً $m \neq 1$ فإن الدالة $d: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ حيث $d(s) = m^s$ تسمى دالة أسية أساسها m

خواص الدالة الأسية

(١) إذا كانت: $0 < m < 1$

المنحنى يمر بالنقطة $(1, 0)$


المجال \mathbb{R}

المدى \mathbb{R}^+ ؛ $[0, \infty)$

الدالة تزايدية على \mathbb{R}

الدالة ليست زوجية وليست فردية

المنحنى يقع بكامله فوق محور السينات



(٢) إذا كانت: $0 < m < 1$

المنحنى يمر بالنقطة $(1, 0)$


المجال \mathbb{R}

المدى \mathbb{R}^+ ؛ $[0, \infty)$

الدالة تناقصية على \mathbb{R}

الدالة ليست زوجية وليست فردية

المنحنى يقع بكامله فوق محور السينات



ملاحظة: إذا كانت $d(s) = m^s$ فإن المنحنى $v = d(s + b)$ أى $v = m^{s+b}$

يمثله $v = m^s$ بإزاحة أفقية مقدارها $|b|$

فى اتجاه \overleftarrow{s} إذا كان: $b > 0$ ، فى اتجاه \overrightarrow{s} إذا كان: $b < 0$

إعداد / عادل إدوار

(١٣)


منذى توجبه الرياضيات

مثال ١- أرسم منحنى الدالة $d(s) = s^3$ في الفترة $[-3, 4]$ ومن الرسم

أوجد : ① $d(-0.5)$ ② $d(1.5)$ ③ قيمة تقريبية للعدد $\sqrt[3]{32}$

الحل

س	٤	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
ص	١٦	٨	٤	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$



لإيجاد قيمة $d(-0.5)$:

نرسم مستقيماً عند -0.5 يوازي محور الصادات

ليقابل المنحنى عند نقطة فنجدها ≈ 0.125

$\therefore d(-0.5) \approx 0.125$

لإيجاد قيمة $d(1.5)$ نرسم كما سبق

نجد أن : $d(1.5) \approx 3.375$

لإيجاد قيمة $\sqrt[3]{32}$ نلاحظ أن : $d(2) = 8$


\therefore نوجد $d(\frac{2}{3}) = (\frac{8}{27})$

و نرسم كما في السابق \therefore قيمة $\sqrt[3]{32} \approx 3.17$

مثال ٢- أرسم منحنى الدالة $d(s) = s^3$ حيث $d(s) = s^3$ ومن الرسم أوجد

: ① $d(1.5)$ ② قيمة s إذا كان : $d(s) = 8$ ③ $\sqrt[3]{32}$

س	٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-
ص	٢٧	٩	٣	١	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$



المجال s ، المدى s^3 ، متزايدة على مجالها

① $d(1.5) = 3.375$

② $s = 2$

③ $\sqrt[3]{32} \approx 3.17$

مثال ٣- أرسـم منحنى الدالة $D(s) = \left(\frac{1}{s}\right)^{s+1}$ فى الفترة $[-3, 4]$ و من الرسم أوجد : ① د $(-3, 0)$ ② $\sqrt[4]{2}$ ③ حل المعادلة $D(s) = 7$


الحل

س	٣	٢	١	٠	١	٢	٣	٤
ص	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	١	٢	٤	٨

من الرسم : د $(-3, 0) \approx 5,3$

القيمة التقريبية للعدد $\sqrt[4]{2} \approx$

قيمة س عندما $D(s) = 7$
س $\approx -2,8$ تقريباً



مثال ٤- أرسـم منحنى الدالة $D : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ حيث $D(s) = \left(\frac{1}{s}\right)^s$ ومن الرسم أوجد : ① د $(-2, 1)$ ② قيمة س إذا كان : $D(s) = 20$

الحل


س	٣	٢	١	٠	١	٢	٣
ص	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	١	٣	٩	٢٧

المجال \mathbb{R}^+ ، المدى \mathbb{R}^+

، تناقصية على مجالها

① د $(-2, 1) \approx 3,7$

② د $D(s) = 20$ من الرسم $\approx -2,8$



مثال ٥ : إذا كانت : $(س) = (٢)^س$ فأثبت أن : $\frac{٤٠}{٩} = \frac{د(س+٥) + د(س+٣)}{د(س+٣) + د(س)}$

الحل

$$\frac{[١ + (٢)^س]^س(٢)}{[١ + (٢)^س]^س(٢)} = \frac{[١ + (٢)^س+٥] + [١ + (٢)^س+٣]}{[١ + (٢)^س+٣] + [١ + (٢)^س+٥]} = \frac{٤٠}{٩} = \frac{٥ \times ٨}{٩} = \frac{[١ + ٤]^س(٢)}{[١ + ٨]}$$

مثال ٦ : إذا كانت : $(س) = (٣)^{س-١}$ فأثبت أن : $\frac{د(س+١) \times د(س+٢)}{د(س+٣)} = د(س)$

الحل

$$\frac{١ + (٣)^{س+٢} \times (٣)^{س+١}}{(٣)^{س+٣}} = \frac{١ + (٣)^{س+١-١} \times (٣)^{س+٢-١}}{(٣)^{س+١-١}} = \frac{١ + (٣)^{س+٦}}{(٣)^{س+٣}} = د(س) = (٣)^{١-س-٢} = (٣)^{٢-س-١} = (٣)^{١+س-٦} = \frac{(٣)^{١+س-٦}}{(٣)^{س+٣}}$$

مثال ٧ : إذا كانت : $(س) = (٢)^س$ ، $(س) = (\frac{١}{٢})^س$ فأوجد قيمة : $\frac{د(٢) - د(\frac{٥}{٢})}{د(١) - د(\frac{٣}{٢})}$

الحل

$$\frac{٢(٢) - \frac{٥}{٢}(٢)}{(٢) - \frac{٣}{٢}(٢)} = \frac{٢ - (\frac{١}{٢}) - \frac{٥}{٢}}{١ - (\frac{١}{٢}) - \frac{٣}{٢}} = ٢ = \frac{[١ - \frac{١}{٢}(٢)]^٢(٢)}{[١ - \frac{١}{٢}(٢)](٢)}$$

مثال ٨ : إذا كانت : $(س) = (٥)^س$ فأثبت أن : $\frac{د(س+٤) - د(س+٣)}{د(س+٥) - د(س+٤)} = \frac{٤٠}{٩}$

الحل

$$\frac{١}{٥} = \frac{١ - ٥}{٥ - ٢٥} = \frac{[١ - (٥)]^{س+٥}}{[٥ - (٥)^٢]^{س+٥}} = \frac{٢+س(٥) - ٤+س(٥)}{٤+س(٥) - ٥+س(٥)} = \frac{١}{٥}$$

تطبيقات على الدالة الأسية:

[١] النمو الأسى : الدالة د: $(\nu) = \mu (1 + r)^\nu$ تستخدم لتمثيل النمو الأسى بنسبة

مئوية ثابتة : μ القيمة الابتدائية ، r النسبة المئوية ، ν الفترة الزمنية
الربح المركب: عند حساب جملة مبلغ (ج) لمبلغ (μ) فى إحدى البنوك بربح سنوى r

$$\text{المبلغ تعطى بالعلاقة } ج = \mu (1 + \frac{r}{s})^\nu$$

[٢] التضائل الأسى: الدالة د: $(\nu) = \mu (1 - r)^\nu$ تستخدم لتمثيل النمو الأسى بنسبة

مئوية ثابتة : μ القيمة الابتدائية ، r نسبة التضائل ، ν الفترة الزمنية

مثال ٩- أودع رجل مبلغ ٢٠٠٠ جنية فى إحدى البنوك التى تعطى فائدة سنوية مركبة ٧٪ أوجد جملة المبلغ بعد مرور ١٠ سنوات فى كلاً من الحالات الآتية:

Ⓐ العائد السنوى ب) العائد النصف سنوى ج) العائد شهرى

الحل

Ⓐ :: العائد السنوى أى أن عدد فترات التقسيم = ١ :: $s = 1$

$$\therefore ج = \mu (1 + \frac{r}{s})^\nu = 2000 (1 + \frac{0,07}{1})^{10} = 3934,3 \text{ جنية}$$

ب) :: العائد نصف سنوى أى أن عدد فترات التقسيم = ٢ :: $s = 2$

$$\therefore ج = \mu (1 + \frac{r}{s})^\nu = 2000 (1 + \frac{0,07}{2})^{2 \times 10} = 3979,6 \text{ جنية}$$

ج) :: العائد شهرى أى أن عدد فترات التقسيم = ١٢ :: $s = 12$

$$\therefore ج = \mu (1 + \frac{r}{s})^\nu = 2000 (1 + \frac{0,07}{12})^{12 \times 10} = 4019,3 \text{ جنية}$$

مثال ١٠-ال : السعر السوقى لسيارة يتناقص طبقاً للعلاقة $s = 160000 (0,95)^\nu$ حيث s سع السيارة بالجنية ، ν الزمن بالسنوات أوجد :

Ⓐ سعر السيارة عند شرائها الجديدة ب) سعر السيارة بعد مرور ٥ سنوات

الحل

Ⓐ سعر السيارة عند شرائها الجديدة = $160000 (0,95)^0 = 160000$ جنية

ب) سعر السيارة بعد مرور ٥ سنوات = $160000 (0,95)^5 = 123804,95$ جنية

متمدى توجبه الرياضيات (١٧) إعداد / عادل إدوار

حل المعادلات الأسية جبرياً

- (١) إذا كان : $1 = m^x$ فإن : $x = 0$ ، $m \in \{1, 0, -1\}$.
- (٢) إذا كان : $m^x = m^y$ فإن : $x = y$ ، $m \in \{1, 0, -1\}$.
- (٣) إذا كان : $m^x = m^y$ فإن : $x = y$ ، m عدد فردي ، $m \neq 0$ ، $x \neq y$ فإن : $x = y$ ، m عدد زوجي ، $m \neq 0$.

مثال ١- أوجد مجموعة حل المعادلة : $(3)^x - 2 = 243$ فى ح

الحل

$$(3)^x - 2 = 243 \Rightarrow (3)^x = 245 \Rightarrow x = \log_3 245$$

مثال ٢- أوجد مجموعة حل المعادلة $10000 = (x+1)^4$ فى ح

الحل

$$(x+1)^4 = 10000 \Rightarrow (x+1) = \sqrt[4]{10000} = 10$$

$$(x+1) = 10 \Rightarrow x = 9$$

$$(x+1) = -10 \Rightarrow x = -11$$

$$\therefore \text{م.ح} = \{9, -11\}$$

مثال ٣- إذا كان $(2)^x = (3)^y$ وكانت $(2)^x + (3)^y = 12$ فأوجد قيمة x

الحل

$$(2)^x = (3)^y \Rightarrow (2)^x = 3^y$$

$$(2)^x + (3)^y = 12 \Rightarrow 3^y + 3^y = 12 \Rightarrow 2 \cdot 3^y = 12 \Rightarrow 3^y = 6 \Rightarrow y = \log_3 6$$

$$(2)^x = 6 \Rightarrow x = \log_2 6$$

مثال ٤- أوجد مجموعة حل المعادلة $12 = 3^{x-1} + 3^x$

الحل

$$12 = 3^{x-1} + 3^x \Rightarrow 12 = 3^{x-1}(1 + 3) \Rightarrow 12 = 4 \cdot 3^{x-1} \Rightarrow 3^{x-1} = 3 \Rightarrow x-1 = 1 \Rightarrow x = 2$$

مثال ٥ حل المعادلة $٤س - ٩ \times ٢س + ٨ = ٠$

الحل

$$٤س - ٩ \times ٢س + ٨ = ٠ \quad \therefore (٢س)^2 - ٩ \times ٢س + ٨ = ٠$$

$$\therefore (٢س - ٨)(٢س - ١) = ٠$$

$$\text{إما } ٢س - ٨ = ٠ \text{ ومنها } ٢س = ٨ \quad \therefore س = ٤$$

$$\text{أ، } ٢س - ١ = ٠ \text{ ومنها } ٢س = ١ \quad \therefore س = \frac{١}{٢}$$

مثال ٦ حل المعادلة $٣س^٣ - ٤س^٣ = ٣$

الحل

$$٣س^٣ - ٤س^٣ + ٣ = ٠ \quad \therefore (٣س^٣ - ٤س^٣ + ٣) = ٠$$

$$\text{إما } ٣س^٣ - ٤س^٣ = ٠ \quad \therefore س = ١$$

$$\text{أ، } ٣س^٣ - ٤س^٣ = ٣ \quad \therefore (٣س^٣ - ٤س^٣) = ٣ \quad \therefore س = ٣$$

مثال ٧ حل المعادلة $٣٠ = ٣س(٥) + ٣س(٥)$

الحل

$$٣٠ = ٣س(٥) + ٣س(٥) \quad \text{بالمضرب } ٣س(٥)$$

$$\therefore ٣٠ \times ٣س(٥) = ٣س(٥) + ٣س(٥)$$

$$\therefore ٣س(٥) = ١٢٠ + ٣س(٥) \times ٣٠$$

$$\therefore ٣س(٥) = [٢٠ - ٣س(٥)] [٥ + ٣س(٥)]$$

$$\text{إما } ٣س(٥) = ٥ \text{ ومنها } ٣س(٥) = ٥ \quad \therefore س = ١$$

$$\text{أ، } ٣س(٥) = ٢٥ \text{ ومنها } ٣س(٥) = ٢٥ \quad \therefore س = ٢$$

مثال ٨ حل المعادلة $٠ = ٢٧ + س(٣) \times ١٠ - ١ - س^٢(٣)$

الحل

$$\begin{aligned} & \text{بالمضرب } ٣ \times \\ & ٠ = ٢٧ + س(٣) \times ١٠ - ١ - س^٢(٣) \\ & \therefore (٣) - س^٢ = ٨١ + س(٣) \times ٣٠ - ١ - س^٢(٣) \Leftarrow [٣ - س(٣)] [٢٧ - س(٣)] \\ & \text{إما } ٠ = ٢٧ - س(٣) \quad \text{ومنها } ٣(٣) = ٢٧ = س(٣) \quad \therefore س = ٣ \\ & \text{أ، } ٠ = ٣ - س(٣) \quad \text{ومنها } ٣ = س(٣) \quad \therefore س = ١ \end{aligned}$$

مثال ٩ حل المعادلة $٦ = س(٥) + ١ + س(٥)$

الحل

$$\begin{aligned} & \text{بالمضرب } س(٥) \times \\ & ٦ = \frac{١}{س(٥)} + س(٥) \times ٥ \\ & \therefore ٦ س(٥) = ١ + س^٢(٥) \times ٥ \\ & \therefore (٥) \times س^٢ - ٦ س(٥) + ١ = ٠ \Leftarrow [١ - س(٥)] [١ - س(٥) \times ٥] \\ & \text{إما } ٠ = ١ - س(٥) \times ٥ \quad \text{ومنها } \frac{١}{٥} = س(٥) \quad \therefore س = ١ - \\ & \text{أ، } ٠ = ١ - س(٥) \quad \text{ومنها } ١ = س(٥) \quad \therefore س = ٠ \end{aligned}$$

مثال ١٠ حل إذا كانت د، $س(٣) = ١$ ، د، $س(٩) = ٢$ فأوجد قيمة س التى تحقق

المعادلة د، $٧٥٦ = (١ + س) + (١ - س^٢)$

الحل

$$\begin{aligned} & ٧٥٦ = ١ + س(٩) + ١ - س^٢(٣) \\ & \therefore ٧٥٦ = ٢ + س^٢(٣) + ١ - س^٢(٣) \\ & \therefore ٧٥٦ = [٢٧ + ١] \times ١ - س^٢(٣) \\ & \therefore ٣(٣) = ٢٧ = ٢٨ \div ٧٥٦ = ١ - س^٢(٣) \\ & \therefore ٢ = س \quad \Leftarrow ٣ = ١ - س^٢ \quad ٤ = س^٢ \end{aligned}$$

تمارين

١	ارسم الشكل البياني لكل من الدوال الآتية، ثم أوجد المجال والمدى لكل منها وبين: أى منها تكون متزايدة وأى منها متناقصة أ) $d(s) = s^2$ ب) $d(s) = s^3$ ج) $d(s) = (\frac{1}{s})$
٢	أوجد جملة مبلغ ٨٠٠٠ جنيه موضوع فى بنك يُعطى فائدة سنوية مركبة قدرها ٥% لمدة ٧ سنوات.
٣	أكمل ما يأتى: أ) إذا كان $s^2 = 32$ فإن $s =$ ب) إذا قطع منحنى الدالة d_1 حيث $d_1(s) = s^3$ منحنى الدالة d_2 حيث $d_2(s) = s - 4$ فى نقطة (ك، ٣) فإن مجموعة حل المعادلة $s^3 - 4 = s$ تساوي
٤	إذا كانت $d(s) = s^2$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات: أ) $d(s) = 8$ ب) $d(s) = (1 + s) = \frac{1}{32}$
٥	إذا كانت $d(s) = s^7 - s^2$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات: أ) $d(s) = 343$ ب) $d(s) = \frac{1}{49} = (s^2)$
٦	إذا كانت $d(s) = s^3 + s^4$ أوجد مجموعة حل كل من المعادلات: أ) $d(s) = 27$ ب) $d(s) = \frac{1}{9} = (1 - s)$
٧	تتناقص أعداد الكائنات البحرية تبعاً لدالة التضاؤل الأسى $v = 8192 (\frac{1}{s})^{10}$ حيث v عدد الأسابيع بدءاً من الآن. أوجد: أ) عدد هذه الكائنات بعد مرور ٤ أسابيع من الآن. ب) بعد كم أسبوع من الآن يصبح عدد هذه الكائنات ٢٥٦.
٨	أكمل ما يأتى: أ) الدالة $d : d(s) = s^2$ تقطع محور الصادات فى النقطة ب) الدالة $d : d(s) = s^{-1/2}$ تقطع محور الصادات فى النقطة ج) إذا مر منحنى الدالة $d : d(s) = s^3$ بالنقطة (١، ٣) فإن $s =$

اللوغاريتمات

$$ص = لو_م س \Leftrightarrow س = م^ص \text{ حيث } م \geq 1, م \neq 1, س > 0, ص \in \mathbb{R}$$

ملاحظة: لا معنى عن لوغاريتم عدد غير موجب ، بمعنى لو_٣ - ٣ ، لو_٣ (٠) ليس لها معنى الأساس م يجب أن يكون موجب يختلف عن الواحد لو_٨ ، لو_٥ ليس لها معنى اللوغاريتم المعتاد هو لوغاريتم أساسه ١٠ وتكتب لو_{١٠} = لو_٨

الدالة اللوغاريتمية


إذا كان: $م \geq 1, م \neq 1, س > 0$ فإن الدالة: $د: س \mapsto لو_م س$

التمثيل البياني للدالة اللوغاريتمية

هى د: $س \mapsto لو_م س$: د(س) = لو_م س : $م \geq 1, م \neq 1, س > 0$

إذا كانت د(س) = لو_م س فإن الخط البياني للدالة د(س)

يمثل بالأزواج المرتبة (س ، لو_م س)




(١) إذا كانت: $١ < م$

المنحنى يمر بالنقطة (١ ، ٠)

المجال = $س > ٠$ ؛ $ص \in \mathbb{R}$

المدى = \mathbb{R} الدالة تزايدية على $س > ٠$



(٢) إذا كانت: $١ > م > ٠$

المنحنى يمر بالنقطة (١ ، ٠)

المجال = $س > ٠$ ؛ $ص \in \mathbb{R}$

المدى = \mathbb{R}


الدالة تناقصية على $س > ٠$

مثال ١-ال : إرسم الشكل البياني للدالة : د : د (س) = لو_٣ س متخذاً س $\in [\frac{1}{9}, 9]$ ومن الرسم أوجد : قيمة تقريبية للعدد لو_٣ ٦ ، عددين صحيحين ينحصر بينهما لو_٣ ٣,٥

الحل

نكون الجدول :

٩	٣	١	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	س
٢	١	٠	١-	٢-	د (س)



ومن الرسم :

لإيجاد قيمة تقريبية للعدد لو_٣ ٦ :

نرسم عند س = ٦ مستقيماً يوازي محور الصادات ليقابل المنحنى فى نقطة فتكون قيمة ص

المناظرة على محور الصادات = ١,٦ . ∴ لو_٣ ٦ ≈ ١,٦

، بالمثل : نجد أن : لو_٣ ٣,٥ ينحصر بين ١ ، ٢

مثال ٢-ال : إذا كان منحنى الدالة د : د (س) = لو_٣ س يمر بالنقطة (٢ ، ٤) أوجد قيمة م ثم أرسم منحنى الدالة متخذ س $\in [\frac{1}{8}, ٨]$ ومن الرسم أستنتج المدى والأطراف

الحل


∴ د (س) = لو_٣ س يمر بالنقطة (٢ ، ٤)

∴ لو_٣ ٤ = ٢ = ٢ (٢) = ٤

∴ ٢ = م والسالب مرفوض

∴ د (س) = لو_٣ س نكون الجدول :

٨	٤	٢	١	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	س
٣	٢	١	٠	١-	٢-	٣-	د (س)



ومن الرسم : المدى ح ، الدالة تزايدية على مجالها

مثال ٣- أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

① لو_٢ س = ٢ ② لو_٣ س = - ٢ ③ لو_٣ ٣٢ = س

الحل

① س = ٢ = ٢ = ٤ ∴ م.ع = { ٤ }

② س = - ٢ = ٣ = ٩ ∴ م.ع = { ٩ }

③ ٣ = ٣٢ = ٢ = ٥ ∴ س = ٥ ∴ م.ع = { ٥ }

مثال ٤- أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

① لو_٥ ١٢٥ = ٣ ② لو_٨ س = ٤ ③ لو_٨ ١ = س

الحل

① ٣ = ١٢٥ = ٣ = ٥ ∴ ٣ = ٥ = س ∴ م.ع = { ٥ }

② ٤ = ٨ = س = ٨ ∴ س = ٨

③ ١ = س = ٢ = ٢ ∴ س = ٢ ∴ م.ع = { ٢ }

④ ١ = س = ٢ = ٣ ∴ س = ٣ ∴ م.ع = { ٣ }

مثال ٥- أوجد مجال الدال المعرفة بالقواعد الآتية

① د = لو_٢ (١ + س) ② د = لو_٣ س ③ د = لو_٣ س

الحل

① الدالة معرفة عندما ١ + س > ٠ ∴ ١ + س > ٠ ∴ س > - ١ ∴ مجال د =] - ١ ، ∞ [

② س > ٠ ، س < ٢ ، س ≠ ١ ∴ س > ٠ ، س < ٢ ، س ≠ ١

∴ مجال د =] ٢ ، ∞ [

③ س > ٠ ، س < ٢ ، س ≠ ١ ∴ س > ٠ ، س < ٢ ، س ≠ ١

∴ مجال د =] ٢ ، ∞ [

مثال ٦- أوجد قيمة س إذا كان

$$\textcircled{1} \text{ لو } (س^2 - س) = 3 \quad \textcircled{2} \text{ لو } (س^2 - س) = 2$$

الحل

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ س}^2 - س &= 3 \\ \text{س}^2 - س - 3 &= 0 \\ (س - 3)(س + 1) &= 0 \\ \text{س} &= 3, \text{ س} = -1 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{3, -1\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ س}^2 - س &= 2 \\ \text{س}^2 - س - 2 &= 0 \\ (س - 2)(س + 1) &= 0 \\ \text{س} &= 2, \text{ س} = -1 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{2, -1\} \end{aligned}$$

مثال ٧- أوجد فى ح مجموعة حل المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} (لو س) - 5 = 6 \quad \textcircled{2} (لو س) - 5 = 12$$

الحل

$$\begin{aligned} \textcircled{1} (لو س) - 5 &= 6 \\ (لو س) &= 11 \\ \text{س} &= 11 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{11\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} (لو س) - 5 &= 12 \\ (لو س) &= 17 \\ \text{س} &= 17 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{17\} \end{aligned}$$

مثال ٨- أوجد فى ح مجموعة حل المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} |لو س + 5| = 2 \quad \textcircled{2} (لو س) - 5 = 0$$

الحل

$$\begin{aligned} \textcircled{1} |لو س + 5| &= 2 \\ لو س + 5 &= 2 \text{ أو } لو س + 5 = -2 \\ لو س &= -3 \text{ أو } لو س = -7 \\ \text{س} &= -3 \text{ أو } \text{س} = -7 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{-3, -7\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} (لو س) - 5 &= 0 \\ (لو س) &= 5 \\ \text{س} &= 5 \\ \therefore \text{م.ج} &= \{5\} \end{aligned}$$

تمارين

١ أكمل ما يأتى:

أ الصورة الأسية المكافئة للصورة لو $27 = 3^3$ هي

ب الصورة اللوغاريتمية المكافئة للصورة $3^3 = 1$ هي

ج لو $0.001 = \dots$
د لو $1 = \dots$

ه إذا كان لو $2 = 4$ فإن س =
و إذا كان لو $128 = 1 + س$ فإن س =

ز مجال الدالة د: د(س) = لو س هو
ح الدالة د حيث د(س) = لو س متناقصة لكل $أ \in \dots$

ط منحنى الدالة د حيث د(س) = لو س يمر بالنقطة (٨،)

ي إذا كان لو $3 = س$ ، لو $5 = ص$ فإن لو $15 = \dots$ (بدلالة س، ص)

٢ أوجد فى ع مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:-

ج لو $\frac{2}{3} = 9$ س

ب لو $3 = (2 + س)$ س

أ لو $2 = (1 - س)$ س

و لو $2 = 9$ س

ه لو $2 = (2 + س)$ س

د لو $\frac{3}{4} = 8$ $1 + س$

٣ بدون استخدام الحاسبة أوجد قيمة

د لو $2 + 3$ لو 1

ج لو 9

ب لو 7

أ لو 1

٤ مثل بيانياً الدالة د فى كل مما يأتى الآتية ومن الرسم أوجد مداها وابحث اطرافها:

د د(س) = لو $(1 + س)$

ج د(س) = لو $\frac{1}{3}$ س

ب د(س) = لو $\frac{1}{3}$ س

أ د(س) = لو $\frac{1}{3}$ س

٥ استخدم الحاسبة فى إيجاد قيمة كل من:-

ج $4 - 7$ لو $5 - 13$

ب لو 27

أ لو 15

٦ إذا كانت مصاريف الاشتراك السنوى بالجنه لأسرة فى أحد النوادي الاجتماعية تتبع العلاقة

د(س) = $100 + 500$ لو (ن س) حيث ن عدد سنوات الاشتراك س عدد الأفراد. أوجد قيمة اشتراك أسرة مكونة من ٥ أفراد للسنة الرابعة فى هذا النادي.

قوانين اللوغاريتمات

[١] $\log_s s = 1$
 فمثلاً: $\log_2 2 = 1$ ، $\log_3 3 = 1$ ، $\log_4 4 = 1$
 والعكس: $\log_2 4 = 2$ ، $\log_3 9 = 2$ ، $\log_4 16 = 2$
 $\log_s (s+1) = 1 + \log_s s$

تذكر أن :
 * $\log (s + s) \neq \log s + \log s$
 * $\log (s - s) \neq \log s - \log s$
 * $\log (s \times s) \neq \log s \times \log s$
 * $\log (s \div s) \neq \log s \div \log s$

[٢] $\log_s \frac{s}{s} = \log_s 1 = 0$
 فمثلاً: $\log_2 \frac{2}{2} = \log_2 1 = 0$
 والعكس: $\log_2 1 = 0$ ، $\log_3 1 = 0$ ، $\log_4 1 = 0$
 $\log_s (1 + s) = \log_s s + \log_s \frac{s}{s+1}$

[٣] $\log_s s^n = n \log_s s$
 فمثلاً: $\log_2 2^3 = 3 \log_2 2 = 3$
 والعكس: $\log_2 8 = 3$ ، $\log_3 27 = 3$ ، $\log_4 64 = 3$

[٤] $\log_s s = 1$ ، فمثلاً: $\log_2 2 = 1$ ، $\log_3 3 = 1$ ، $\log_4 4 = 1$

[٥] $\log_s 1 = 0$ ، فمثلاً: $\log_2 1 = 0$ ، $\log_3 1 = 0$ ، $\log_4 1 = 0$

[٦] إذا: $s \geq 1$ ، $s \neq 1$ ، $s > 0$ ، فإن: $\log_s \frac{s}{s} = \log_s 1 = 0$

فمثلاً: $\log_2 \frac{2}{2} = \log_2 1 = 0$ ، $\log_3 \frac{3}{3} = \log_3 1 = 0$ ، $\log_4 \frac{4}{4} = \log_4 1 = 0$

[٧] إذا: $s \geq 1$ ، $s \neq 1$ ، $s > 0$ ، فإن: $\log_s \frac{1}{s} = \log_s s^{-1} = -1$

فمثلاً: $\log_2 \frac{1}{2} = \log_2 2^{-1} = -1$ ، $\log_3 \frac{1}{3} = \log_3 3^{-1} = -1$ ، $\log_4 \frac{1}{4} = \log_4 4^{-1} = -1$

ملاحظة: إذا: $s \geq 1$ ، $s \neq 1$ ، $s > 0$ ، م عدداً زوجياً لا يساوى الصفر ، $\log_s s^m = m \log_s s$ ، فإن: $\log_s (s^m) = m \log_s s$ ، فمثلاً: $\log_2 (2^3) = 3 \log_2 2 = 3$ ، $\log_3 (3^4) = 4 \log_3 3 = 4$ ، $\log_4 (4^5) = 5 \log_4 4 = 5$

مثال ١-ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة

$$\textcircled{1} \text{ لو } ١٥ + \text{لو } ١٤ - \text{لو } ١٠٥ \quad \textcircled{2} \text{ لو } ٤٨ + \text{لو } ١٢٥ - \text{لو } ٦$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ لو } ١٥ + \text{لو } ١٤ - \text{لو } ١٠٥ = \text{لو } ٢ = ١$$

$$\textcircled{2} \text{ لو } ٤٨ + \text{لو } ١٢٥ - \text{لو } ٦ = \text{لو } ١٠٠٠ = \text{لو } (١٠)^٣ = ٣ \text{ لو } ١٠ = ٣ = ١ \times ٣ = ٣$$

مثال ٢-ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة

$$\textcircled{1} \text{ لو } ٣ + \text{لو } ٥ + \text{لو } ٢٤٣ - \text{لو } ١٢٥ \quad \textcircled{2} \text{ لو } ١ + \text{لو } ٣ - \text{لو } ٢ - \text{لو } ١٥$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ لو } ٣ + \text{لو } ٥ + \text{لو } ٢٤٣ - \text{لو } ١٢٥ = \text{لو } ١٢٥ = \text{لو } (٥)^٣ = ٣ \text{ لو } ٥ = ٣ = ١ \times ٣ = ٣$$

$$\textcircled{2} \text{ لو } ١ + \text{لو } ٣ - \text{لو } ٢ - \text{لو } ١٥ = \text{لو } ١ = ٠ = \text{لو } ١٠ = \text{لو } ١٠ = \text{لو } ١٠ = ٠$$

مثال ٣-ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة

$$\text{لو } ٣ + \text{لو } ٥ + \text{لو } ٥ - \text{لو } ١٢٥ + \text{لو } ٢٧ - \text{لو } ٢٤٣$$

الحل

$$\text{لو } ٣ + \text{لو } ٥ + \text{لو } ٥ - \text{لو } ١٢٥ + \text{لو } ٢٧ - \text{لو } ٢٤٣ = \text{لو } ٤ = \text{لو } (٢)^٢ = ٢ \text{ لو } ٢ = ٢ = ١ \times ٢ = ٢$$

مثال ٤-ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة

$$\text{لو } ٩,٠٠٠ - \text{لو } ٢٧ + \text{لو } ١٥٥ - \text{لو } ١٢$$

الحل

$$\text{لو } ٩,٠٠٠ - \text{لو } ٢٧ + \text{لو } ١٥٥ - \text{لو } ١٢ = \text{لو } ١ = ٠ = \text{لو } ١ = ٠$$

مثال ٥-ال : أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} \text{ لو س } + \text{ لو } ٣ = \text{ لو } ١٥ \quad \textcircled{2} \text{ لو س } - \text{ لو } ٢ = \text{ لو } ٣$$

الحل

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ لو س } \times ٣ = \text{ لو } ١٥ & \Leftrightarrow \text{ لو } ٣ \text{ س } = \text{ لو } ١٥ \\ \text{س}^٣ = ١٥ & \Leftrightarrow \text{ س } = ٥ \\ \textcircled{2} \text{ لو } \frac{\text{س}}{٢} = ٣ & \Leftrightarrow \frac{\text{س}}{٢} = ٣ \end{aligned}$$

$$\text{س} = ٢ \times ٣ = ٦ \quad \therefore \text{م.ج} = \{ ٦ \}$$

مثال ٦-ال : أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} \text{ لو س } + \text{ لو } (٢ - \text{س}) = ٣ \quad \textcircled{2} \text{ لو س } + \text{ لو } (١٢ + \text{س}) = ٣$$

الحل

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \text{ لو س } (٢ - \text{س}) = ٣ & \Leftrightarrow \text{س}^٢ - ٢ \text{ س} = ٣ \\ \text{س}^٢ - ٢ \text{ س} = ٨ & \Leftrightarrow \text{س}^٢ - ٢ \text{ س} - ٨ = ٠ \\ \therefore \text{س} = ٤ & \quad \therefore \text{س} = -٢ \text{ (مرفوض)} \\ \therefore \text{م.ج} = \{ ٤ \} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \text{ لو س } (١٢ + \text{س}) = ٣ & \Leftrightarrow \text{لو} (١٢ + \text{س}) \text{ س} = ٣ \\ \text{س}^٢ + ١٢ \text{ س} = ٣ & \Leftrightarrow \text{س}^٢ + ١٢ \text{ س} - ٣ = ٠ \\ \therefore \text{س} = ٤ & \quad \therefore \text{س} = -١٦ \text{ (مرفوض)} \\ \therefore \text{م.ج} = \{ ٤ \} & \end{aligned}$$

مثال ٧-ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة :

$$\text{لو} ٥ \times \text{لو} ٧ \times \text{لو} ٩ \times \text{لو} ٣$$

الحل

$$\text{المقدار} = \frac{\text{لو} ٥}{\text{لو} ٢} \times \frac{\text{لو} ٧}{\text{لو} ٥} \times \frac{\text{لو} ٩}{\text{لو} ٧} \times \frac{\text{لو} ٣}{\text{لو} ٩} = \frac{\text{لو} ٣}{\text{لو} ٢}$$

مثال ٨- أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} \text{ لو س}^2 = \text{لو} 4 + \text{لو} 9 \quad \textcircled{2} \text{ لو}^2(7) - 49 = \frac{\text{لو}^2(7) - 49}{\text{لو} 0.7} = \text{لو س}$$

الحل

$$\textcircled{1} \text{ لو س}^2 = \text{لو} 4 \times 9 = \text{لو} 36 = \text{لو} (6^2) \Rightarrow 2 \text{ لو} |س| = 2 \text{ لو} 6 \Rightarrow |س| = 6 \therefore س = \pm 6 \text{ تحقق} \therefore \text{م.ح} = \{6, -6\}$$

$$\textcircled{2} \text{ لو س} = \frac{\text{لو}^2(7) - 49}{\text{لو} 0.7} = \frac{\text{لو}^2(7) - (7)^2}{\text{لو} 7 - \text{لو} (10)} = \frac{\text{لو}^2(7) - (7)^2}{\text{لو} 7 - \text{لو} 10}$$

$$= - \text{لو} 7 = \text{لو} (7)^{-1} = \text{لو} \frac{1}{7}$$

مثال ٩- أوجد مجموعة الحل لكلا من المعادلات الآتية

$$\textcircled{1} (\text{لو س})^3 = \text{لو س}^3 \quad \textcircled{2} (\text{لو س})^2 \times 64 = (\text{لو س})^{32}$$

الحل

$$\textcircled{1} (\text{لو س})^3 = \text{لو س}^3 \Rightarrow (\text{لو س})^3 - \text{لو س}^3 = 0$$

$$\text{لو س} [(\text{لو س})^2 - \text{لو س}] = 0 \Rightarrow \text{لو س} = 0 \text{ أو } (\text{لو س})^2 - \text{لو س} = 0 \Rightarrow \text{لو س} = 0 \text{ أو } \text{لو س} = 1$$

$$\therefore س = 1 \text{ أو } 10 \text{ أو } 100 \text{ أو } 1000 \text{ أو } 10000 \text{ أو } 100000 \text{ أو } 1000000 \text{ أو } 10000000 \text{ أو } 100000000 \text{ أو } 1000000000$$

$$\text{لو س} = 0 \Rightarrow س = 1 \text{ أو } 10 \text{ أو } 100 \text{ أو } 1000 \text{ أو } 10000 \text{ أو } 100000 \text{ أو } 1000000 \text{ أو } 10000000 \text{ أو } 100000000 \text{ أو } 1000000000$$

$$\therefore \text{م.ح} = \{1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000\}$$

$$\textcircled{2} (\text{لو س})^2 \times 64 = (\text{لو س})^{32} \Rightarrow (\text{لو س})^2 = (\text{لو س})^{32-2} = (\text{لو س})^{30} \Rightarrow (\text{لو س})^2 = (\text{لو س})^{30}$$

$$\therefore (\text{لو س})^2 = (\text{لو س})^{30} \Rightarrow (\text{لو س})^2 - (\text{لو س})^{30} = 0 \Rightarrow (\text{لو س})^2 (1 - (\text{لو س})^{28}) = 0$$

$$\text{نحل: } (\text{لو س})^2 = 0 \text{ أو } 1 - (\text{لو س})^{28} = 0 \Rightarrow (\text{لو س})^2 = 0 \text{ أو } (\text{لو س})^{28} = 1$$

$$\therefore \text{لو س} = 0 \text{ أو } 1 \text{ أو } 10 \text{ أو } 100 \text{ أو } 1000 \text{ أو } 10000 \text{ أو } 100000 \text{ أو } 1000000 \text{ أو } 10000000 \text{ أو } 100000000 \text{ أو } 1000000000$$

$$\therefore س = 1 \text{ أو } 10 \text{ أو } 100 \text{ أو } 1000 \text{ أو } 10000 \text{ أو } 100000 \text{ أو } 1000000 \text{ أو } 10000000 \text{ أو } 100000000 \text{ أو } 1000000000$$

$$\therefore \text{م.ح} = \{1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000, 1000000000\}$$

مثـ ١٠ـ ال : بدون استخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة :

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{\log_2 12} + \frac{1}{\log_8 12} + \frac{1}{\log_9 12} \quad \textcircled{2} \quad \log_2 12 + \log_8 12 + \log_9 12 \quad \textcircled{3} \quad \log_2 12 + \log_8 12 + \log_9 12$$

الحـل

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{\log_2 12} + \frac{1}{\log_8 12} + \frac{1}{\log_9 12} = \log_2 12 + \log_8 12 + \log_9 12$$

$$= \log_2 12 = 2 \log_2 6 = 2 \log_2 (2 \times 3) = 2(1 + \log_2 3) = 2 + 2 \log_2 3$$

$$\textcircled{2} \quad \log_2 12 + \log_8 12 + \log_9 12 = \log_2 12 + \log_8 12 + \log_9 12 = 1$$

استخدام الآلة الحاسبة :

اللوغاريتمات المعتادة

هى اللوغاريتمات التى أساسها (١٠) ولا يكتب أسفل رمز اللوغاريتم

كيفية إيجاد لوغاريتم عدد استخدام مفتاح اللوغاريتم المعتاد هو \log

(١) لإيجاد : لو ٨,٤ نتبع الخطوات

$$\log \quad 8 \quad . \quad 5 \quad = \quad 0,9242792861$$

فيكون : لو ٨,٤ = ٠,٩٢٤٢

(٢) لإيجاد قيمة س إذا كان لو س = ٠,٤٥٧٢ نتبع الخطوات

$$\text{shift} \quad \log \quad 0 \quad . \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 2 \quad = \quad 2,86597276$$

فيكون : س $\simeq 2,8659$

اللوغاريتم لأى أساس

(١) لإيجاد : لو ٢٤ نتبع الخطوات

$$\log \quad \square \quad 3 \quad \square \quad 2 \quad 4 \quad =$$

يظهر على الشاشة العدد 2,892789261

فيكون : لو ٢٤ $\simeq 2,8928$

مثال ١- ال أوجد قيمة س التي تحقق أن

$$\textcircled{1} \text{ س } = 2 \text{ لو } 3 - 7 \text{ لو } 2 \quad \textcircled{2} \text{ س } = 3 \text{ لو } 5 - 2 \text{ لو } 3$$

الحل

$$2 \text{ Log } 7 - 3 \text{ Log } 2 = 0.78$$

$$\therefore \text{ س } = 0.78$$

$$(3 \text{ Log } 5 - 2 \text{ Log } 3) \div (5 \text{ Log } 3 - \text{Log } 7) = 0.74$$

$$\therefore \text{ س } = 0.74$$

مثال ٢- ال أوجد قيمة س التي تحقق أن

$$\textcircled{1} \text{ لو س } = 1.5 \quad \textcircled{2} \text{ س } = {}^{10}(2,3) \quad \textcircled{3} {}^5(4) = 57$$

الحل

$$\text{shift Log } 1.5 = 31.6$$

$$\textcircled{1} \therefore \text{ س } = 31.6$$

$$\textcircled{2} \text{ بأخذ لوغاريتم الطرفين } \leftarrow \text{ لو س } = {}^{10}(2,3) = 10 \text{ لو } 2,3$$

$$10 \times \log 2,3 = \text{shift log} = 4,142651121$$

$$\therefore \text{ س } \simeq 4,14$$

$$\textcircled{3} \text{ بأخذ لوغاريتم الطرفين } \leftarrow \text{ س لو } 4 = 57 \therefore \text{ س } = \text{لو } 57 \div \text{لو } 4$$

$$\text{Log } 57 \div \log 4 = 2,916445007$$

$$\therefore \text{ س } \simeq 2,916$$

مثال ٣- ال : إذا كان حجم الكرة ع يعطى من العلاقة $E = \frac{4}{3}\pi r^3$ أوجد باستخدام

الحاسبة (أولاً) قيمة ع عندما $r = 10$ سم (ثانياً) قيمة r عندما $E = 150$

الحل

$$E = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (10)^3 = 4188,79 \text{ بالالة}$$

$$\text{(أولاً) عندما : } r = 10 \text{ سم}$$

$$4 \div 3 \times \text{sh exp} \times 10 x^y 3 = 4188.79$$

$$150 = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$\text{(ثانياً) عندما : } E = 150$$

$$\text{بأخذ اللوغاريتم } 3 \text{ لو } r = \text{لو } 35,8 \therefore \text{ لو } r = 35,8$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{150 \times 3}{\pi}} = 35,8$$

$$\text{Log } 35,8 \div 3 = \text{shift log} = 3,2958$$

$$\therefore r \simeq 3,3 \text{ سم}$$

مثـ٤ـال : أوجد مساحة سطح مكعب حجمه ١٢٠٠ سم^٣

الحـل

$$\text{حجم المكعب} = ١٢٠٠ \Leftrightarrow \text{ل}^٣ = ١٢٠٠ \quad \text{بأخذ لوغاريتم الطرفين}$$

$$\text{ل}^٣ = ١٢٠٠ \Rightarrow \text{ل} = (١٢٠٠)^{\frac{١}{٣}} \quad \text{ل}^٣ = ١٢٠٠ \Rightarrow \text{ل} = (١٢٠٠)^{\frac{١}{٣}}$$

$$\text{Log } 1200 \div 3 = \text{shift log} = 10,62658569 \quad \therefore \text{ل} \approx ١٠,٦٢٧ \text{ سم}$$

$$\text{حل آخر حجم المكعب} = ١٢٠٠ \Leftrightarrow \text{ل}^٣ = ١٢٠٠$$

$$\therefore \text{ل} = \sqrt[٣]{١٢٠٠} = ١٠,٦٢٧$$

$$\text{مساحة المكعب} = \text{ل}^٢ = (١٠,٦٢٧)^٢ = ١١٣,٥٤ \text{ سم}^٢$$

مثـ٥ـال : أوجد قيمة س التى تحقق أن

$$\textcircled{١} \quad (٥)^{٢+س} = ١٢ \quad \textcircled{٢} \quad (٥)^{٣-س} = (٣)^{س+٤}$$

الحـل

١) بأخذ لوغاريتم الطرفين

$$\therefore \text{ل}^٢+س = ١٢ \Leftrightarrow (٢+س) \text{ لو} = \text{لو} ١٢$$

$$\text{س لو} + ٢ \text{ لو} = \text{لو} ١٢ \Leftrightarrow \text{س لو} = \text{لو} ١٢ - ٢ \text{ لو}$$

$$\text{س} = \frac{\text{لو} ١٢ - ٢ \text{ لو}}{\text{لو}} = ٠,٤٥$$

٢) بأخذ لوغاريتم الطرفين

$$\therefore \text{ل}^٣-س = (٣)^{س+٤} \Leftrightarrow (٣-س) \text{ لو} = (٣+س) \text{ لو}$$

$$٣ \text{ لو} - ٣ \text{ لو} = \text{س لو} + ٣ \text{ لو} \Leftrightarrow ٣ \text{ لو} - ٣ \text{ لو} = \text{س لو} + ٣ \text{ لو}$$

$$\therefore \text{س} (٣ \text{ لو} - ٣ \text{ لو}) = ٣ \text{ لو} + ٣ \text{ لو} \quad \therefore \text{س} = \frac{٣ \text{ لو} + ٣ \text{ لو}}{٣ \text{ لو} - ٣ \text{ لو}} = ٤,٣$$

مثال ٦- أوجد قيمة س التى تحقق أن : $(٥)^{١+٢س} = ٧ \times (٣)^{٢+س}$

الحل

بأخذ لوغاريتم الطرفين : $\therefore \text{لو } ٥^{١+٢س} = \text{لو}(٧ \times ٣^{٢+س})$

$$\text{لو } ٥^{١+٢س} = \text{لو } ٧ + \text{لو } ٣^{٢+س} \Leftrightarrow (١+٢س) \text{ لو } ٥ = \text{لو } ٧ + (٢+س) \text{ لو } ٣$$

$$٢س \text{ لو } ٥ + \text{لو } ٥ = \text{لو } ٧ + ٢ \text{ لو } ٣ + س \text{ لو } ٣$$

$$٢س \text{ لو } ٥ - س \text{ لو } ٣ = \text{لو } ٧ + ٢ \text{ لو } ٣ - \text{لو } ٥$$

$$س (٢ \text{ لو } ٥ - \text{لو } ٣) = \text{لو } ٧ + ٢ \text{ لو } ٣ - \text{لو } ٥$$

$$\therefore س = \frac{\text{لو } ٧ + ٢ \text{ لو } ٣ - \text{لو } ٥}{٢ \text{ لو } ٥ - \text{لو } ٣} = ١,١٩$$

مثال ٧- أوجد قيمة س التى تحقق أن : $(٨)^{١+٢س} \times (٩)^{٢+س} = ٢٧$

الحل

بأخذ لوغاريتم الطرفين : $\therefore \text{لو}(٨)^{١+٢س} \times \text{لو}(٩)^{٢+س} = \text{لو } ٢٧$

$$\text{لو } ٨^{١+٢س} + \text{لو } ٩^{٢+س} = \text{لو } ٢٧$$

$$(١+٢س) \text{ لو } ٨ + (٢+س) \text{ لو } ٩ = \text{لو } ٢٧$$

$$٢س \text{ لو } ٨ + \text{لو } ٨ + ٢ \text{ لو } ٩ + س \text{ لو } ٩ = \text{لو } ٢٧$$

$$٢س \text{ لو } ٨ + س \text{ لو } ٩ = \text{لو } ٢٧ - \text{لو } ٨ - ٢ \text{ لو } ٩$$

$$س (٢ \text{ لو } ٨ + \text{لو } ٩) = \text{لو } ٢٧ - \text{لو } ٨ - ٢ \text{ لو } ٩$$

$$\therefore س = \frac{\text{لو } ٢٧ - \text{لو } ٨ - ٢ \text{ لو } ٩}{٢ \text{ لو } ٨ + \text{لو } ٩} = -٠,٥$$

مثال ٨- أوجد قيمة س التى تحقق أن : $٢ - ٢س = ٥ \times ٢س + ٦ = ٠$

الحل

$$\text{نحلل : } (٢ - ٢س) (٣ - س) = ٠$$

$$٢ = س \quad \text{أ،} \quad ٣ = س \quad \text{أ،} \quad ١ = س \quad \text{أ،} \quad \text{لو } ٢ = س \quad \text{أ،}$$

$$\therefore س = ١ \quad \text{أ،} \quad س = \frac{\text{لو } ٣}{\text{لو } ٢} = ١,٦ \quad \therefore س = \{ ١, ١,٦ \}$$

مثـ ٩ـ مال أوجد قيمة س التى تحقق أن : $٢٠٢ - ٨ \times ٢٠٢ + ١٥ = ٠$

الحـل

$$\text{نحلل : } ٠ = (٢٠٢ - ٥) (٣ - ٢٠٢) \Rightarrow \therefore ٣ = ٢٠٢ \text{ ، } ٥ = ٢٠٢$$

$$\begin{aligned} \text{لو } ٢٠٢ = ٣ \text{ ، } \text{لو } ٢٠٢ = ٥ \quad \therefore \text{س لو } ٢ = ٣ \text{ ، } \text{س لو } ٢ = ٥ \\ \therefore \text{س } = \frac{\text{لو } ٣}{\text{لو } ٢} = ١,٦ \text{ ، } \text{س } = \frac{\text{لو } ٥}{\text{لو } ٢} = ٢,٣ \therefore \text{س } = \{ ١,٦, ٢,٣ \} \end{aligned}$$

مثـ ١٠ـ مال: إذا كان $\sqrt[٢]{٢٤} = \text{ص}$ أوجد قيمة : $٥ \text{ لو } \text{س} + ٤ \text{ لو } \text{ص} - \text{لو } \text{س}^٣ \text{ ص}^٢$

الحـل

$$\text{المقدار} = \text{لو } \text{س}^٢ = \frac{\text{س}^٢ \times \text{ص}^٢}{\text{س} \times \text{ص}} = \text{لو } \text{س}^٢ \text{ ص}^٢ = (\text{س ص})^٢$$

$$= \text{لو } (\sqrt[٢]{٢٤})^٢ = \text{لو } ٣٢ = \text{لو } ٢^٥ = ٥ \text{ لو } ٢ = ١ \times ٥ = ٥$$

مثـ ١١ـ مال: إذا كان : $٧ \text{ لوس} + ٤ \text{ لوص} - \text{لوس}^٢ \text{ ص}^٢ = ٢ (٢ \text{ لو} + ٣ \text{ لو})$

إثبت أن س = $\frac{٦}{٣}$

الحـل

$$\text{لوس}^٢ + \text{لوص} - \text{لوس}^٢ \text{ ص}^٢ = ٢ \text{ لو } ٢$$

$$\text{لو } \frac{\text{س}^٢ \times \text{ص}^٢}{\text{س} \times \text{ص}} = \text{لو } ٢ \Rightarrow \text{لوس}^٢ \text{ ص}^٢ = \text{لو } ٣٦$$

$$\text{س}^٢ \text{ ص}^٢ = ٣٦ \Rightarrow \text{س ص} = ٦ \therefore \text{س} = \frac{٦}{٣}$$

مثـ ١٢ـ مال : إذا كان : $\frac{\text{لوس}}{\text{لو } ٥} = \frac{\text{لو } ٩}{٣ \text{ لوص}} = \frac{٤٩ \text{ لو}}{\text{لوص}}$ أوجد قيمتى س ، ص

الحـل

$$\frac{\text{لوس}}{\text{لو } ٥} = \frac{\text{لو } (٣)}{\text{لو } ٣} = \frac{\text{لو } (٧)}{\text{لوص}}$$

$$\frac{\text{لوس}}{\text{لو } ٥} = \frac{\text{لو } ٢}{٣ \text{ لوص}} \Rightarrow \frac{\text{لوس}}{\text{لو } ٥} = ٢ = \frac{\text{لوس}}{\text{لو } ٧}$$

$$\therefore \text{س} = ٢٥$$

$$\therefore \text{ص} = ٧$$

$$\text{لوس} = ٢ \text{ لو } ٥ = \text{لو } (٥) = ٢٥$$

$$\text{لوص} = ٢ \text{ لو } ٧$$

تمارين على خواص اللوغاريتمات

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

١) $2 \log_1 2 + 2 \log_1 3 =$

د) ١٢

ج) ٢

ب) ٣٦

أ) ٦

٢) $\log_2 5 \times \log_2 2 =$

د) صفر

ج) $\frac{5}{2}$

ب) ١٠

أ) ١

٣) $\log_2 2 \times \log_2 5 \times \log_2 3 =$

د) $\log_2 30$

ج) صفر

ب) ١

أ) ٣٠

٤) عبّر عن كل مما يأتى بدلالة لوس، لو (س+١)

ج) $\log_{\sqrt{s+1}} (s+1)^2$

ب) $\log_{\frac{s}{s+1}} s$

أ) $\log_{s+1} (s+1)$

٥) اختصر لأبسط صورة:

ج) $\log_2 12 + \log_2 \frac{2}{3}$

ب) $\log_2 2 + \log_2 3$

أ) $\log_2 54 - \log_2 9$

و) $\frac{\log_2 3 + \log_2 49}{\log_2 7}$

هـ) $\frac{\log_2 1 - \log_2 125}{\log_2 125}$

د) $\log_2 48 + \log_2 125 - \log_2 6$

ح) $\frac{1}{\log_2 1} + \frac{1}{\log_2 2} + \log_2 2 - \log_2 \sqrt{ab} - \log_2 3 - \log_2 2$

ز) $\log_2 16 + \log_2 3 + \log_2 1$

٦) أوجد فى ح مجموعة حل كل من المعادلات الآتية:

ج) $\log_2 s - \log_2 2 = 2$

ب) $\log_2 s + \log_2 (s-3) = 1$

أ) $\log_2 s + \log_2 (s+2) = 3$

و) $\log_2 s - \frac{3}{\log_2 s} = 2$

هـ) $\log_2 s + \frac{1}{\log_2 s} = 2$

د) $\log_2 (s+3) - \log_2 3 = \log_2 s$

٧) أثبت أن $\log_2 1 \times \log_2 2 \times \log_2 3 \times \log_2 4 \times \log_2 5 \times \log_2 6 \times \log_2 7 \times \log_2 8 \times \log_2 9 \times \log_2 10 = 1$ ثم احسب قيمة $\log_2 3 \times \log_2 4 \times \log_2 5 \times \log_2 6 \times \log_2 7 \times \log_2 8 \times \log_2 9 \times \log_2 10$

٨) أوجد قيمة س فى كل مما يأتى مقرباً الناتج لرقم عشرى واحد.

د) $2 \log_2 3 - \log_2 3 = 1 + \log_2 3$

ج) $1 = 2 \log_2 7 \times 4$

ب) $2 = 1 - \log_2 5$

أ) $7 = 3 \log_2 3$

امثلة عامة

مثال ١: إذا كانت $\sqrt{2} + 5 = 10$ ، أثبت أن $\sqrt{2} - 5 = 1$

الحل

$$\sqrt{2} - 5 = \frac{\sqrt{2} - 5}{24 - 25} = \frac{\sqrt{2} - 5}{\sqrt{2} - 5} \times \frac{1}{\sqrt{2} + 5} = \frac{1}{\sqrt{2} + 5} = 1$$

الأيمن = لو $(\sqrt{2} - 5 + \sqrt{2} + 5) = 10$ ، لو $1 = 1$ الأيسر

مثال ٢: إذا كان $\sqrt{3} - 8 = 16$ ، أثبت أن $\sqrt{3} + 8 = 2$

الحل

$$\sqrt{3} + 8 = \frac{\sqrt{3} + 8}{63 - 64} = \frac{\sqrt{3} + 8}{\sqrt{3} + 8} \times \frac{1}{\sqrt{3} - 8} = \frac{1}{\sqrt{3} - 8} = 2$$

الأيمن = لو $(\sqrt{3} + 8 + \sqrt{3} - 8) = 16$ ، لو $2 = 2$

= لو $(2) = 2$ ، لو $2 = 2$ الأيسر

مثال ٣: إذا كان $\sqrt{3} - 2 = 3$ ، ص $\sqrt{3} + 2 = 1$ ، أثبت أن $\sqrt{3} - 2 = 3$

الحل

$$1 = 3 - 2 = (\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} + 2) = 3 - 4 = -1$$

المقدار لو $3 - 2 = 3$ ، لو $1 = 1$ صفر

مثال ٤: حل المعادلة $\sqrt{2} + 1 = 10$ ، لو $1 = 10$ ، لو $2 = 10$

الحل

$$\sqrt{2} + 1 = 10 \Rightarrow \sqrt{2} = 9 \Rightarrow 2 = 81 \Rightarrow 2 = 81$$

$$\sqrt{2} = 9 \Rightarrow 2 = 81 \Rightarrow 2 = 81$$

$$\sqrt{2} = 9 \Rightarrow 2 = 81 \Rightarrow 2 = 81$$

مثـ٥ـال : أوجد قيمة س التي تحقق أن : $\frac{(لو٥)^٢ - لو٥٥}{لو٥٥٠٠} = لو٥$

الحـل

$$لو٥ = \frac{(لو٥)^٢ - لو٥٥}{لو٥٥٠٠} = \frac{لو٥ [لو٥ - ٥]}{لو٥ - ٥} = لو٥$$

لو٥ = لو٥
 \therefore س = ٥

مثـ٦ـال : حل المعادلة $س لو٥ = ١٠$

الحـل

بأخذ لوغاريتم الطرفين

$$س لو٥ = لو٥١٠ \Leftrightarrow س لو٥ = ١$$

$$\therefore س = \frac{١}{لو٥}$$

لو٥ = ١ \Leftrightarrow س = ١٠ ، لو٥ = -١ \Leftrightarrow س = -١٠
 \therefore ح.م = { ١٠ ، -١٠ }

مثـ٧ـال : حل المعادلة $س لو٥٤ = س$

الحـل

بأخذ لوغاريتم للطرفين $س لو٥٤ = س لو٥٤$

$$س لو٥٤ = س لو٥٤ + ٢ = (س لو٥٤) + ٢$$

$$(س لو٥٤) - (س لو٥٤) = ٢ - ٢ \Rightarrow ٠ = ٢ - ٢$$

$$\therefore س = ٢ \Rightarrow س = ٢ \Rightarrow س = ٢$$

مثـ٨ـال : حل المعادلة $لو٣ = لو٣ + ١ - لو٣ - ٢ = لو٢$

الحـل

$$لو٣ = (١ - س) (٣ - س) = ٢$$

$$٨ = (٣ - س) (١ - س) \Rightarrow ٨ = (٣ - س) (١ - س)$$

$$٨ = ٣ - ٣س - ١ + س \Rightarrow ٨ = ٢ - ٢س$$

$$\therefore س = ٣ \Rightarrow س = ٣$$

تمارين عامة

[١] أوجد قيمة كل من :

- (١) $١٠ \text{ لو} + ١٦ \text{ لو} - ٤٠ \text{ لو}$ (٢) $٢ \text{ لو} + ٢ \text{ لو} - ٥٦ \text{ لو} + ٤٢ \text{ لو} + ٢٤ \text{ لو}$
- (٣) $٣ \text{ لو} - ٤ \text{ لو} + ١٢ \text{ لو} - ٠.٣ \text{ لو}$ (٤) $٠.٤ \text{ لو} - ٢ \text{ لو} + ٣ \frac{٣}{٢} \text{ لو} + \frac{٥}{٨} \text{ لو}$
- (٥) $٦٤ \text{ لو} - ٦٠ \text{ لو} + ٨ \text{ لو} - ٣ \text{ لو} - ٤ \text{ لو}$
- (٦) $٣ \text{ لو} - \frac{٥}{٣} \text{ لو} - ٢ \text{ لو} - \frac{١}{٣} \text{ لو} - \frac{١}{٣} \text{ لو} - ٧٣$
- (٧) $٢ \text{ لو} + \frac{١}{٥} \text{ لو} - \frac{١٥}{٢} \text{ لو} + ٣ \text{ لو} + ٥ \text{ لو} - ٣ \frac{٥}{٢} \text{ لو}$
- (٨) $٢ \text{ لو} + ٢٥ \text{ لو} + \frac{١}{٥} \text{ لو} + \frac{١}{٥} \text{ لو} + ٢٤٣ \text{ لو} + ٠.٠١ \text{ لو}$

[٢] إثبت أن :

- (١) $٩٨ \text{ لو} + \frac{٢٥}{٢} \text{ لو} - ١ \text{ لو} = \frac{١}{٢} \text{ لو} = ٢٥ \text{ لو}$
- (٢) $٢٧ \text{ لو} - \frac{٤٩}{١٣} \text{ لو} + \frac{٧}{١٢} \text{ لو} = \frac{٩١٥٤}{٦٠} \text{ لو} = ٢٧ \text{ لو}$
- (٣) $٢٥ \text{ لو} + ٢ \text{ لو} - ٧ \text{ لو} - ١٧٥ \text{ لو} = ٢ \text{ لو} = ٣٧$
- (٤) $٠.٧٥ \text{ لو} + ١٢ \text{ لو} - ٢ \text{ لو} = ٠.٣ \text{ لو} = ٣٦ \text{ لو}$
- (٥) $١ + ٢ \text{ لو} - ٤٥ \text{ لو} = ٢$
- (٦) $\frac{٣}{٢} = \frac{١٥ \text{ لو} + ١٢٥ \text{ لو} - ٢٧ \text{ لو}}{١٠٠٠ \text{ لو} - ٩ \text{ لو} - ٢ \text{ لو}}$

[٣] أوجد قيمة س فيما يلي :

- (١) $١٧٥ \text{ لو} + ١٢٥ \text{ لو} - ٣٥ \text{ لو} = ٤.٩ \text{ لو}$
- (٢) $٦٠ \text{ لو} + ٦٠ \text{ لو} = ٦٤ \text{ لو} - ٨ \text{ لو} + ٣ \text{ لو} - ٤ \text{ لو}$
- (٣) $١٠ \text{ لو} - ٢ \text{ لو} + ٣ \text{ لو} + ٠.٥ \text{ لو} - ٨١ \text{ لو} = ٠.٤ \text{ لو}$
- (٤) $٢ \text{ لو} + ٣ \text{ لو} - ١٢ \text{ لو} = ٠.٣ \text{ لو}$
- (٥) $٨ \text{ لو} = (١ - س) + (١ + س) \text{ لو}$
- (٦) $٨ \text{ لو} = (١ - س) - (١ - س) \text{ لو} - ٣ \text{ لو}$
- (٧) $٣ = (٢ + س) \text{ لو}$
- (٨) $٢٥ \text{ لو} = (٥ - س) \text{ لو} - (٤ + س) \text{ لو} - ٢ \text{ لو}$
- (٩) $٦٢٥ \text{ لو} = (١ - س) \text{ لو} - (٩ + س) \text{ لو} - ٦ \text{ لو}$

[٤] أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية : -

- (١) $(لو٢ س) + ٢ لو٢ س = ٨$ (٢) $(لو٣ س) - ٣ = ٢ لو٣ س$
- (٣) $لو٢ س + ٣ = ٢$ (٤) $لو٢ س + ٣ = ٢$
- (٥) $لو٢ س = ٢$ (٦) $لو٣ س = ١ + ٢$
- (٧) $لو٢ (س - ٨) + ٢ لو٢ س = ٦$ (٨) $لو٢ س = ٢٧$
- (٩) $لو٢ (س - ٣) + ٢ لو٢ س = ٥$ (١٠) $لو٢ س = ٤$
- (١١) $لو٢ لو٢ لو٢ (س + ١) = ٠$ (١٢) $لو٢ لو٢ لو٢ س = ١٥$
- (١٣) $لو٢ لو٢ لو٢ س = ٠$ (١٤) $لو٢ (س + ١) = ٣$
- (١٥) $لو٢ (س - ٩) - لو٢ (س - ٣) = ٢$ (١٦) $لو٢ س = ٤ \times ٢$
- (١٧) $لو٢ (س + ٣) + ٣ = ٢$ ، $س \in \mathbb{R}$

[٥] أجب عما يلى :

- (١) إذا كان : $س = ٣$ ، فأثبت أن : $٣ لو٢ س + ٥ لو٢ س - لو٢ س = ٥$
- (٢) إذا كان : $س = ٢$ ، فأثبت أن : $١ = ٢ - ٣$ ؛ $س = ٢$ ؛ $لو٢ س = ٢$
- (٣) إذا كان : $لو٢ س = ١٠$ ، فأثبت أن : $١٠ = ٢ - ٣$
- (٤) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $١٢ = ٣ - ٤$
- (٥) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (٦) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (٧) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (٨) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (٩) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (١٠) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (١١) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$
- (١٢) إذا كان : $لو٢ س = ٣$ ، فأثبت أن : $٦٤ = ٣ - ٤$

(١٣) إذا كان: لو س + لو (س - ١٥) = لو ٣٥ - لو ٧ + لو ٢١ فأوجد قيمة : س

(١٤) إذا كان : $\frac{\text{لو } ٦٤}{\text{لو } ٦٥} = \frac{\text{لو } ٣٦}{\text{لو } ٦٥} = \frac{\text{لو } ٦٤}{\text{لو } ٦٥}$ فأوجد قيمة كلا من : س ؛ ص

(١٥) إذا كان: ٣ - س = ٣ لو ٣ - ١٤ - ٤ لو ٥ + ٢ لو ٢٥ - (-) لو ٧ فأوجد قيمة : س

[٦] باستخدام حاسبة الجيب أوجد قيمة س مقربا الناتج لرقمين عشرين

$$(١) \quad ٣ - س = ٢ \quad (٢) \quad ٨ + س = ١ - س = ١$$

$$(٣) \quad ٢ + س = ١ + س = ١٥٠ \quad (٤) \quad ٥ - س = ١ - س = (٣٦ \div ٦)$$

$$(٥) \quad ١٨ - س = ٥ - س = ٧.١٢ \quad (٦) \quad ٨ = س + ٥ \times (٣٦ \div ٦)$$

[٧] باستخدام حاسبة الجيب أوجد قيم س مقربا الناتج لرقم عشرين

$$(١) \quad ٢ - س = ٢٤ + س = ٢ \times ١٠ - س = ٢٥ \quad (٢) \quad ٣٥ = ٣٥ + س = ٥ \times ١٢ - س = ٣٥$$

$$(٣) \quad ١ + س = ١ + س = ١ \times ٢٥ = ٩ \times ١ + س = ١ + س = ١٠٠٠ \quad (٤) \quad ١ + س = ١ + س = ٣٠ (س + ١)$$

$$(٥) \quad \text{إذا كان د(س) = ٢ ؛ د(س) = ١ + (١ - س) ؛ د(س) = ٣٥}$$

$$(٦) \quad \text{إذا كان د(س) = ٣ ؛ د(س) = (٢ - س) ؛ د(س) = ٢٠٠}$$

$$(٧) \quad \text{إذا كان د(س) = ٨ ؛ د(س) = ٤ ؛ د(س) = ١ - (٣ - س) ؛ د(س) = ٨٢}$$

[٨] تمارين على تمثيل الدالة

(١) مثل منحنى الدالة د(س) = لو س متخذا س $\in [٨, ١]$ ومن الرسم

أوجد قيمة لو ٥ ، ٢

(٢) مثل منحنى الدالة د(س) = لو س متخذا س $\in [٢٧, ٠.١]$ ومن الرسم

أوجد قيمة لو ٥ ، ٤

(٣) مثل منحنى الدالة د(س) = لو س متخذا س $\in [٨, ١]$ ومن الرسم

أوجد قيمة لو ٣ ، ٥ ؛ قيمة س عندما د(س) = ٢

(٤) أوجد بيانيا مجموعة حل المعادلة : لو س = ٣ - س

مذكره النفاضل

النهايات والأنتصال

الصف الثاني الثانوي

القسم العلمي

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠

النهايات والأنتصال

- مقدمة إيجاد النهاية تقدير النهاية عدديا وبيانها
- نهاية دالة عند نقطة جبريا.
- نظرية (٤) القانون.
- نهاية دالة عند اللانهاية.
- نهاية الدوال المثلثية
- بحث وجود نهاية للدالة المعرفة بأكثر من قاعدة

مترى توجيه الرياضيات
أ. عادل إودر

الكميات المعينة وغير المعينة وغير المعرفة

(١) مفاهيم ورموز وتمهيدات

$$\mathbb{R} = \text{مجموعة الأعداد الحقيقية} =]-\infty, \infty[$$

$$\mathbb{R}^+ = \text{مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة} =]0, \infty[$$

$$\mathbb{R}^- = \text{مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة} =]-\infty, 0[$$

** أنواع الكميات :

(١) الكمية المعينة : هى الكمية التى لها جواب محدد مثل : $3 - 5$ ، 9×8 ، $7 \div 4$

(٢) الكمية غير المعرفة : هى الكمية التى لا معنى لها مثل : $\frac{p}{\text{صفر}}$ ، $p \neq 0$

(٢) الرمزان ∞ ، $-\infty$:

❖ الرمز ∞ يرمز لأى كمية تكون أكبر من أى عدد حقيقى موجب يمكن إدراكه

❖ الرمز $-\infty$ يرمز لأى كمية تكون أصغر من أى عدد حقيقى سالب يمكن إدراكه

❖ إذا كان : $p \in \mathbb{R}$ فإن : $\infty = p \pm \infty$ ، $-\infty = p \pm -\infty$

$$\left. \begin{array}{l} \infty \text{ عندما } p < 0 \\ \infty - \text{ عندما } p > 0 \\ \text{كمية غير معينة عندما } p = 0 \end{array} \right\} = p \times \infty ,$$

$$\left. \begin{array}{l} -\infty \text{ عندما } p < 0 \\ \infty \text{ عندما } p > 0 \\ \text{كمية غير معينة عندما } p = 0 \end{array} \right\} = p \times -\infty$$

(٣) الكمية الغير المعينة : هى الكمية التى لا نستطيع أن نجد لها جواباً محدداً حيث يكون

لها عدد لا نهائى من الحلول مثل : $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ " كمية غير معينة "

* يوجد عدد لا نهائى من الأعداد الحقيقية إذا ضربت فى صفر كان الناتج = صفراً

$$\therefore 0 \times \text{أى عدد} = 0 \quad \therefore \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \text{أى عدد (غير معينة)}$$

$$\therefore \infty \times \text{أى عدد} = \infty \quad \therefore \frac{\infty}{\infty} = \text{أى عدد (غير معينة)}$$

$$\therefore \infty + \text{أى عدد} = \infty \quad \therefore \infty - \infty = \text{أى عدد (غير معينة)}$$

$$\therefore \frac{\text{أى عدد}}{\infty} = 0 \quad \therefore \infty \times 0 = \text{أى عدد (غير معينة)}$$

العامل الصفري :


إذا كانت د دالة فى المتغير س على صورة كثيرة حدود من درجة ن وكانت

د (١) = ٠ حيث $١ \in \mathbb{R}$ فإن المقدار (س - ١) يسمى العامل الصفري للدالة د

وهذا يعنى أن : د (س) يقبل القسمة على (س - ١) بدون باق

أى أن : د (س) = (س - ١) × كثيرة حدود أخرى

** مفهوم الرمز " ← " فى النهايات :



إذا تصورنا أن س نقطة تتحرك على خط الأعداد

فإن موضعها عند كل نقطة أثناء حركتها يعين عدداً حقيقياً ما .

قيل أن س تقترب من العدد ٢ من خلال قيم أكبر قليلاً من العدد ٢ تقترب ٢ من اليمى

أ، قيل أن س تقترب من العدد ٢ من خلال قيم أصغر قليلاً من العدد ٢ تقترب ٢ من اليسار

وإذا أقتربت س من العدد ٢ من جهة اليمين ومن اليسار قيل إن س تقترب من العدد ٢

ونعبر عن ذلك رمزياً بالصورة : س ← ٢

اعداد ١/ عادل إدوار

تقدير النهاية عددياً وبيانياً

إذا أردنا إيجاد قيمة الدالة d : $d(s) = \frac{s^2 - 1}{s - 1}$ عند $s = 1$

بالتعويض عن قيمة $s = 1$ فإن $d(1) = \frac{1^2 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$ كمية غير معينة
ولذلك نلجأ إلى دراسة نهاية $d(s)$ عندما s تقترب إلى العدد (١)

[١] الطريقة العددية

س تقترب جداً من (١) من اليمين ←											⇒ س تقترب جداً من (١) من اليسار				
س	١,٤	١,٣	١,٢	١,١	١,٠١	١	٠,٩٩	٠,٩	٠,٨	٠,٧	٠,٦				
د(س)	٢,٤	٢,٣	٢,٢	٢,١	٢,٠١	غير معينة	١,٩٩	١,٩	١,٨	١,٧	١,٦				
د(س) تقترب جداً من (٢) من اليمين ← ⇒ د(س) تقترب جداً من (٢) من اليسار															

وهذه الطريقة تسمى نهـ $d(s) = 2$

وتقرأ : نهاية $d(s)$ عندما تقترب s من ١ تساوى ٢

تعريف :

إذا كانت قيمة الدالة d تقترب من قيمة وحيدة (ل) عندما تقترب s من m من جهتي اليمين واليسار فإن نهاية $d(s)$ تساوى (ل) وتكتب رمزياً نهـ $d(s) = l$

[٢] تقدير النهاية بيانياً

$d(s) = \frac{s^2 - 1}{s - 1}$ غير معينة عند $s = 1$

$$d(s) = \frac{(s+1)(s-1)}{(s-1)} = s+1$$


ومن الرسم نجد أن $d = 1 + 1 = 2$

عندما : $s \leftarrow 1$ من اليمين واليسار

فإن $d(s) \leftarrow 2$ من فوق وتحت


فيكون : نهـ $d(s) = 2$

$s \leftarrow 1$




إعداد / عادل إدوار

مثال ١ - قدر نهاية الدالة $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$



- ١) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ٢ ٢) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ٣ ٣) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ١

مثال ٢ - قدر نهاية الدالة $f(x)$ عند النقطة المبينة




- ١) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ١ ٢) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ٢ ٣) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 1$ = ٣

غير موجودة

ليس من الضروري أن قيمة الدالة
تساوى قيمة النهاية

مثال ٣ - من الشكل البياني المقابل



- ١) نهاية $f(x)$ عندما $x \rightarrow 2$ = ٢


- ٢) $f(2)$ = ٢

إعداد / عادل محمد

(٤)

منتدى توحيد الرياضيات

مثال : من الشكل البياني المقابل



① د (٠) = ١


② د (٢) غير معرفة

③ نهـاد (س) = غير موجودة
س ← ٠

④ نهـاد (س) = ٣
س ← ٢

مثال : أكمل الجدول الآتى وأستنتج نهـاد (س) = ٢
س ← ٢

٢,١	٢,٠١	٢,٠٠١	٢	١,٩٩٩	١,٩٩	١,٩	س
٤,١	٤,٠١	٤,٠٠١	٤	٣,٩٩٩	٣,٩٩	٣,٩	د(س)



د(س) = $\frac{(٤ - ٢)(س - ٢)}{(٢ - ٢)}$ غير معينة عند س ← ١

د(س) = $\frac{(٢ + س)(٢ - س)}{(٢ - س)}$

ومن الرسم نجد أن د (س) = ٢ + ٢ = ٤

عندما : س ← ٢ من اليمين واليسار

فإن د(س) ← ٤ من فوق وتحت

فيكون : نهـاد (س) = ٤
س ← ٢




تقاربن

(١) قدر نهاية الدالة د(س) عند النقطة المبينة

Ⓐ نهـاد(س) س ← ٢

Ⓑ نهـاد(س) س ← ٢


Ⓒ نهـاد(س) س ← ٣



(٢) من الرسم البيانى أوجد

Ⓐ نهـاد(س) س ← ٠

Ⓑ د(٠)






(٣) قدر نهاية الدالة د(س) عند س ← صفر

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ



(٤) أكمل الجدول الآتى وأستنتج نهـاد(س) س ← ١

٠,٩-	٠,٩٩-	٠,٩٩٩-	١-	١,٠٠١-	١,٠١-	١,١-	س
			؟؟؟؟				د(س)

إعداد / عادل إدوار

(٦)

منتدى توجبه الرياضيات

(٥) باستخدام الحاسبة قدر نهاية الدوال الآتية

$$\textcircled{ب} \text{ نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 1]{(س^2 + 2)}$$

$$\textcircled{أ} \text{ نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 2]{(3س - 1)}$$

$$\textcircled{د} \text{ نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 3]{\frac{(س^4 - 3س + 3)}{(س - 3)}}$$

$$\textcircled{ج} \text{ نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 1]{\frac{(1 - س)}{(1 - س^3)}}$$

نهاية دالة عند نقطة

مثال : إذا كانت د (س) = ٣س + ٤ اوجد د (س) عندما س ← ٠
الحـل

∴ س ← ١ ∴ نضع س = ١ + هـ حيث عندما س ← ١ فإن هـ ← ٠

$$\therefore د (س) = (٣س + ٤) = (٣(١ + هـ) + ٤) = ٣ + ٣هـ + ٤ = ٧ + ٣هـ$$

$$\therefore د (س) \leftarrow ٧ \text{ عندما س } \leftarrow ١$$

أى أن نهاية الدالة د (س) تساوى ٧ عندما س تؤول إلى ١

$$\text{ويعبر عن ذلك بالصورة : نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 1]{(٣س + ٤)} = ٧$$

ملاحظة : فى المثال السابق نحصل على نفس النتيجة بالتعويض المباشر

نظرية : نهاية دالة كثيرة الحدود

نظرية (١)

* إذا كانت د (س) كثيرة حدود فى المتغير س فإن : نهـ $\xrightarrow[س \leftarrow م]{د (س)}$ = د (م)

$$\text{فمثلا : نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 3]{(٣س + ٤)} = (٣ + ٤) = ٧$$

نتيجة : نهاية الدالة الثابتة : إذا كانت د (س) = ل حيث ل ثابت

$$\text{فإن : نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow م]{د (س)} = ل$$

$$\text{، نهـ } \xrightarrow[س \leftarrow 2]{د (س)} = ٤$$

$$\text{فمثلا : د (س) = ٤}$$

نظرية (٢) : إذا كانت د ، م دالتين فى المتغير س

وكانت : د (س) = ل ، م (س) = م فإن :

$$(١) \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \pm \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \pm \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

$$\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \pm \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

أى أن : نهاية المجموع الجبرى لدالتين (أو أكثر) = المجموع الجبرى لنهايتيهما

$$(٢) \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \times \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

$$\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \times \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

أى أن : نهاية حاصل ضرب دالتين (أو أكثر) = حاصل ضرب نهايتيهما (النهايات)

$$(٣) \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{ل (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \times \text{ل (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

$$\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{ل (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \times \text{ل (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]$$

أى أن : نهاية حاصل ضرب ثابت × دالة = الثابت × نهاية هذه الدالة

$$(٤) \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \div \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \frac{1}{\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]}$$

$$\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \div \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] = \text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{د (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right] \times \frac{1}{\text{نهاية} \left[\begin{matrix} \text{م (س)} \\ \text{س} \leftarrow \text{م} \end{matrix} \right]}$$

أى أن :

نهاية خارج قسمة دالتين = خارج قسمة نهايتيهما حيث : نهاية المقسوم عليه \neq صفر

لإيجاد : نهاية د (س) نوجد د (م) بالتعويض المباشر فإذا كان الناتج :

١ - عدداً حقيقياً فإن نهاية الدالة عند س = م هى هذا العدد الحقيقى

٢ - عدداً حقيقياً \neq الصفر $\frac{\text{عدداً حقيقياً} \neq \text{الصفر}}{\text{صفر}}$ كمية غير معرفة " فإن الدالة لا يكون لها نهاية عند م

٣ - $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ كمية غير معينة تستخدم النظرية التالية

$$٤ - \frac{\text{صفر}}{\infty \pm} = \text{صفر}$$

نظرية (٣) : إذا كانت د، ق دالتين فى المتغير س

وكانت د (س) = ق (س) لجميع قيم س فيما عدا عند س = م

وكانت : نهـا ق (س) لها وجود
س ← م

فإن : نهـا م (س) = نهـا د (س)
س ← م

تستخدم هذه النظرية لإيجاد نهاية دالة كسرية جبرية وفيها نختصر العامل الصفري

(س - م) فى كل من البسط والمقام ويسمى عن طريق عدة طرق :

منها (!) التحليل ، (!!) القسمة المطولة ، (!!!) الضرب فى المرافق
.....

مراجعة على التحليل : يراعى أولاً إخراج العامل المشترك الأعلى

الفرق بين مربعين : س^٢ - ٩ = (س - ٣) (س + ٣)

الفرق بين مكعبين : س^٣ - ٨ = (س - ٢) (س^٢ + ٢س + ٤)

مجموع مكعبين : س^٣ + ٢٧ = (س + ٣) (س^٢ - ٣س + ٩)

المقدار الثلاثى : إذا كان معامل س^٢ = ١

$$س^٢ + ٥س + ٦ = (س + ٣)(س + ٢)$$

$$س^٢ + ٥س - ٦ = (س - ١)(س + ٦)$$

$$س^٢ - ٦س - ١٦ = (س - ٨)(س + ٢)$$

إذا كان معامل س^٢ ≠ ١

$$٣س^٢ + ١١س + ٦ = (٣س + ٢)(س + ٣)$$

$$٢س^٢ - ٥س + ٢ = (٢س - ١)(س - ٢)$$

$$٣س^٢ + ٧س - ٦ = (٣س - ٢)(س + ٣)$$

$$٣س^٢ - ١٧س - ٦ = (٣س + ١)(س - ٦)$$

المقدار الثلاثى المربع الكامل :

$$س^٢ + ٦س + ٩ = (س + ٣)^٢$$

$$٢٥س^٢ - ٤٠س + ١٦ = (٥س - ٤)^٢$$

أمثلة : أوجد كلاً مما يلى :

مثال ١ : نهـا $\frac{3س + 4}{س + 5}$ س ← ١

الحـل

بالتعويض نجد أن : نهـا $\frac{3س + 4}{س + 5}$ س ← ١ $\frac{7}{6} = \frac{4 + 1 \times 3}{5 + 1} =$

مثال ٢ : نهـا $\frac{3س + 4}{س + 1}$ س ← ١

الحـل

بالتعويض نجد أن :

نهـا $\frac{3س + 4}{س + 1}$ س ← ١ $\frac{1}{1} = \frac{4 + (1 - 1) \times 3}{1 + 1} =$ كمية غير معرفة
∴ الدالة ليس لها نهاية أو النهاية ليس لها وجود

إستخدام التحليل لإيجاد نهاية دالة عند نقطة :

مثال ٣ : نهـا $\frac{س^2 - 9}{س - 3}$ س ← ٣

الحـل

بالتعويض عن : س = ٣ نجد أن : د (٣) = $\frac{٩ - ٩}{٣ - 3} = \frac{٠}{٠}$ صفر / صفر غير معينة
∴ نهـا $\frac{س^2 - 9}{س - 3}$ س ← ٣ $\frac{٩ - ٩}{٣ - 3} = \frac{(س - 3)(س + 3)}{(س - 3)} =$
 $٦ = (س + 3) =$

مثال ٤ : نهـا $\frac{س^2 - ٥س + ٦}{س - ٢}$ س ← ٢

الحـل

بالتعويض عن س = ٢ نجد أن : د (٢) = $\frac{٦ + ٢ \times ٥ - ٦}{٢ - ٢} = \frac{١٠}{٠}$ صفر / صفر غير معينة
∴ نهـا $\frac{س^2 - ٥س + ٦}{س - ٢}$ س ← ٢ $\frac{٦ + ٢ \times ٥ - ٦}{٢ - ٢} = \frac{(س - ٢)(س - ٣)}{(س - ٢)} =$
 $١ - = (س - ٣) =$

$$\text{مثال ٥: نهـا} \frac{\text{س}^3 + \text{س}}{\text{س}^2 + \text{س} - ٦} \quad \text{س} \leftarrow ٣$$

الحـل

بالتعويض عن س = ٣ نجد أن : د (٣ -) = $\frac{٣ \times ٣ + ٩}{٦ - ٣ - ٩} = \frac{١٨}{-٦} = -٣$ غير معينة

$$\therefore \text{نهـا} \frac{\text{س}^3 + \text{س}}{\text{س}^2 + \text{س} - ٦} = \frac{\text{س}(\text{س}^2 + ١)}{(\text{س} - ٢)(\text{س} + ٣)} = \frac{\text{س}(\text{س} - ٢ + ٣)}{(\text{س} - ٢)(\text{س} + ٣)} = \frac{\text{س}(\text{س} - ٢ + ٣)}{(\text{س} - ٢)(\text{س} + ٣)}$$

$$\frac{٣}{٥} = \frac{٣ - ٢}{٢ - ٣ - ٦} = \frac{\text{س}}{(\text{س} - ٢)}$$

إستخدام القسمة المطولة لإيجاد نهاية دالة عند نقطة :

$$\text{مثال ٦: نهـا} \frac{\text{س}^٣ - ٤\text{س}^٢ + \text{س} + ٦}{\text{س}^٢ - ٤\text{س} + ٣}$$

الحـل

$$\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \frac{٦ + ٣ + \text{س}^٢ \times ٤ - \text{س}^٣}{٣ + ٣ \times ٤ - \text{س}^٢} = (٣) \text{ نجد أن : د (٣) = } \frac{٦ + ٣ + ١٢ - ٢٧}{٣ + ١٢ - ٩} = \frac{-٦}{٦} = -١$$

∴ (س - ٣) عامل مشترك بين البسط والمقام (العامل الصفرى)

بإجراء قسمة مطولة للبسط على (س - ٣) " لصعوبة تحليل البسط "

$$\begin{array}{r} \text{س} - ٣ \overline{) \text{س}^٣ - ٤\text{س}^٢ + \text{س} + ٦} \\ \underline{\text{س}^٣ - ٣\text{س}^٢} \phantom{+ \text{س} + ٦} \\ ٢\text{س}^٢ + \text{س} + ٦ \\ \underline{٢\text{س}^٢ - ٦\text{س}} \\ ٧\text{س} + ٦ \\ \underline{٧\text{س} - ٢١} \\ ٢٧ \end{array}$$

.....

$$\therefore \text{نهـا} \frac{\text{س}^٣ - ٤\text{س}^٢ + \text{س} + ٦}{\text{س}^٢ - ٤\text{س} + ٣} = \frac{(\text{س} - ٣)(\text{س}^٢ - ٦\text{س} + ٩)}{(\text{س} - ٣)(\text{س} - ٣)} = \frac{\text{س}^٢ - ٦\text{س} + ٩}{\text{س} - ٣}$$

$$\text{مثال ٧: نهـا} \frac{\text{س}^٣ - ٢\text{س}^٢ + ١}{\text{س}^٢ + ٣\text{س} - ٤} \quad \text{س} \leftarrow ١$$

(١١)

منتدى توجبه الرياضيات

الحل

بالتعويض عن $s = 1$ نجد أن : د (١) = $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$

∴ ($s - 1$) عامل مشترك بين البسط والمقام (العامل الصفري)

يمكن استخدام طريقة مبسطة لإجراء القسمة بطريقة (القسمة التركيبية)

$$\begin{array}{r} 1 \mid 1 + 0 \cdot 2 - 1 \\ \square \quad \square \quad 1 \quad \times \quad \times \\ \hline 1 - 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 + 1 \cdot 2 - 1 \\ 1 - 1 \quad 1 - 1 \quad 1 - 1 \\ \hline 0 \quad 1 - 1 - 1 \end{array}$$

خارج القسمة

$s^2 - s - 1$

$$\frac{1}{s} = \frac{1 - 1 - 1}{s^2 + s - 1} =$$

(١) نكتب معاملات المقسوم مرتبة تنازلياً وتساوى

المقسوم عليه بالصفر للحصول على قيمة s كما بالشكل

(٢) أترك أول معامل ثم أضرب المعامل الأول فى قيمة s

وأكتب الناتج أسفل المعامل الثانى وأجمع

(٣) كرر عمليتى الضرب والجمع

نجد أن معاملات خارج القسمة هي: ١ ، ١- ، ١-

على الترتيب فإن خارج القسمة هو $s^2 - s - 1$

$$\therefore \text{نهـ} \frac{(s-1)(s^2-s-1)}{(s^2+s-1)(s-1)} = \frac{s-1}{s^2+s-1}$$

$$\text{مثال ٨- : نهـ} \frac{s^3 - 7s + 6}{s^3 - 8s + 4}$$

الحل

بالتعويض عن $s = 1$ نجد أن : د (١) = $\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ غير معينة

∴ ($s - 1$) عامل مشترك بين البسط والمقام (العامل الصفري)

يمكن استخدام طريقة مبسطة لإجراء القسمة بطريقة (القسمة التركيبية)

$$\begin{array}{r} 2 \mid 6 - 7 + 0 + 1 \\ \square \quad \square \quad 2 \quad \times \quad \times \\ \hline 6 - 7 - 2 + 1 \\ 6 - 7 - 4 + 1 \\ \hline 0 \quad 3 - 2 + 1 \end{array}$$

خارج القسمة

$s^2 + 2s - 3$

$$\therefore \text{نهـ} \frac{(s-1)(s^2+s-1)}{(s-1)(s^2+s-1)} = \frac{s-1}{s^2+s-1}$$

$$= \frac{(s^2+s-1)}{(s^2+s-1)} = 1$$

$$\frac{5}{4} = \frac{(3-4+4)}{(2-6)}$$

(١٢)

منتدى توجبه الرياضيات

إعداد / عادل إدوار

الضرب فى المرافق :

إذا وجد فرق بين جذرين تربيعيين لمقدارين جبريين (فى البسط أو المقام أو كليهما)
نضرب كلاً من البسط والمقام فى مرافق (فى البسط أو المقام أو كليهما)

مثال ٩ : نهـ $\frac{s^2 + 2s}{s^2 + 9 - 3}$ $s \leftarrow 0$

الحـ $\frac{s^2 + 2s}{s^2 + 9 - 3}$

بالتعويض عن $s = 0$ نجد أن : $d(0) = \frac{0 \times 2 + 2(0)}{3 - 9 + 0} = \frac{0}{-6}$ صفر غير معينة

بالضرب بسطاً ومقاماً \times مرافق المقام : $\sqrt{s^2 + 9} + 3$ نجد أن :

نهـ $\frac{s(s+2)(\sqrt{s^2+9}-3)}{(s+3)(\sqrt{s^2+9}+3)}$ $s \leftarrow 0$

$12 = (3 + \sqrt{9+0})(2+0) =$

مثال ١٠ : نهـ $\frac{s-3}{s^2+1-2}$ $s \leftarrow 3$

الحـ $\frac{s-3}{s^2+1-2}$

بالتعويض عن $s = 3$ نجد أن : $d(3) = \frac{3-3}{3^2+1-2} = \frac{0}{8}$ صفر كمية غير معينة

بالضرب بسطاً ومقاماً \times مرافق المقام : $\sqrt{s^2+1}+2$ نجد أن :

نهـ $\frac{(s-3)(\sqrt{s^2+1}-2)}{(s+2)(\sqrt{s^2+1}+2)}$ $s \leftarrow 3$

مثال ١١ : نهـ $\left(\frac{s^2-2}{s^2-2} - \frac{s^2-2}{s^2-2} \right)$ $s \leftarrow 2$

الحـ $\frac{s^2-2}{s^2-2}$

بتوحيد المقامات نجد أن :

نهـ $\frac{s^2-2}{s^2-2}$ $s \leftarrow 2$

$$\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}} = \frac{2 - 2 - 2}{2 - 2} = (2) \text{ نجد أن : د (2) = بالتعويض عن س = 2}$$

$$\therefore \text{نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = \frac{(2 - \text{س})(1 + \text{س})}{2 - \text{س}} = 1 + 2 = 3$$

تمارين

أكمل ما يأتى

$$(1) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = (1 - \text{س}^3) = \dots \quad (2) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = \frac{27 - \text{س}^3}{3 - \text{س}}$$

$$(3) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = \frac{4 - \text{س}}{2 + \text{س}} = \dots$$

$$(4) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow \frac{\pi}{2} = (2\text{س} - \text{جاس}) = \dots$$

$$(5) \text{ إذا كان : نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = \frac{p}{1 + \text{س}} = p \quad \text{فإن : } p = \dots$$

إختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

$$(1) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = (3 - \sqrt{2}\text{س}) \quad \text{أ} \quad 8 \quad \text{ب} \quad 10 \quad \text{ج} \quad 14 \quad \text{د} \quad 16$$

$$(2) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 2 = \frac{12 - 2\text{س}^3}{2 + \text{س}} \quad \text{أ} \quad 18 \quad \text{ب} \quad 3 \quad \text{ج} \quad 12 \quad \text{د} \quad 12 -$$

$$(3) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 3 = \frac{6 - \text{س} - \text{س}^2}{12 - \text{س} + \text{س}^2} \quad \text{أ} \quad \frac{5}{7} \quad \text{ب} \quad \frac{1}{7} \quad \text{ج} \quad 1 - \quad \text{د} \quad 5 -$$

$$(4) \text{ نهـا} \quad \text{س} \leftarrow 0 = \frac{1 - \sqrt{1 + \text{س}}}{\text{س}} \quad \text{أ} \quad 0 \quad \text{ب} \quad \sqrt{2} \quad \text{ج} \quad \frac{1}{2} \quad \text{د} \quad \text{غير معرفة}$$

$$(5) \therefore \text{نهـا} \quad \text{س} \leftarrow \frac{\pi}{2} = \frac{\text{جاس}}{\text{س}} \quad \text{أ} \quad 1 \quad \text{ب} \quad \frac{\pi}{2} \quad \text{ج} \quad \frac{2}{\pi} \quad \text{د} \quad \text{غير معرفة}$$

أجد كلاً مما يأتى :

١	س ^٦ + س + ٦ نهما س ^٣ ← س + ٣	٢	س ^٦ + ٩ نهما س ^٣ ← س + ٣
٣	س ^٦ + س - ٦ نهما س ^٢ ← س - ٢	٤	س ^٩ - ٩ نهما س ^٣ ← س - ٣
٥	س ^٦ + ٥س + ٦ نهما س ^٣ ← س + ٣	٦	س ^٦ - ٥س + ٦ نهما س ^٣ ← س - ٣
٧	س ^٨ - ٨ نهما س ^٢ ← س - ٤	٨	س ^{٢٧} - ٢٧ نهما س ^٣ ← س - ٩
٩	س ^١ - ١ نهما س ^٢ ← س - ٢	١٠	س ^٣ - ١٢ نهما س ^٢ ← س - ٨
١١	س ^٢ - ١٠ نهما س ^٥ ← س - ٥	١٢	س ^٦ + ٣س - ٤ نهما س ^١ ← س - ١
١٣	س ^٦ + ٥س - ٦ نهما س ^٢ ← س + ٢	١٤	س ^{٢٧} - ٢٧ نهما س ^٣ ← س + ٩ + ١٨
١٥	س ^٦ - ٥س - ٦ نهما س ^١ ← س - ١	١٦	س ^٦ - ٧س + ١٢ نهما س ^٤ ← س - ٤
١٧	س ^٢ - ٧س + ٣ نهما س ^٣ ← س - ٣	١٨	س ^٣ - ٣س - ٤ نهما س ^١ ← س + ٣ + ٢

مذكره التفاضل (النهايات والاتصال) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

١٩	نهـا سـ ← ٢ سـ ٣ ← ٤ سـ ٤ سـ ٤	٢٠	نهـا سـ ← ١ سـ ٣ ← ٤ سـ ٤ سـ ٥
٢١	نهـا سـ ← ٤ سـ ٢ ← ٧ سـ ٤	٢٢	نهـا سـ ← ٣ سـ ٣ ← ٥ سـ ٣
٢٣	نهـا سـ ← ٣ سـ ١ ← ٢ سـ ٩ سـ ٩	٢٤	نهـا سـ ← ١ سـ ٣ ← ٢ سـ ٩ سـ ٩
٢٥	نهـا سـ ← ٢ سـ ٢ ← ٦ سـ ٤	٢٦	نهـا سـ ← ١ سـ ٢ ← ١ سـ ٣
٢٧	نهـا سـ ← ٢ سـ ٣ ← ٨ سـ ١٢	٢٨	نهـا سـ ← ٢ سـ ٣ ← ٤ سـ ٤

٢٩	نهـا سـ ← ٢ سـ ٣ ← ٤ سـ ٤ سـ ٤	٣٠	نهـا سـ ← ١ سـ ٣ ← ٤ سـ ٤ سـ ٤
٣١	نهـا سـ ← ٥ سـ ٥ ← ٤ سـ ١	٣٢	نهـا سـ ← ١ سـ ١ ← ٤ سـ ١
٣٣	نهـا سـ ← ٠ سـ ٢ ← ٢ سـ ٥	٣٤	نهـا سـ ← ٠ سـ ٢ ← ١ سـ ١
٣٥	نهـا سـ ← ١ سـ ٣ ← ٢ سـ ٢	٣٦	نهـا سـ ← ٣ سـ ٣ ← ٢ سـ ٢

إعداد / عادل إدوار

مثال: نهـا

س ← $\sqrt[5]{}$ س ← $\sqrt[5]{125}$

الحل

بالتعويض نجد أن : $d(\sqrt{5}) = \frac{\sqrt{5} \cdot 125 - 5(\sqrt{5})}{\sqrt{5} - \sqrt{5}} =$ كمية فير معينة

$$\Delta \gamma \circ = \gamma \circ \times \gamma = \frac{\gamma(\sqrt{\gamma}) - \gamma_{\text{س}}}{(\sqrt{\gamma}) - \text{س}} = \underline{\text{المقدار}} = \frac{\gamma(\sqrt{\gamma}) - \gamma_{\text{س}}}{(\sqrt{\gamma}) - \text{س}}$$

مثال ۶: $\frac{3}{7}$ سے $\frac{2}{3}$ تک

الحل

بالتعويض نجد أن : $d = \left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}$ كمية غير معينة

عندما : س ← - $\frac{3}{2}$ فإن : ۲ س ← - ۳

$$\therefore \text{المقدار} = \frac{{}^{\circ}(٢) - {}^{\circ}(٣)}{{}^{\circ}(٢) - {}^{\circ}(٣)} \times \frac{٥}{٢} = \frac{٣ - ٢}{٢ - ٣} = ١$$

مثال ۷: $\frac{(س + ۵) - ۶۲۵}{س}$

الحسن

بالتعويض نجد أن : $d = (0) = \frac{(0 + 0) - 620}{\frac{\text{صفر}}{\text{صفر}}} = \text{كمية غير معينة}$

بإضافة : (٥ + ، ٥ -) للمقام

، وعندما : س ← ، فإن : (س + ٥) ← ٥

$$\frac{{}^4(5) - {}^4(5+s)}{5 - (5+s)} \quad \text{المقدار} = \text{نه} \quad \leftarrow s$$

$$o.. = {}^3o \times {}^4e = \frac{{}^4(o) - {}^4(o+s)}{o - (o+s)} \quad \text{نه} = \frac{o \leftarrow o+s}{}$$

مثال ٨: نهـا $\frac{1 - (5-s)^5}{s-6}$ س ← ٦

الحـل

بالتعويض نجد أن : د (٦) = $\frac{1 - (5-6)^5}{6-6}$ صفر صفر كمية غير معينة

بوضع: (٦-) = (١-٥-) بالمقام ، وعندما : س ← ٦ فإن : (٥-س) ← ١

∴ المقدار = نهـا $\frac{(1) - (5-s)^5}{1 - (5-s)}$ س ← ٦

= نهـا $\frac{(1) - (5-s)^5}{1 - (5-s)}$ س ← ٥ = $1 \times 5 = 5$

مثال ٩: نهـا $\frac{(s+5)^5 - s^5}{s^3}$ و ← ٠

الحـل

بالتعويض نجد أن : د (٠) = $\frac{(0+5)^5 - 0^5}{0^3}$ صفر صفر كمية غير معينة

بالضرب بسطاً ومقاماً $\times \frac{5}{3}$ ، إضافة (٥+س ، ٥-س) بالمقام

، وعندما : و ← ٠ $\Leftarrow 5 \leftarrow 0$ ∴ (٥+س و) ← ٥

∴ المقدار = نهـا $\frac{(s+5)^5 - s^5}{s^3} \times \frac{5}{3}$ و ← ٠

= $\frac{5}{3} \times 5 = \frac{25}{3}$ س ← ٥ = $\frac{5}{3} \times 5 \times 5 = \frac{125}{3}$ س ← ٥

تمارين

أكمل ما يأتى

$$(٢) \quad \text{نهـا} \frac{\text{س}^٩ - ١}{\text{س}^٥ - ١} = \dots\dots\dots$$

$$\text{س} \leftarrow ١$$

$$(٣) \quad \text{نهـا} \frac{\text{س}^٤ - ١٦}{\text{س}^٣ + ٨} = \dots\dots\dots$$

$$\text{س} \leftarrow ٢$$

$$(٤) \quad \text{نهـا} \frac{(١ + \text{س})^٩ - ١}{\text{س}} = \dots\dots\dots$$

$$\text{س} \leftarrow ٠$$

$$(٥) \quad \text{إذا كان : نهـا} \frac{\text{س}^٥ - \text{ك}^٥}{\text{س} - \text{ك}} = ٨٠ \quad \text{فإن : ك} = \dots\dots\dots$$

إختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

$$(٦) \quad \text{نهـا} \frac{\text{س}^٥ - ٣٢}{\text{س} - ٢} \quad \text{① } ١٦ \quad \text{② } ١٦ \times ٥ \quad \text{③ } ٦٤ \quad \text{④ } ٣٢$$

$$(٧) \quad \text{نهـا} \frac{\text{س}^٥ + ١}{\text{س} + ١} \quad \text{① } ٥ \quad \text{② } ٤ \quad \text{③ } ٥ - \quad \text{④ } ٤ -$$

$$(٨) \quad \text{نهـا} \frac{(\text{س} + \text{هـ})^٧ - \text{س}^٧}{\text{هـ}} \quad \text{① } \text{س}^٧ \quad \text{② } ٧ \text{س}^٦ \quad \text{③ } \text{صفر} \quad \text{④ } ١$$

$$(٩) \quad \text{نهـا} \frac{\text{س}^{١٣} - ١}{\text{س}^{١٤} - ١} \quad \text{① } \frac{١٣}{١٩} \quad \text{② } \frac{١٩}{١٣} \quad \text{③ } ٦ - \quad \text{④ } \frac{١٣}{١٩}$$

أوجد كلاً مما يأتى :

١	نهـا $\frac{\text{س}^٥ - ٢٤٣}{\text{س} - ٣}$	٢	نهـا $\frac{\text{س}^٦ - ٦٤}{\text{س} - ٢}$
٣	نهـا $\frac{\text{س}^٥ + ٣٢}{\text{س} + ٢}$	٤	نهـا $\frac{\text{س}^٧ - ٣\sqrt[٣]{٢٧}}{\text{س} + \sqrt[٣]{٢}}$

مذكره التفاضل (النهايات والاتصال) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

٥	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س^٢ - ٤}$ س ← ٢	٦	نها $\frac{س^٣ - ٢٧}{س - ١}$ س ← ١
٧	نها $\frac{س^٥ - ٨١}{س^٣ - ٣}$ س ← ٣	٨	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س^٢ + ٢س}$ س ← ٢
٩	نها $\frac{س^٧ + ١٢٨}{س^٢ + ٨}$ س ← ٢	١٠	نها $\frac{س^٤ - ٨١}{س^٣ + ٢٧}$ س ← ٣
١١	نها $\frac{س^٥ - ٢٤}{س^٢ - ٢}$ س ← ٢	١٢	نها $\frac{س^٥ - ٢٥}{س^٢ - ٥}$ س ← ٢
١٣	نها $\frac{س^٥ - ٢٤٣}{س^٣ - ٨}$ س ← ٣	١٤	نها $\frac{س^٤ - ٦٢٥}{س^٣ + ١٢٥}$ س ← ٣
١٥	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س^٧ + ١}$ س ← ١	١٦	نها $\frac{س^٣ - ٨}{س^٢ - ٢}$ س ← ٢
١٧	نها $\frac{س^٥ - ١٢٨}{س^٢ - ١٦}$ س ← ٢	١٨	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س^٢ - ١}$ س ← ١
١٩	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س}$ س ← ٠	٢٠	نها $\frac{س^٤ - ٨١}{س}$ س ← ٠
٢٢ ١	نها $\frac{س^٥ - ١}{س}$ س ← ٠	٢٢	نها $\frac{س^٥ - ١}{س^٣ + ٣}$ س ← ٣
٢٣	نها $\frac{س^٥ - ١}{س^٢ + ٨}$ س ← ٠	٢٤	نها $\frac{س^٤ - ١٦}{س^٢ - ٣}$ س ← ٣

٢٥	نهـا س ← ٤ س ← ٤	$\frac{(س - ٣)^٦ - ١}{س - ٤}$
٢٦	نهـا س ← ٣ س ← ٣	$\frac{(٢ +)^٥ - ١}{س - ٣}$
٢٧	نهـا س ← ١ س ← ١	$\frac{(س + ٢)^٦ - ١}{س - ١}$
٢٨	نهـا س ← ٠ س ← ٠	$\frac{(١ + ٣س)^٧ - ١}{س}$
٢٩	نهـا س ← ٠ س ← ٠	$\frac{(١ + ٥س)^٩ - ١}{س}$
٣٠	نهـا ه ← ٠ ه ← ٠	$\frac{(س + ٥ه) - ٩س}{ه}$
٣١	نهـا و ← ٠ و ← ٠	$\frac{(س + ٤و) - ٤س}{و}$
٣٢	نهـا و ← ٠ و ← ٠	$\frac{(س + ٣و)^٨ - ٨س}{و}$
٣٣	نهـا س ← ٢ س ← ٢	$\frac{(س - ٣)^٦ - ١}{س - ٢}$
٣٤	نهـا س ← ٢ س ← ٢	$\frac{(٣ -)^٦ - ١}{س - ٢}$
٣٥	نهـا س ← ٣ س ← ٣	$\frac{(١ + ٣س)^٨ - ٨س}{س - ٣}$
٣٦	نهـا س ← ٢ س ← ٢	$\frac{١٦٠ - ٦س + ٦س}{س - ٢}$
٣٧	نهـا س ← ٣ س ← ٣	$\frac{(س - ٢) + س - ٤}{س - ٣}$
٣٨	نهـا س ← ٢ س ← ٢	$\frac{١٦س - ١}{س - ٢}$
٣٩	نهـا س ← ١ س ← ١	$\frac{١ - ٦س}{١ - ٤س}$
٤٠	نهـا س ← ٤ س ← ٤	$\frac{١٢٨ - ٦س}{س - ٤}$
٤١	نهـا س ← ٢ س ← ٢	$\frac{٣س + ٦ - ٢}{س - ٢}$
٤٢	نهـا س ← ١ س ← ١	$\frac{٣س + ٦ - ٢}{س - ١}$
٤٣	نهـا س ← ٤ س ← ٤	$\frac{س - ٤}{س - ٢}$
٤٤	نهـا س ← ٩ س ← ٩	$\frac{س - ٣}{س - ٩}$

$$(٤٥) \quad \left[\frac{1 - s^6}{1 - s^3} \times \frac{1 - s}{\sqrt{s^2 - 3s + 2}} \right] \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 1 \end{array}$$

$$(٤٦) \quad \left[\frac{s^{10} - s}{s^{13} - s} - \frac{1 + s}{\sqrt{s^2 - 3s + 2}} \right] \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 1 \end{array}$$

$$(٤٧) \quad \left[\frac{s^3(32 - s^5)}{s^2(2 - s)} \times \frac{1}{s^4 - 16} \right] \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 2 \end{array}$$

$$(٤٨) \quad \frac{s \sqrt{s^2 - 3s + 2} - 4}{s - 4} \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 4 \end{array}$$

$$(٤٩) \quad \text{إذا كانت : } \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 1 \end{array} \quad \varepsilon = \frac{s^6 + s(1 - p) - p}{s - 1} \quad \text{أوجد قيمة : } p$$

$$(٥٠) \quad \left. \begin{array}{l} 0 < s, \quad s^4 - 5 \\ s^2 - s^6 - 1, \quad s > 0 \end{array} \right\} = (s) \quad \text{إذا كانت : د (س)}$$

$$\text{أوجد : } \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 2 \end{array} \quad \text{د (س)}, \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 5 \end{array} \quad \text{د (س)}$$

$$(٥١) \quad \text{إذا كانت : } \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow p \end{array} \quad 12 = \frac{s^8 - p^8}{s^6 - p^6} \quad \text{أوجد قيمة : } p$$

$$(٥٢) \quad \text{إذا كانت : د (س) = س}^4 \quad \text{أوجد : } \quad \begin{array}{l} \text{نهـ} \\ \text{س} \leftarrow 3 \end{array} \quad \frac{\text{د (س)} - \text{د (3)}}{s - 3}$$

نهاية الدالة عند اللانهاية

إذا كانت د (س) تقترب من قيمة حقيقية معينة (ل مثلاً) عندما تقترب س من اللانهاية فإننا نقول أن الدالة لها نهاية

ونعبر عن ذلك رمزياً بالصورة $\lim_{s \rightarrow \infty} d(s) = l$

نظرية (١) : $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = \text{صفر}$

نتيجة (١) : $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s} = \text{صفر}$ حيث : $l \neq 0, \{0\} - \infty$

نتيجة (٢) : $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s^m} = \text{صفر}$ حيث : $l \neq 0, \{0\} - \infty, m \neq 0$

تستخدم النظرية ونتائجها فى إيجاد $\lim_{s \rightarrow \infty} d(s)$ حينما

(١) تكون الدالة د على شكل كسر جبرى

(٢) كان التعويض المباشر يعطى $\frac{\infty}{\infty}$ ، أو $\infty - \infty$

وذلك بأن نقسم كلاً من البسط والمقام على (س) مرفوعاً لأعلى قوة أس فى مقام الكسر

، أما إذا أعطى ($\infty - \infty$) فنضرب فى المرافق أولاً

ثم نقسم كلاً من البسط والمقام على المتغير (س) مرفوعاً لأعلى قوة (أس) فى المقام

أمثلة : أوجد كلاً مما يلي :

مثال ١ : نهـا $\frac{5س^٢ - ٣س}{س^٢ - ٢}$ $\infty \leftarrow س$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على س^٢

∴ المقدار = نهـا $\frac{\frac{٥}{س} - ٣}{١ - \frac{٢}{س}}$ $\infty \leftarrow س$ $\frac{٥}{س} = \frac{٥ - ٣س}{س - ٢}$

مثال ٢ : نهـا $\frac{5س^٢ - ٣س + ٦}{س^٣ - ٧س^٢}$ $\infty \leftarrow س$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على س^٣

∴ المقدار = نهـا $\frac{\frac{٥}{س} + \frac{٦}{س^٣} - ٣}{١ - \frac{٧}{س}}$ $\infty \leftarrow س$ $\frac{٥}{٧} = \frac{٥ + ٠ - ٣س}{٧ - ٠}$

مثال ٣ : نهـا $\frac{٦ + ٣س^٢}{س^٣ - ٧س^٢}$ $\infty \leftarrow س$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على س^٣

∴ المقدار = نهـا $\frac{\frac{٦}{س^٣} + \frac{٣}{س}}{١ - \frac{٧}{س}}$ $\infty \leftarrow س$ $\frac{٠}{٧} = \frac{٠ + ٠}{٧ - ٠}$ صفر

مثال : نهـا $\frac{9s^3 - 2s^2 + 5}{2s^2 - s}$ $s \leftarrow \infty$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على s^2

∴ المقدار = نهـا $\frac{9s^3 - 2s^2 + 5}{2s^2 - s} = \frac{\frac{9}{s} + \frac{2}{s} - \frac{5}{s^2}}{2 - \frac{1}{s}}$ $s \leftarrow \infty$

∴ ليس للدالة نهاية (اكبر أس فى المقام)

مثال : نهـا $\frac{(s-2)(s^3+1)}{(s^4+3)(s^2-1)}$ $s \leftarrow \infty$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على $s^3 = s \times s^2 = s^2 \times s$

∴ المقدار = نهـا $\frac{(s-2)(s^3+1)}{(s^4+3)(s^2-1)} = \frac{(\frac{1}{s} + \frac{3}{s})(\frac{2}{s} - 1)}{(\frac{1}{s} - 5)(\frac{3}{s} + \frac{4}{s})}$ $s \leftarrow \infty$

مثال : نهـا $\frac{\sqrt[3]{8s^3+1}}{\sqrt[3]{9s^2-5}}$ $s \leftarrow \infty$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على $s = \sqrt[3]{s^3} = \sqrt[3]{s^2} = s$

∴ المقدار = نهـا $\frac{\sqrt[3]{8s^3+1}}{\sqrt[3]{9s^2-5}} = \frac{\sqrt[3]{8 + \frac{1}{s^3}}}{\sqrt[3]{9 - \frac{5}{s^2}}}$ $s \leftarrow \infty$

مثال ٧: نهـا $\lim_{s \rightarrow \infty} (\sqrt{s^2 + 1} - \sqrt{s^2 - 1})$

الحـل

∴ د (∞) = ∞ - ∞ = كمية غير معنة

بالضرب بسطاً ومقاماً × المرافق نجد :

∴ د (س) = $\frac{(\sqrt{s^2 + 1} + \sqrt{s^2 - 1})}{(\sqrt{s^2 + 1} - \sqrt{s^2 - 1})} \times (\sqrt{s^2 + 1} - \sqrt{s^2 - 1})$

∴ نهـا $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(s + 1) - (s - 1)}{(\sqrt{s^2 + 1} + \sqrt{s^2 - 1})}$

= $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(s - 1)}{(\sqrt{s^2 + 1} + \sqrt{s^2 - 1})}$

بقسمة كل من البسط والمقام على س = $\sqrt{s^2 + 1}$

∴ نهـا $\lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{s}}{\sqrt{1 + \frac{1}{s^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{s^2}}}$

$\frac{1}{2} = \frac{0 - 1}{1 + 1}$

تمارين

أكمل ما يأتى

$$(١) \text{ نهايا } \frac{3}{s} \text{ س } \leftarrow \infty = \dots\dots\dots$$

$$(٢) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{s}}{\sqrt{s}-5} \text{ س } \leftarrow \infty = \dots\dots\dots$$

$$(٣) \text{ نهايا } \frac{s^2 + 5s + 8}{s^3 + 2s^2 + 8} \text{ س } \leftarrow \infty = \dots\dots\dots$$

$$(٤) \text{ نهايا } \left(3 + \frac{7}{s} \right) \text{ س } \leftarrow \infty = \dots\dots\dots$$

$$(٥) \text{ نهايا } (3s^2 + 7s - 5) \text{ س } \leftarrow \infty = \dots\dots\dots$$

إختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

$$(١) \text{ نهايا } \frac{s^2 - 4}{s - 2} \text{ س } \leftarrow \infty \quad \text{ ١) } 4 \quad \text{ ٢) } -2 \quad \text{ ٣) } 0 \quad \text{ ٤) } \infty$$

$$(٢) \text{ نهايا } \frac{\sqrt{s+3}}{\sqrt{s}+2} \text{ س } \leftarrow \infty \quad \text{ ١) } 3 \quad \text{ ٢) } 1 \quad \text{ ٣) } 0 \quad \text{ ٤) } \frac{3}{2}$$

$$(٣) \text{ نهايا } \frac{(s+1)(s+3)}{s^3 + 2s^2 + 8} \text{ س } \leftarrow \infty \quad \text{ ١) } \frac{3}{2} \quad \text{ ٢) } \frac{2}{3} \quad \text{ ٣) } \text{ صفر } \quad \text{ ٤) } \frac{2}{7}$$

$$(٤) \text{ نهايا } \frac{\sqrt[3]{s^8 - 7}}{\sqrt[3]{9s^2 + 3}} \text{ س } \leftarrow \infty \quad \text{ ١) } \frac{8}{9} \quad \text{ ٢) } \frac{7}{3} \quad \text{ ٣) } \frac{1}{2} \quad \text{ ٤) } \frac{2}{3}$$

أوجد كلاً مما يأتى :

١	$\frac{4 - 3s}{\infty \leftarrow 5s - 1}$	٢	$\frac{3s + 4}{\infty \leftarrow 2s - 1}$
٣	$\frac{5s - 3s + 1}{\infty \leftarrow 2s + 5}$	٤	$\frac{3s + 2s + 1}{\infty \leftarrow 2s - 6s - 2}$
٥	$\frac{2s - 3s - 4s}{\infty \leftarrow 3s - 7}$	٦	$\frac{3s - 2}{\infty \leftarrow 3s - 4}$
٧	$\frac{5s - 3s - 3}{\infty \leftarrow 3s + 7}$	٨	$\frac{3s + 3s - 1}{\infty \leftarrow 6s - 2s + 7}$
٩	$\frac{4s + 5s - 4}{\infty \leftarrow (1 + 3s)(1 - 2s)}$	١٠	$\frac{(5 + s)(1 - 7s)}{\infty \leftarrow (4 + s)(2s - s)}$
١١	$\frac{s(1 - s)}{\infty \leftarrow s(5s + 2 - s)}$	١٢	$\frac{(3 + s)(1 - s)(5 + 2s)}{\infty \leftarrow s(4 - s)(1 + 3s)}$
١٣	$\frac{1 - s}{\infty \leftarrow 7 + 4s}$	١٤	$\frac{1 - 9s - s}{\infty \leftarrow 2s + 3}$
١٥	$\frac{4 + 5s - 3s}{\infty \leftarrow 4s - 3}$	١٦	$\frac{6 - 2s}{\infty \leftarrow 8s - 3s}$
١٧	$\frac{1 + 3s - 3s}{\infty \leftarrow 5 - 16s}$	١٨	$\frac{7s - 7s + s}{\infty \leftarrow 3s - 16s}$

مذكره التفاضل (النهايات والاتصال) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

١٩	نهـا س ← ∞ $\frac{\sqrt[3]{8s^3 - 3s} - 5}{\sqrt[6]{s^6 - 5}}$	٢٠	نهـا س ← ∞ $\frac{\sqrt{s^2 + 5} + \sqrt{s^2 + 9}}{\sqrt{s^2 + 9}}$
٢١	نهـا س ← ∞ $\frac{\sqrt{s^2 - 4} - \sqrt{s^2 + 2}}{\sqrt{s^2 + 1}}$	٢٢	نهـا س ← ∞ $\frac{\sqrt[3]{8s^3 - 27} - 3}{\sqrt{s^2 - 7}}$
٢٣	نهـا س ← ∞ $\frac{(1 + \sqrt[3]{s^3}) + \sqrt[6]{s^6}}{(1 - \sqrt[3]{s^3}) - \sqrt[6]{s^6}}$	٢٤	نهـا س ← ∞ $\left(\frac{\sqrt[6]{s^6}}{(3 - \sqrt[6]{s^6}) - 1} \right)$
٢٥	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 + 5} - \sqrt{s^2 - 1} \right)$	٢٦	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 + 5} - \sqrt{s^2 - 1} \right)$
٢٧	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 + 3} - \sqrt{s^2 - 1} \right)$	٢٨	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 - 4} - \sqrt{s^2 + 9} \right)$
٢٩	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 + 1} - \sqrt{s^2 - 4} \right)$	٣٠	نهـا س ← ∞ $\left(\sqrt{s^2 + 3} - \sqrt{s^2 - 4} \right)$
٣١	نهـا س ← ∞ $\frac{3 - \sqrt[3]{s^3} + \sqrt[6]{s^6} - 1}{2 + \sqrt[6]{s^6} - 5 - \sqrt[6]{s^6}}$	٣٢	نهـا س ← ∞ $\frac{5 - \sqrt[6]{s^6} + \sqrt[6]{s^6} - 4}{2 - \sqrt[6]{s^6} - 5 - \sqrt[6]{s^6}}$
٣٣	أوجد قيمة ك إذا كان : - نهـا س ← ∞ $\frac{\sqrt[3]{Ks^3} + \sqrt[6]{s^6}}{\sqrt[6]{s^6} + 6} = 1$	٣٤	نهـا س ← ∞ $\frac{3 \times 5 + 7 \times 2}{9 \times 7 - 6 \times 4}$

٣٥ (إذا كانت : د (س) = $\frac{\sqrt[6]{s^6} - 3}{5 - \sqrt[6]{s^6}}$ وكانت نهـا د (س) = ٤

، نهـا د (س) = ٣ أوجد قيمة كل من : م ، ب

إعداد / عادل إدوار

نهاية الدوال المثلثية

حقائق هامة :

كلاً من : حاس ، حتاس معرفة لجميع قيم $s \in \mathbb{R}$ أما طاس معرفة لجميع قيم $s \in \mathbb{R}$ ما عدا عند $s = \frac{1+\pi^2}{2}$ ، $\pi \in \mathbb{R}$ ، فمثلاً : $\frac{\pi}{2}$ غير معرف

(١) نهـا حاس = p ، $p \in \mathbb{R}$ ، $\mathbb{R} \ni s$

(٢) نهـا حتاس = p ، $p \in \mathbb{R}$ ، $\mathbb{R} \ni s$

(٣) نهـا طاس = p ، $p \in \mathbb{R}$ ، $\pi \frac{1+\pi^2}{2} \neq s$ ، $\pi \in \mathbb{R}$ ، $\mathbb{R} \ni s$

نظرية : نهـا حاس = $\frac{1}{s}$ (حيث s مقاسة بالتقدير الدائرى) $s \in \mathbb{R}$

نتيجة (١) : نهـا طاس = $\frac{1}{s}$ (حيث s مقاسة بالتقدير الدائرى) $s \in \mathbb{R}$

نتيجة (٢) : نهـا حاس = $\frac{p}{b}$ (حيث s مقاسة بالتقدير الدائرى) $s \in \mathbb{R}$

نهـا طاس = $\frac{p}{b}$ (حيث s مقاسة بالتقدير الدائرى) $s \in \mathbb{R}$

$$\frac{1}{p} = \frac{\frac{s}{\text{جا } s}}{\frac{s}{\text{جا } s}} = \frac{s}{\text{جا } s} \quad \text{نهـا} = \frac{s}{\text{جا } s} \quad \text{نهـا} = \frac{s}{\text{جا } s}$$

نتيجة (٣) : نهـا حاس = $\frac{1}{s}$ ، نهـا حاس = $\frac{p}{s}$ ، $s \in \mathbb{R}$ ، $\mathbb{R} \ni s$

$$p = \frac{p}{s} \quad \text{نهـا} = \frac{p}{s} \quad \text{نهـا} = \frac{p}{s} \quad \text{نهـا} = \frac{p}{s}$$

مذکرہ التفاضل (النهايات والاتصال) الصف الثاني الثانوى [القسم العلمى] الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٠

مثال ١: ① نهـا $\frac{\text{حا ٥ س}}{\text{س}}$ = ٥ س ← ٠ ② نهـا $\frac{\text{ظا ٢ س}}{\text{س}}$ = ٢ س ← ٠

مثال ٢: ① نهـا $\frac{\text{ظا ٥ س}}{\text{س ٤}}$ = $\frac{٥}{٤}$ س ← ٠

② نهـا $\frac{\text{جا ٢ س}}{\text{س ٦}}$ = $\frac{٢}{٦} \div ٦ = ٤$ س ← ٠

مثال ٣: ① نهـا $\frac{\text{حا ٣ س}^٢}{\text{س}^٢}$ = نهـا $\frac{\text{حا ٣ س}^٢}{\text{س}^٢}$ = ٣ س ← ٠

② نهـا $\frac{\text{ظا ٥ س}}{\text{س}}$ = نهـا $\left(\frac{\text{ظا ٥ س}}{\text{س}} \right)^٢$ = ٢٥ س ← ٠

مثال ٤: نهـا $\frac{\text{حا ٤ س}^٢}{\text{س}^٢}$ = نهـا $\left(\frac{\text{جا ٤ س}}{\text{س}} \right)^٢$ = ٤ = ١٦ س ← ٠

مثال ٥: نهـا $\frac{\text{حا ٥ س}}{\text{س ٣ ظا ٤ س}}$ س ← ٠

الحل

بقسمة كل من البسط والمقام على س ينتج

$\frac{١}{٣} = \frac{\text{نهـا}}{\text{س ٣}} \times \frac{\text{حا ٥ س}}{\text{س}} = \frac{\text{س}}{\text{ظا ٤ س}} \times \frac{١}{٣} = \frac{٥}{١٢}$

مثال ٦: نهـا $\frac{\text{س ٧ + حا ٣ س}}{\text{س ٣ - ظا س}}$ س ← ٠

الحل

بقسمة كل من البسط والمقام على س ينتج

$٥ = \frac{٣ + ٧}{١ - ٣} = \frac{\frac{\text{جا ٣ س}}{\text{س}} + \frac{\text{س ٧}}{\text{س}}}{\frac{\text{ظا س}}{\text{س}} + \frac{\text{س ٣}}{\text{س}}} = \frac{\text{نهـا}}{\text{س ٣ - ظا س}}$

اعداد ١/ عادل إدوار

(٣٢)

منتدى توجبه الرياضيات

مثال ۷: نهـا $\frac{6س^2 + 3حا^2}{س^2 - 5س}$

الحـل

بقسمة كل من البسط والمقام على س^۲

$$9 = \frac{4 \times 3 + 6}{3 - 5} = \frac{\frac{6س^2}{س^2} + \frac{3(3س^2)}{س^2}}{\frac{3س^2}{س^2} - \frac{5س^2}{س^2}} = \frac{6 + 9}{3 - 5}$$

مثال ۸: نهـا $\frac{(5س - 15)حا}{س - 3}$

الحـل

∴ س ← ۳ ∴ (س - ۳) ← ۰

$$5 = \frac{(5س - 15)حا}{س - 3} = \frac{(5س - 15)حا}{س - 3}$$

مثال ۹: نهـا $\frac{(9س - \pi^3)طا}{\pi - 3س}$

الحـل

∴ س ← $\frac{\pi}{3}$ ∴ س ← $\frac{\pi}{3}$ ∴ ۳س ← π

$$3 = \frac{(9س - \pi^3)طا}{\pi - 3س} = \frac{(9س - \pi^3)طا}{\pi - 3س}$$

مثال ۱۰: نهـا $\frac{(2س - \frac{\pi}{4})جا}{\frac{\pi}{4} - س}$

الحـل

∴ س ← $\frac{\pi}{4}$ ∴ س ← $\frac{\pi}{4}$ ∴ ۴س ← π

$$\frac{1}{4} = 1 \times \frac{1}{4} = \frac{\pi - 4س}{\pi - 4س} \times \frac{(2س - \frac{\pi}{4})جا}{\frac{\pi}{4} - س} = \frac{(2س - \frac{\pi}{4})جا}{\pi - 4س}$$

اعداد ۲ / عادل إدوار

(۳۳)

منتدی توجیه الرياضيات

مثال ١١ - نهـا : جتا س

س ← π ظا (س - π)

الحـل

$$\therefore \pi \leftarrow \text{س} \quad \therefore \text{س} \leftarrow \frac{\pi}{2} \quad \therefore \text{س} - \frac{\pi}{2} \leftarrow 0$$

$$\frac{1}{2} = \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{س})}{(\pi - \text{س})} \times \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{س})}{(\frac{\pi}{2} - \text{س})} \times \frac{1}{2} = \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{س})}{(\pi - \text{س})} \times \frac{1}{2} = \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{س})}{(\pi - \text{س})} \times \frac{1}{2}$$

مثال ١٢ - نهـا : جتا س

س ← π ظا (س - π)

الحـل

$$\text{بوضع ص} = \frac{\pi}{2} - \text{س} \quad \therefore \text{س} = \frac{\pi}{2} - \text{ص}$$

$$\text{وعندما س} \leftarrow \frac{\pi}{2} \quad \therefore \text{ص} \leftarrow 0$$

$$\frac{1}{2} = \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{ص})}{(\pi - \text{ص})} \times \frac{1}{2} = \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{ص})}{(\pi - \text{ص})} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{(\frac{\pi}{2} - \text{ص})}{(\pi - \text{ص})} \times \frac{1}{2}$$

$$\text{وبوضع د (ص)} = \frac{1 - \text{جتا ص}}{1 + \text{جتا ص}} \times \frac{1 - \text{جتا ص}}{1 + \text{جتا ص}} = \frac{1 - \text{جتا ص}}{1 + \text{جتا ص}}$$

$$= \frac{1}{1 + \text{جتا ص}} \times \frac{1}{1 + \text{جتا ص}} = \frac{1}{(1 + \text{جتا ص})^2}$$

$$\therefore \text{نهـا د (ص)} = \frac{1}{(1 + \text{جتا ص})^2} \times \frac{1}{(1 + \text{جتا ص})^2} = \frac{1}{(1 + \text{جتا ص})^4}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1 + 1} \times \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{4}$$

تقارین

أكمل ما يأتى

(١) نهـا جتا ٣ س =
س ← ٠

(٢) نهـا $\frac{\text{جا } \sqrt{s}}{\sqrt{s}}$ =
س ← ٠

(٣) نهـا $\frac{٤ + ٥ س}{\text{جتا } ٣ س}$ =
س ← ٠

(٤) نهـا $\frac{\text{جا } ٦ س}{٥ س}$ =
س ← ٠

(٥) نهـا (٣ س قتا ٢ س) =
س ← ٠

إختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاه

(١) نهـا $\frac{٢ س + \text{جا } ٣ س}{\text{ظا } ٥ س}$ س ← ٠
① ٥ ② $\frac{٦}{٥}$ ③ ١ ④ صفر

(٢) نهـا $\frac{\text{جتا } ٣ س \text{ جا } ٢ س}{٦ س}$ س ← ٠
① ٣ ② ١ ③ ٠ ④ $\frac{١}{٣}$

(٣) نهـا $\frac{\text{جا } هـ}{هـ - \pi}$ س ← ٠
① π ② π ③ $\pi -$ ④ ١

(٤) نهـا $\frac{١ - \text{ظا } س}{\text{جا } س - \text{جتا } س}$ س ← ٠
① ١ ② ١ - ③ ٠ ④ غير معرف

أوجد كلاً مما يأتى :

١	نها $\frac{\text{حـا } ٤ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٥}$	٢	نها $\frac{\text{س} ٦}{\text{س} \leftarrow ٢ \text{ طا}}$
٣	نها $\frac{\text{حـا } ٥ \text{ س}^٢}{\text{س} \leftarrow ٢ \text{ س}^٢}$	٤	نها $\frac{\text{س} ٣ \text{ طا}^٢ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٤ \text{ س}^٢}$
٥	نها $\frac{\text{حـا } ٦ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٥ \text{ طا}}$	٦	نها $\frac{\text{حـا } ٢ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٣ \text{ طا}^٢ \text{ س}^٢}$
٧	نها $\frac{\text{حـا } (٢ \text{ س} - ٤)}{\text{س} \leftarrow ٢ \text{ س} - ٢}$	٨	نها $\frac{\text{طا } (٢ \text{ س} - ٦)}{\text{س} \leftarrow ٣ \text{ س} - ٩}$
٩	نها $\frac{\text{حـا } ٢ \text{ س} + \text{طا } ٣ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٥ \text{ س}}$	١٠	نها $\frac{\text{حـا } ٣ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٥ \text{ س حتا س}}$
١١	نها $\frac{\text{حـا } ٤ \text{ س} - \text{طا } ٣ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٥ \text{ س حتا س}}$	١٢	نها $\frac{\text{س} ٦ - \text{حـا } ٢ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٨ \text{ س} + \text{حـا } ٢ \text{ س}}$
١٣	نها $\frac{\text{س} ٥ + \text{حـا } ٢ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow ٤ \text{ س} - \text{طا } ٢ \text{ س}}$	١٤	نها $\frac{\text{س} ٣ + \text{حـا } ٥ \text{ س}^٢}{\text{س} \leftarrow \text{س}^٢ + \text{طا س}^٢}$
١٥	نها $\frac{\text{حـا } ٤ \text{ س}^٢ - \text{س} ٣ \text{ س}^٢}{\text{س} \leftarrow \text{س}^٢ + \text{طا س}^٢}$	١٦	نها $\frac{\text{س}^٢ \text{ حتا س}^٢ + \text{طا } ٣ \text{ س}^٢}{\text{س} \leftarrow \text{س}^٢ - \text{حـا } ٢ \text{ س}}$
١٧	نها $\frac{\text{حـا } ٢ \text{ س}^٢ + \text{س} ٣ \text{ س}^٢}{\text{س} \leftarrow \text{س}^٢ \text{ حتا س}^٢}$	١٨	نها $\frac{\text{س} ٣ \text{ حـا } ٢ \text{ س}}{\text{س} \leftarrow \text{س}^٢ - \text{طا } ٣ \text{ س}^٢}$

١٩	نهـا س ← ٠ ٢ س ^٢ حتا ^٢ س	٢٠	نهـا س ^١ حا س ← ٠ س
٢١	نهـا [س (قتا س + طتا س)] س ← ٠	٢٢	نهـا س ^٢ حا س ← ٠ س ط ^٢ س
٢٣	نهـا جا $\frac{1}{p}$ س س ← ٠ ٢ س	٢٤	نهـا ٤ س حتا ^٢ س س ← ٠ (١ + ٢ س) ط ^٢ س
٢٥	نهـا س ← ٠ ٢ س ^٢ حتا ^٢ س	٢٦	نهـا ٢ س ^٣ + حا ^٢ س ^٣ س ← ٠ س ^٤ - ط ^٢ س ^٢ س
٢٧	نهـا س ← ٠ ٣ س ^٢ - ط ^٢ س ^٢ س	٢٨	نهـا ١ - حتا ^٢ س ^٣ س ← ٠ ٤ س ^٢
٢٩	نهـا س ← ٠ طا (٤ س - ط)	٣٠	نهـا طا (٩ س - ٦ ط) س ← ٠ جا (٣ س - ط)

نهاية الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة

نظرية :

الدالة d (س) تؤول للنهاية l عندما $s \leftarrow p$ إذا و فقط إذا كانت نهايتها اليمنى و اليسرى عند p موجودتين و كل منهما تساوى l

أى أن : نهـ d (س) l إذا و فقط إذا كان : $d = (p^+) = d = (p^-)$ $s \leftarrow p$

ملاحظات :

❖ إذا كان : $d = (p^+) = d = (p^-)$ $s \leftarrow p$ فإن : نهـ d (س) l

و بالعكس إذا كان : نهـ d (س) l فإن : $d = (p^+) = d = (p^-)$ $s \leftarrow p$

❖ عند إيجاد نهاية دالة عندما $s \leftarrow p$ يراعى الآتى :

• إذا كانت قاعدة الدالة مختلفة على يمين و يسار p مباشرة يجب بحث كل من

النهاية اليمنى و النهاية اليسرى للدالة ثم مقارنة النهايتين " إن وجدتا "

أما إذا كانت قاعدة الدالة واحدة على يمين و يسار p مباشرة فيمكن بحث نهاية الدالة مباشرة دون بحث النهاية و النهاية اليسرى

➤ إذا كان : $d = (p^+) \neq d = (p^-)$ $s \leftarrow p$ فإن : نهـ d (س) ليست موجودة

➤ إذا كانت الدالة d معرفة على $[p, b]$ أو $[a, p]$ ، b ، a فليبحث نهاية الدالة عند p نبحث النهاية اليمنى فقط و إن وجدت تكون هى نهاية الدالة عند p و لبحث نهاية الدالة عند b نبحث النهاية اليسرى فقط و إن وجدت تكون هى نهاية الدالة عند b

مثال : إذا كانت : d (س) $\left. \begin{array}{l} 3s + 1 \\ s - 5 \end{array} \right\} =$ عندما $s > 1$ أوجد كلاً من : عندما $s < 1$

① نهـ d (س) $s \leftarrow p$ ② نهـ d (س) $s \leftarrow p$ ③ نهـ d (س) $s \leftarrow p$

إعداد / عادل إدوار

(٣٨)

منتدى توجبه الرياضيات

الحل

① ∴ الدالة لها نفس القاعدة على يمين و يسار $s = 0$ و هى : $d(s) = 3s + 1$
 ∴ نهـاد (s) = نهـا $(3s + 1)$ $s \leftarrow 0$
 $1 = 1 + 0 \times 3$

② ∴ الدالة لها نفس القاعدة على يمين و يسار $s = 3$ و هى : $d(s) = s - 5$
 ∴ نهـاد (s) = نهـا $(s - 5)$ $s \leftarrow 3$
 $2 = 3 - 5$

③ ∴ قاعدة الدالة على يسار ١ تختلف عن قاعدتها على يمين ١
 ∴ يجب بحث كلاً من النهاية اليمنى و النهاية اليسرى عند $s = 1$

∴ $d(-1) = نهـا (3s + 1)$ $s \leftarrow 1$
 $4 = 1 + 1 \times 3$

، $d(+1) = نهـا (s - 5)$ $s \leftarrow 1$
 $4 = 1 - 5$

∴ $d(-1) = d(+1) = 4$ ∴ نهـاد (s) $s \leftarrow 1$

مثال: إذا كانت : $d(s) = \frac{9 - (3 + s)^2}{s}$ عندما $s > 0$
 عندما $s < 0$ $s + 6$ } أوجد نهـاد $d(s)$ $s \leftarrow 0$

الحل

∴ $d(0^-) = نهـاد (s)$ $s \leftarrow 0^-$
 $9 - (3 + s)^2$

= نهـا $\frac{(3 + 3 + s)(3 - 3 + s)}{s}$ $s \leftarrow 0^-$

، $d(0^+) = نهـاد (s)$ $s \leftarrow 0^+$
 $6 = 6 + 0 = (6 + s)$ $s \leftarrow 0^+$

∴ $d(0^-) = d(0^+) = 6$ ∴ نهـاد (s) $s \leftarrow 0$

$$\left. \begin{array}{l} \text{مثال ٣: إذا كانت : د (س) = } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{حـا ٣ س}}{\text{س}} \text{ عندما } \text{س} > ٠ \\ \text{حـتا ٣ س} \text{ عندما } \text{س} < ٠ \end{array} \right. \end{array} \right\} \text{أوجد نهـا د (س)}$$

الحـل

$$\therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{حـا ٣ س}}{\text{س}} \text{ عندما } \text{س} < ٠ \quad ٣ =$$

$$\text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{حـا ٣ س}}{\text{س}} \text{ عندما } \text{س} > ٠ \quad ١ =$$

$$\therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} \text{ عندما } \text{س} < ٠ \quad \text{د (س)} = \text{نهـا} \text{ عندما } \text{س} > ٠ \quad \text{ليس لها وجود}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{مثال ٤: إذا كانت : د (س) = } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{س}^٢ + ٢ س - ٥}{١ - س} \text{ عندما } \text{س} > ١ \\ \frac{\text{س}^٣ + ٥}{١ - س} \text{ عندما } \text{س} < ١ \end{array} \right. \end{array} \right\}$$

لها نهاية عند س = ١ أوجد قيمة كل من p

الحـل

$$\therefore \text{د (س)} \text{ لها نهاية عند } \text{س} = ١ \quad \therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}^٢ + ٢ س - ٥}{١ - س} \text{ عندما } \text{س} < ١$$

$$\therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}^٢ + ٢ س - ٥}{١ - س} \text{ عندما } \text{س} < ١ \quad \text{نهـا} = \frac{\text{س}^٢ + ٢ س - ٥}{١ - س} \text{ عندما } \text{س} > ١$$

$$\therefore ٨ = ٥ + p \quad \text{ومنها : } p = ٣$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{مثال ٥: د (س) = } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\text{س}}{|\text{س}|} \text{ عندما } \text{س} > ١ \\ \frac{\text{س}}{|\text{س}|} \text{ عندما } \text{س} < ١ \end{array} \right. \end{array} \right\} \text{أوجد نهـا د (س)}$$

الحـل

$$\therefore \text{د (س)} = \left\{ \begin{array}{l} \text{س} - \text{س} = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} > ١ \\ \frac{\text{س}}{\text{س}} = ١ = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} < ١ \end{array} \right.$$

$$\text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}}{\text{س}} = ١ = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} < ١ \quad \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}}{\text{س}} = ١ = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} > ١$$

$$\therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}}{\text{س}} = ١ = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} < ١ \quad \therefore \text{د (س)} = \text{نهـا} = \frac{\text{س}}{\text{س}} = ١ = ١ - \text{س} = ١ - \text{س} \text{ عندما } \text{س} > ١$$

إعداد / عادل إدوار

(٤٠)

منتدى توجبه الرياضيات

تمارين

$$(1) \left. \begin{array}{l} \text{س}^1 + 5 + 6 \text{ عندما } \text{س} > 0 \\ \text{س} - 6 \text{ عندما } \text{س} < 0 \end{array} \right\} = \text{إذا كانت : د (س)}$$

أوجد كلاً من :

$$\textcircled{1} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{2} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{3} \text{ نهيا د (س)}$$

$$(2) \text{ إذا كانت : د (س) } = \text{س} | \text{س} - 1 | + 3 \text{ أوجد كلاً من :}$$

$$\textcircled{1} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{2} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{3} \text{ نهيا د (س)}$$

$$(3) \left. \begin{array}{l} \text{س}^1 + 3 \text{ س} \\ -2 > \text{س} > 0 \\ \text{س} - 1 \\ 3 > \text{س} > 0 \end{array} \right\} = \text{إذا كانت : د (س)}$$

أوجد كلاً من :

$$\textcircled{1} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{2} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{3} \text{ نهيا د (س)}$$

$$(4) \left. \begin{array}{l} \text{س}^1 + 1 \\ \text{س} + 1 \\ \text{س} \text{ حتا س} \\ 5 - \text{س} - 4 \text{ حاس} \end{array} \right\} = \text{إذا كانت : د (س)}$$

أوجد كلاً من :

$$\textcircled{1} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{2} \text{ نهيا د (س) } \quad \textcircled{3} \text{ نهيا د (س)}$$

$$(5) \left. \begin{array}{l} \text{ح} \frac{(1-\text{س})}{1-\text{س}} \\ \text{طا} \frac{\pi \text{ س}}{4} \end{array} \right\} = \text{إذا كانت : د (س)}$$

أوجد نهيا د (س)

$$(6) \left. \begin{array}{l} \text{س}^1 - \text{ب} \\ \text{س} + \text{ب} \end{array} \right\} = \text{إذا كان : للدالة د (س)}$$

لها نهاية تساوى ٣

عندما $\text{س} \leftarrow 2$ أوجد قيمة كل من : ب ، م

$$(7) \left. \begin{array}{l} 3 - \text{س} \\ \text{س} + \text{ب} \\ \text{س} - 6 \end{array} \right\} = \text{إذا كان : للدالة د (س)}$$

لها نهاية عند كل من : $\text{س} = 1$ ، $\text{س} = 3$ أوجد قيمة كل من : ب ، م

إعداد / عادل إدوار

إتصال دالة عند نقطة

تعريف :

إذا كانت الدالة d معرفة على فترة ما وكانت p تنتمى لهذه الفترة فإن :
 d تكون متصلة عند p إذا وفقط إذا كانت نهـ $\lim_{s \rightarrow p} d(s) = d(p)$

شروط إتصال دالة عند نقطة :

تكون الدالة d متصلة عند $s = p$ إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة :

١ - الدالة معرفة عند $s = p$ أى أن : $d(p)$ لها وجود

٢ - نهـ $\lim_{s \rightarrow p} d(s)$ لها وجود

٣ - نهـ $\lim_{s \rightarrow p} d(s) = d(p)$

ملاحظة :

يكفى عدم تحقق شرط واحد من الشروط الثلاثة السابقة لعدم إتصال الدالة d عند النقطة $s = p$ فمثلاً إذا كانت الدالة غير معرفة عند $s = p$ فهى بالتالى غير متصلة عند $s = p$ ولا داعى أن نبحث عن تحقق الشرطين الآخرين

مثال ١ - ابحث إتصال الدالة : $d(s) = |s - 1| + 3$ عند $s = 1$
الحل

$$d(s) = \begin{cases} s - 1 + 3, & s \leq 1 \\ -s + 1 + 3, & s > 1 \end{cases} = \begin{cases} s + 2, & s \leq 1 \\ -s + 4, & s > 1 \end{cases}$$

∴ $d(s)$ معرفة عند $s = 1$ حيث : $d(1) = 1 + 2 = 3$

$$d(1^-) = \lim_{s \rightarrow 1^-} (s + 2) = 3$$

$$d(1^+) = \lim_{s \rightarrow 1^+} (-s + 4) = 3$$

أى أن : نهـ $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = 3$

∴ $d(1) = 3$ و نهـ $\lim_{s \rightarrow 1} d(s) = 3$ ∴ d متصلة عند $s = 1$

ملاحظة :

إذا كانت د (س) معرفة عند $s = p$ ، نهبا $s \leftarrow p$ د (س) لها وجود ،

كانت الدالة غير متصلة

عند $s = p$ لإختلاف د (p) عن نهبا $s \leftarrow p$ د (س) فيمكن جعل الدالة

متصلة عند $s = p$ بإعادة تعريفها بجعل د (p) = نهبا $s \leftarrow p$ د (س)

$$\text{مثال ٢: إذا كانت : د (س) = } \left. \begin{array}{l} \frac{3s^2 - 9s + 3}{s} , s \neq 0 \\ s = 0 \end{array} \right\} = (س) \text{ أوجد قيمة } p \text{ التى تجعل د متصلة عند } s = 0$$

الحل

∴ د (س) متصلة عند $s = 0$ ∴ د (0) = نهبا $s \leftarrow 0$ د (س)

$$\therefore p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s^2 - 9s + 3}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(3s^2 - 9s + 3)}{s} \times \frac{s}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(3s^2 - 9s + 3)s}{s^2} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{3s^2 - 9s + 3}{s} = \frac{1}{6}$$

مثال ٣: إذا كانت الدالة د متصلة عند $s = 3$ ، $s = 1$ أوجد

$$\text{قيمة كل من : } p, b \text{ حيث : د (س) = } \left. \begin{array}{l} 3s + 1 , s < 1 \\ p + b , 1 < s < 3 \\ 3 - s^2 , s \geq 3 \end{array} \right\}$$

الحل

∴ د (س) متصلة عند $s = 3$ ∴ د (3) = نهبا $s \leftarrow 3$ د (س)

∴ د (3) = د (-3) = د (+3) ∴ د (3) = 3 - 3^2 = 3 - 9 = -6 ∴ 3 = 3 + b ∴ b = 0 (١)

∴ د (س) متصلة عند $s = 1$ ∴ د (1) = نهبا $s \leftarrow 1$ د (س)

∴ د (1) = د (-1) = د (+1) ∴ د (1) = 1 - 1^2 = 1 - 1 = 0 ∴ 0 = 1 + p ∴ p = -1 (٢)

من (١) ، (٢)

إعداد / عادل إدوار

تقارير

١ - أبحث إتصال الدوال الآتية عند النقط المبينة :

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 4 \\ s > 4, \quad \frac{s^2 - 2s - 8}{s - 16} \\ s \leq 4, \quad \frac{3}{4} \end{array} \right\} = (s) د (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 5, \quad s = 2, \quad s > 5 \\ s \geq 2, \quad s > 2, \quad s > 5 \\ s \leq 5, \quad s - 2 \end{array} \right\} = (s) د (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 3 \\ s \neq 3, \quad \frac{|s - 3|}{s - 3} \\ s = 3, \quad \frac{1}{2} \end{array} \right\} = (s) د (3)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 3 \\ s \geq \frac{\pi}{2}, \quad \text{حاصل} + \text{حتا} \\ s < \frac{\pi}{2}, \quad 2 + \text{حتا} \end{array} \right\} = (s) د (4)$$

٢ - أوجد قيمة الثابت p التى تجعل d متصلة عند النقط المبينة

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 1 \\ s \neq 1, \quad \frac{s^2 - (1+p)s + p}{s - 1} \\ s = 1, \quad \frac{3}{s - 1} \end{array} \right\} = (s) د (1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{عند } s = 0 \\ s \neq 0, \quad \frac{\text{حاصل} s}{\text{س طا } s} \\ s = 0, \quad \frac{1}{1 + p} \end{array} \right\} = (s) د (2)$$

٣ - إذا كانت الدالة d متصلة عند $s = -2$ ، $s = 5$ أوجد

$$\left. \begin{array}{l} \text{قيمة كل من : } p, \quad b \text{ حيث : } d(s) = \\ s - 2, \quad s - 3 \\ s > 2, \quad s + b \\ s \leq 5, \quad s^2 - 12 \end{array} \right\}$$

٤ - إذا كانت الدالة d متصلة عند $s = 1$ ، $s = 2$ أوجد

$$\left. \begin{array}{l} \text{قيمة كل من : } p, \quad b \text{ حيث : } d(s) = \\ s - 2, \quad s - 1 \\ s > 1, \quad s + b \\ s \leq 2, \quad s^2 + 2 \end{array} \right\}$$

إتصال دالة على فترة

تعريف :

(١) إذا كانت الدالة d معرفة على الفترة $f = [a, b]$ فإن : الدالة d (س)

تكون متصلة على f إذا كانت متصلة عند كل نقطة تنتمى لهذه الفترة

(٢) إذا كانت الدالة d معرفة على الفترة $f = [a, b]$ فإن : الدالة d (س)

تكون متصلة على f إذا تحققت الشروط الآتية :

a - الدالة d متصلة على الفترة $f = [a, b]$

ب - الدالة d متصلة من اليمين عند a أى : $d(a^+) = \lim_{x \rightarrow a^+} d(x)$ (س)

ج - الدالة d متصلة من اليمين عند b أى : $d(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} d(x)$ (س)

ملاحظة :

الدالة d غير متصلة على الفترة $f = [a, b]$ إذا وجدت نقطة واحدة على الأقل

مثل $c \in f$ بحيث تكون d غير متصلة عندها أى إذا لم تتحقق إحدى الشروط :

a - الدالة d غير معرفة عند c

ب - عدم وجود نهاية للدالة d عند c

ج - إختلاف نهاية الدالة d عند c عن $d(c)$

بعض أنماط الدوال المتصلة :

(١) دوال كثيرات الحدود : متصلة على \mathbb{R} أو أى فترة جزئية من \mathbb{R}

(٢) الدوال الكسرية الجبرية : متصلة على \mathbb{R} أو أى فترة جزئية من \mathbb{R}

ما عدا عند أصفار دالة المقام

(٣) الدوال المثلثية :

* دالة الجيب : متصلة على \mathbb{R} أو أى فترة جزئية من \mathbb{R}

* دالة جيب التمام : متصلة على \mathbb{R} أو أى فترة جزئية من \mathbb{R}

* دالة الظل : متصلة على \mathbb{R} أو أى فترة جزئية من \mathbb{R}

ما عدا عند النقط $\frac{1}{2} + n\pi$ ط حيث $n \in \mathbb{Z}$ ص

نظرية :

إذا كانت d_1, d_2 دالتين معرفتين على $F = [a, b]$ و كانتا متصلتين على الفترة F فإن كلاً من الدوال الآتية تكون متصلة على الفترة F :

$$(1) \quad d_1 \pm d_2 \quad (2) \quad d_1 \cdot d_2 \quad (3) \quad \frac{d_1}{d_2} \quad \text{بشرط } d_2 \neq 0$$

$$\left. \begin{aligned} 3s + 1 & \geq 3 - s > 2 \\ 3s + 3 & \geq 2 \geq s \geq 5 \end{aligned} \right\} = \text{مثال : أبحث إتصال الدالة } d \text{ حيث } d(s) =$$

الحل

$d(s)$ معرفة على $[-3, 5]$

$$(1) \quad d(s) = 3s + 1 \quad \text{لكل } s \in [-3, 5]$$

$\therefore d(s)$ كثرة حدود $\therefore d(s)$ متصلة على $[-3, 5]$

$$(2) \quad d(s) = 3s + 3 \quad \text{لكل } s \in [-3, 5]$$

$\therefore d(s)$ كثرة حدود $\therefore d(s)$ متصلة على $[-3, 5]$

$$(3) \quad d(2) = 3 + 4 = 7$$

$$7 = \lim_{s \rightarrow 2^-} (3s + 1) = \lim_{s \rightarrow 2^-} 7 \quad , \quad 7 = \lim_{s \rightarrow 2^+} (3s + 3) = \lim_{s \rightarrow 2^+} 7$$

$$\therefore \lim_{s \rightarrow 2} d(s) = d(2) = 7 \quad \therefore d(s) \text{ متصلة عند } s = 2$$

$$(4) \quad d(3) = 3 - 8 = -5 \quad , \quad d(3) = 3 - 8 = -5$$

$\therefore d(s)$ متصلة من اليمين عند $s = 3$

$$28 = \lim_{s \rightarrow 5^-} (3s + 3) = \lim_{s \rightarrow 5^-} 18 \quad , \quad 28 = \lim_{s \rightarrow 5^+} (3s + 1) = \lim_{s \rightarrow 5^+} 16$$

$\therefore d(s)$ متصلة من اليسار عند $s = 5$

من (1) ، (2) ، (3) ، (4) نستنتج أن $d(s)$ متصلة على $[-3, 5]$

مثال ٢- : إذا كانت الدالة د متصلة على ح أوجد قيمة

$$\left. \begin{array}{l} 3 - s = 2, \\ 4 + s = 2, \\ 5 - s = 2 \end{array} \right\} \text{كل من : } p, \text{ حيث : } d(s) =$$

الحل

∴ د متصلة على ح ∴ د متصلة على س = ٢

$$\therefore d(2^-) = d(2) = d(2^+) = 2$$

$$\therefore \text{نهاية } d(s) \text{ عند } s = 2 = 2 = 2 \times 3 = 6 \therefore 2 = 6 + 2 = 8 \text{ --- (١)}$$

الدالة متصلة عند س = ٥

$$\therefore \text{نهاية } d(s) \text{ عند } s = 5 = 5 = 5 + 2 = 7 \therefore 5 = 7 + 2 = 9 \text{ --- (٢)}$$

$$\text{من (١)، (٢) } \therefore 3 = 2, \quad 2 = 2$$

تمارين

(١) أبحث إتصال كل من الدوال الآتية على ح :

$$1 - d(s) = \left. \begin{array}{l} s + 2, \\ s - 5 \end{array} \right\} \text{ حيث : } \begin{array}{l} s \geq 1, \\ s < 1 \end{array}$$

$$2 - d(s) = \left. \begin{array}{l} s - 1, \\ s + 1 \end{array} \right\} \text{ حيث : } \begin{array}{l} 1 \geq s \geq 2, \\ 1 > s > 3, \\ 2 > s \geq 3 \end{array}$$

$$3 - d(s) = \left. \begin{array}{l} 1 + s, \\ 1 - s \end{array} \right\} \text{ حيث : } \begin{array}{l} 0 \leq s \leq \frac{\pi}{2}, \\ \frac{\pi}{2} > s > \frac{\pi}{2} \end{array}$$

$$4 - d(s) = \left. \begin{array}{l} s + 2, \\ s + 3 \end{array} \right\} \text{ حيث : } \begin{array}{l} s \geq 0, \\ s < 0 \end{array}$$

(٢) أوجد قيمة $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$ التى تجعل الدالة $f(x)$ متصلة على \mathbb{R} حيث :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} & , x \geq 2 \\ x^2 - 4 & , x < 2 \end{cases}$$

$$(٣) \text{ إذا كانت الدالة } f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & , x \geq 1 \\ x + b & , 1 < x < 2 \\ \frac{x^2 - x - 1}{x^2 + x + 4} & , x \leq 2 \end{cases} \text{ متصلة على } \mathbb{R} \text{ أوجد قيمة كل من } b, c$$

(٤) أوجد قيمة $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - 2x - 1}{x^2 - 1}$ التى تجعل الدالة $f(x)$ متصلة على \mathbb{R} حيث :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x^2 - 2x - 1 & , x \geq 1 \\ x^2 - 1 & , x < 1 \end{cases}$$

مذكره

كتاب المثلثات

الصف الثاني الثانوي

القسم العلمي

مترى توجيه الرياضيات
د. عادل إدور

الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠

• قانون جيب التمام

• قانون الجيب

• حل المثلث

(١) إذا علم قياسا زاويتين وطو ضلع

(٢) إذا علم طولا ضلعين وقياس الزاوية المحصورة


(٣) إذا علم أطوال أضلاع الثلاثة

(٤) طولا ضلعين وقياس الزاوية المقابلة لإحدهما (الحالة المبهمة)

مراجعة ما سبق دراسته

إشارات الدوال المثلثية

كما هو مبين في الشكل و يجب قبل تحديد إشارة الدالة المثلثية تحديد الربع الذى تقع فيه الزاوية



الربع	الزاوية هـ	إشارة جتا ، قتا	إشارة جتا ، قا	إشارة ظتا ، ظا
الربع الأول	$[0^\circ, 90^\circ]$	+	+	+
الربع الثانى	$[90^\circ, 180^\circ]$	+	-	-
الربع الثالث	$[180^\circ, 270^\circ]$	-	-	+
الربع الرابع	$[270^\circ, 360^\circ]$	-	+	-

الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة

الدالة	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360° ، صفر
حا	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	١	صفر	- ١	صفر
حتا	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	صفر	- ١	صفر	١
طا	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	١	$\sqrt{3}$	غير معرف	صفر	غير معرف	صفر

بعض خواص الدوال المثلثية :-

[١] العلاقة بين النسب المثلثية للزاويتين المتتامتين [هـ ، 90° - هـ]

$$(١) \text{ حا هـ} = \text{حتا } (90^\circ - \text{هـ}) \quad , , , \quad \text{قتا هـ} = \text{قا } (90^\circ - \text{هـ})$$

$$(٢) \text{ حتا هـ} = \text{حا } (90^\circ - \text{هـ}) \quad , , , \quad \text{قا هـ} = \text{قتا } (90^\circ - \text{هـ})$$

$$(٣) \text{ طا هـ} = \text{طتا } (90^\circ - \text{هـ}) \quad , , , \quad \text{ظتا هـ} = \text{ظا } (90^\circ - \text{هـ})$$

ملاحظة : إذا كان حا س = حتا ص

∴ س + ص = 90° حيث س ، ص قياسا زاويتين حادتين موجبتين

[٢] العلاقة بين النسب المثلثية للزاويتين المتكاملتين [هـ ، ١٨٠° - هـ]

الزاوية (١٨٠° - هـ) تقع فى الربع الثانى (جا ، قتا) فقط موجبة

$$(١) \text{ حـا } (١٨٠^\circ - \text{هـ}) = - \text{حـا } \text{هـ}$$

$$(٢) \text{ حتـا } (١٨٠^\circ - \text{هـ}) = - \text{حتـا } \text{هـ}$$

$$(٣) \text{ طـا } (١٨٠^\circ - \text{هـ}) = - \text{طـا } \text{هـ}$$

[٣] العلاقة بين النسب المثلثية للزاويتين [هـ ، ١٨٠° + هـ]

الزاوية (١٨٠° + هـ) تقع فى الربع الثالث (ظا ، ظتا) فقط موجبة

$$(١) \text{ حـا } (١٨٠^\circ + \text{هـ}) = - \text{حـا } \text{هـ}$$

$$(٢) \text{ حتـا } (١٨٠^\circ + \text{هـ}) = - \text{حتـا } \text{هـ}$$

$$(٣) \text{ طـا } (١٨٠^\circ + \text{هـ}) = \text{طـا } \text{هـ}$$

[٤] العلاقة بين النسب المثلثية للزاويتين [هـ ، ٣٦٠° - هـ] ، [هـ ، - هـ]

الزاوية (٣٦٠° - هـ) تقع فى الربع الرابع (جتا ، قا) فقط موجبة

$$(١) \text{ حـا } (٣٦٠^\circ - \text{هـ}) = \text{حـا } \text{هـ}$$

$$(٢) \text{ حتـا } (٣٦٠^\circ - \text{هـ}) = \text{حتـا } \text{هـ}$$

$$(٣) \text{ طـا } (٣٦٠^\circ - \text{هـ}) = - \text{طـا } \text{هـ}$$

فمثلاً (١) جا ١٢٠° فى الربع الثانى = جا (١٨٠° - ٦٠) = جا ٦٠° = $\frac{\sqrt{3}}{2}$


(٢) جتا ٢١٠° فى الربع الثالث = جتا (١٨٠° + ٣٠) = - جتا ٣٠° = $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

(٣) ظا ١٥٠° فى الربع الثانى = ظا (١٨٠° - ٣٠) = - ظا ٣٠° = $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

(٤) قا ٣٠٠° فى الربع الرابع = قا (٣٦٠° - ٦٠) = قا ٦٠° = $\frac{1}{2}$

(٥) قتا ٦٠° فى الربع الرابع = - قتا ٦٠° = $-\frac{1}{2}$

الدوال المثلثية للزوايا الحادة المرسومة فى ΔP ب ج قائم فى ب



$$\text{قنا ج} = \frac{PB}{PD} \quad \left(\frac{\text{وتر}}{\text{مقابل}} \right)$$

$$\text{قا ج} = \frac{BD}{PD} \quad \left(\frac{\text{وتر}}{\text{مجاور}} \right)$$

$$\text{ظنا ج} = \frac{PB}{BD} \quad \left(\frac{\text{مجاور}}{\text{مقابل}} \right)$$

$$\text{يكون حا ج} = \frac{PB}{BD} \quad \left(\frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}} \right)$$

$$\text{،، حتا ج} = \frac{BD}{PD} \quad \left(\frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} \right)$$

$$\text{،، طا ج} = \frac{PB}{BD} \quad \left(\frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}} \right)$$

معنى حل المثلث : المثلث يتكون من ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا المقصود بحل المثلث

هو معرفة أطوال أضلاعه وقياس زواياه ويستلزم معرفة قياس ثلاث عناصر من عناصره الست بشرط أن يكون أحد هذه العناصر الثلاث هو طول أحد الأضلاع

*العلاقات الأساسية بين الدوال المثلثية :


$$(1) \quad \text{حتا ه} + \text{حا ه} = 1, \quad 1 = \text{طا ه} + \text{قا ه}, \quad 1 = \text{قنا ه} + \text{ظنا ه}$$

$$(2) \quad \text{حا ه} \cdot \text{قنا ه} = 1, \quad \text{حا ه} \cdot \text{قا ه} = 1, \quad \text{طا ه} \cdot \text{ظنا ه} = 1$$

$$(3) \quad \text{طا ه} = \frac{\text{حا ه}}{\text{قنا ه}}, \quad \text{ظنا ه} = \frac{\text{قا ه}}{\text{قنا ه}}$$

قانون الجيب (قاعدة الجيب)

فى أى مثلث تتناسب أطوال أضلاع المثلث مع جيوب الزوايا المقابلة لها
أى أنه : فى أى مثلث أ ب ج يكون :



$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

حيث الرموز : a, b, c تعبر عن قياسات زوايا المثلث A, B, C
، $\sin A, \sin B, \sin C$ تعبر عن أطوال الأضلاع a, b, c ، $\sin A, \sin B, \sin C$ على الترتيب
البرهان :

$$\text{مساحة } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times b \times c \times \sin A$$

$$\therefore \sin A = \frac{2 \times \text{مساحة } \triangle ABC}{b \times c}$$

$$\therefore \text{مساحة } \triangle ABC = \frac{1}{2} \times b \times c \times \sin A = \frac{1}{2} \times c \times a \times \sin B = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C$$

بالضرب $\times 2$ ثم القسمة على $\sin A, \sin B, \sin C$ ينتج المطلوب

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

ملاحظات :

محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه $a + b + c$

مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$

مساحة المثلث $= \frac{1}{2} \times \text{حاصل ضرب طولي أي ضلعين}$

\times جيب الزاوية المحصورة بينهما

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{1}{2} \times a \times b \times \sin C = \frac{1}{2} \times b \times c \times \sin A = \frac{1}{2} \times c \times a \times \sin B$$

محيط الدائرة $= 2\pi r$ & مساحة الدائرة $= \pi r^2$

أكبر ضلع فى المثلث يقابل أكبر زاوية فى المثلث

أصغر ضلع فى المثلث يقابل أصغر زاوية فى المثلث

مث ١ - ال : في المثلث م ب ج إذا كان م = ١٠ سم ، و (ب) = ٤٥° ، و (ج) = ٦٠°
فأوجد قيمة كل من ب' ، ج' ومساحة المثلث م ب ج لأقرب رقم عشري

الحل

$$\therefore \text{و (م)} = (٦٠ + ٤٥) - ١٨٠ = ٧٥^\circ$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{ج م}} = \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} \therefore \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = \frac{\text{م}}{\text{ج م}}$$

$$\therefore \text{ب}' = \frac{٤٥ \text{ ح ا} \times ١٠}{٧٥ \text{ ج م}} = ٧,٤ \text{ سم}$$


$$\text{ج}', = \frac{٦٠ \text{ ح ا} \times ١٠}{٧٥ \text{ ج م}} = ٩ \text{ سم}$$

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{١}{٢} \times \text{ب}' \times \text{ج}' = \frac{١}{٢} \times ٩ \times ٧,٤ = ٣٢,٣ \text{ سم}^2$$

تمرين مشهور

في أي مثلث م ب ج يكون :

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{ج م}} = \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = ٢$$



حيث ن. طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث م ب ج
البرهان :

نرسم الدائرة م المارة برؤوس \triangle م ب ج

ثم نرسم القطر ب ع ، الوتر ح ع

فيكون : و (ب ح ع) = ٩٠° " محيطية مرسومة فى نصف دائرة "

، و (م) = و (ب ح ع) " محيطيتان تحصران نفس القوس "

$$\text{فى } \triangle \text{ ب ح ع : ح ا ع} = \frac{\text{م}}{\text{ب ع}} = \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} \therefore \frac{\text{م}}{\text{ج م}} = \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}}$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{ج م}} = \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = \frac{\text{م}}{\text{ج م}} \therefore \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = \frac{\text{م}}{\text{ج م}}$$

نتائج هامة

$$\frac{\text{م}}{\text{ج م}} = ٢ \text{ نق ج م} \quad \& \quad \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = ٢ \text{ نق ج ا ب} \quad \& \quad \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = ٢ \text{ نق ج ا ج}$$

$$\frac{\text{م}}{\text{ج م}} = ١ \text{ ج ا م} \quad \& \quad \frac{\text{ب}'}{\text{ح ا ب}} = ١ \text{ ج ا ب} \quad \& \quad \frac{\text{ج}'}{\text{ح ا ج}} = ١ \text{ ج ا ج}$$

ملاحظة هامة : تستخدم كل من قاعدة الجيب والتمرين المشهور إذا علم :

- قياسا زاويتين وطول ضلع
- قياسا زاويتين وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث
- قياسا زاويتين وطول محيط المثلث

مث ٢ -ال: في المثلث م ب ج إذا كان م = ١٠ سم ، و (ب) = ٤٥° ، و (ج) = ٦٠°
فأوجد محيط الدائرة الخارجة للمثلث م ب ج

الحل

$$\therefore \text{و (م)} = ١٨٠ - (٤٥ + ٦٠) = ٧٥^\circ$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{جا م}} = \frac{\text{ب}}{\text{حاج ب}} = \frac{\text{ج}}{\text{حاج ج}} = \text{نق ٢}$$

$$\therefore \frac{١٠}{\text{جا ٧٥}} = \frac{\text{ب}}{\text{حاج ٤٥}} = \frac{\text{ج}}{\text{حاج ٦٠}} = \text{نق ٢}$$

$$\therefore \text{نق ٢} = \frac{١٠}{\text{جا ٧٥}} = ١٠,٣ \text{ سم} \quad \therefore \text{نق ٢} = ٥,٢ \text{ سم}$$

$$\therefore \text{محيط الدائرة} = ٢ \text{ ط نق} = ٢ \times \text{ط} \times ٥,٢ = ٣٢,٥ \text{ سم}$$

مث ٣ -ال: إذا كان مقاييس زوايا مثلث تتناسب مع ١ : ٢ : ٣ فأثبت أن أطوال الأضلاع المقابلة لهذه الزوايا تتناسب مع ١ : $\sqrt{٣}$: ٢

الحل

∴ مجموع قياسات زوايا المثلث = ١٨٠°

$$\therefore \text{و (م)} = \frac{١}{٦} \times ١٨٠ = ٣٠^\circ$$

$$\therefore \text{و (ب)} = \frac{٢}{٦} \times ١٨٠ = ٦٠^\circ$$

$$\therefore \text{و (ج)} = \frac{٣}{٦} \times ١٨٠ = ٩٠^\circ$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{جا م}} = \frac{\text{ب}}{\text{حاج ب}} = \frac{\text{ج}}{\text{حاج ج}}$$

$$\therefore \text{م : ب : ج} = \text{جا م : حاج ب : حاج ج} = ٣٠^\circ \text{ جا : } ٦٠^\circ \text{ جا : } ٩٠^\circ$$

$$= \frac{١}{٦} : \frac{\sqrt{٣}}{٦} : ١ = ١ : \sqrt{٣} : ٢$$

مثـ ٤: ل م ن مثلث فيه كان ، و (ل) = ٥٢° ، و (ن) = ١٧° ، و (م) = ١١٠°
 م = ٣٥٢,٧ فأوجد م ن ، ، ل م

الحـ ل

$$\therefore \text{و (م)} = ١٨٠ - (٥٢ + ١٧) = ١١٠$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{جام}} = \frac{\text{ل}}{\text{حال}} = \frac{\text{ن}}{\text{حان}}$$

$$\therefore \frac{٣٥٢,٧}{\text{جا } ٥١^\circ} = \frac{\text{ل}}{\text{جا } ٣٨^\circ} = \frac{\text{ن}}{\text{حا } ٤٤^\circ}$$

$$\therefore \text{م} = \frac{٣٥٢,٧ \times \text{جا } ٥٢^\circ}{\text{جا } ٩٦^\circ} = ٢٢٢,٩$$

$$\therefore \text{ل م} = \frac{٣٥٢,٧ \times \text{جا } ٤٤^\circ}{\text{جا } ٩٦^\circ} = ٢٤٨$$

مثـ ٥: إذا رمزنا لمساحة سطح المثلث م ب ج بالرمز Δ فأثبت أن

$$\Delta = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢} = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢}$$

الحـ ل

$$\therefore \Delta = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢} = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢}$$

[١]

$$\therefore \Delta = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢} = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢} \cdot \frac{١}{\text{نق } ٢}$$

$$\therefore \frac{\text{ب}}{\text{حاب}} = \frac{\text{ج}}{\text{حاج}} = \frac{١}{\text{نق } ٢} \therefore \text{ب} = \frac{\text{حاج}}{\text{نق } ٢} , \text{ ج} = \frac{\text{حاب}}{\text{نق } ٢}$$

$$\therefore \Delta = \frac{١}{٢} \times \text{نق } ٢ \times \text{حاج} \times \text{حاب} = \frac{\text{ب} \cdot \text{ج}}{٢}$$

مثـ ٦: م ب ج د مثلث فيه ح م : جاب : جاد = ٩ : ٢ : ٤

أوجد أطوال أضلاعه إذا علم أن محيطه = ٤٥ سم

الحـ ل

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{جام}} = \frac{\text{ب}}{\text{حاب}} = \frac{\text{ج}}{\text{حاج}} = \frac{١}{\text{نق } ٢}$$

$$\therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m \therefore m = \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} \therefore m = \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4}$$

$$\therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m \text{ ، حيث } m = \frac{\frac{p}{9} + \frac{b}{2} + \frac{ج}{4}}{1} = \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} \therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m$$

$$\therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m \therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m \therefore \frac{p}{9} = \frac{b}{2} = \frac{ج}{4} = m$$

تمارين

١ - ل م ن مثلث فيه ل = ٢٤ سم ، و (ل) = ٣٧° ، و (م) = ١٠٠° أوجد لأقرب رقم عشري واحد كل من ن ، وطول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث

٢ - م ب ج مثلث فيه م = ٢٠ سم ، و (ب) = ٣٠° ، و (ج) = ٨٠° أوجد مساحة المثلث م ب ج

٣ - م ب ح فيه و (م) = ٦٠° ؛ و (ب) = ٤٠° طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه = ٢٠ سم أوجد مساحة سطح المثلث لأقرب سم

٤ - م ب ح فيه م = ٦ سم ؛ و (ب) = ٤٠° ؛ و (ح) = ٧٥° أوجد طول كلا من ب ؛ م ب قطر الدائرة المارة برؤوس م ب ح لأقرب رقم عشري

٥ - م ب ح فيه م = ١٠ سم ؛ و (ب) = ٥٥° ؛ و (ح) = ٤٠° أوجد طول كلا من ح ؛ مساحة (م ب ح) ؛ محيط الدائرة المارة برؤوس م ب ح لأقرب رقم عشري

٦ - م ب ح فيه م = ٦ سم ؛ و (ب) = ٤٦° ؛ و (ح) = ١٨° ؛ و (ج) = ٧٤° أوجد طول ب لأقرب رقمين ؛ مساحة الدائرة المارة برؤوس م ب ح لأقرب سم

٧ - م ب ح فيه م = ١٠ سم ؛ و (ب) = ١٠٠° ؛ و (ع) = ٣٢° أوجد كلا من مساحة (م ب ح) ؛ محيط م ب ح لأقرب سم

٨ - م ب ح فيه م = ١٩ سم ؛ و (م) = ١١٢° ؛ و (ب) = ٣٣° أوجد طول كلا من ب

لأقرب سم ؛ نصف قطر الدائرة الخارجة عن المثلث لأقرب رقمين عشريين

٩ - Δ م ب ح فيه $\angle م = ٦٠^\circ$ ؛ $\angle ب = ٤٠^\circ$ طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه = ٢٠ سم أوجد مساحة سطح المثلث لأقرب سم^٢

١٠ - Δ م ب ح فيه $\angle م = ١٢^\circ$ ؛ $\angle ب = ١٠^\circ$ طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه = ٧ سم أوجد طول ح' لأقرب سم حيث Δ م ب ح حاد الزوايا

١١ - Δ م ب ح فيه حاد = $\angle م = ٢^\circ$ ، $\angle ب = ٤^\circ$ ؛ $\angle ح = ١٤^\circ$ سم أوجد مساحة الدائرة المارة برؤوسه

١٢ - Δ م ب ح فيه $\angle م = ٥^\circ$ سم ؛ $\angle ب = ١٢^\circ$ ؛ مساحة (Δ م ب ح) = $١٠\sqrt{٣}$ سم^٢ أوجد ح'

١٣ - دائرة محيطها ٤٤ سم تمر برؤوس Δ م ب ح الذي فيه $\angle م = ٦٠^\circ$ أوجد $\angle م$

١٤ - دائرة مساحة سطحها ١٥٤ سم^٢ تمر برؤوس Δ م ب ح الذي فيه $\angle م = ٦^\circ$ ؛ $\angle ب = ٧^\circ$ أوجد $\angle م$

١٥ - دائرة طول نصف قطرها ١٠ سم تمر برؤوس Δ م ب ح الذي فيه $\angle م = ٢٧^\circ$ ؛ $\angle ب = ٥٢^\circ$ أوجد محيط Δ م ب ح

١٦ - Δ م ب ح فيه $\angle م = ٣:١$ ؛ $\angle ب = ٣:١$ ؛ $\angle ح = ٣:١$ فإذا كان $\angle م = ١٨,٣^\circ$ سم أوجد محيط Δ م ب ح لأقرب سم

١٧ - Δ س ص ع فيه $\angle م = ٣:١$ ؛ $\angle ب = ٣:١$ ؛ $\angle ح = ٣:١$ ؛ إثبت أن : $\frac{س}{ص} = \frac{ص}{ع} = \frac{ع}{س} = ٣:١$

١٨ - Δ م ب ح فيه $\angle م = ٨^\circ$ سم إثبت أن : - مساحة (Δ م ب ح) = $\frac{ب \cdot ح}{٢}$ حيث $\angle م$ طول نصف قطر الدائرة الخارجة عن Δ م ب ح

١٩ - Δ س ص ع قائم الزاوية في ص ، $\angle م = ٣٠^\circ$ ؛ إثبت أن مساحته = $\frac{٣}{٢}$ سم^٢

٢٠ - في Δ م ب ح إثبت أن : - مساحة (Δ م ب ح) = $\frac{٢}{٢}$ سم^٢ حاب حاد

٢١ - Δ م ب د محيطه ١٦ سم ؛ و $(\Delta م) = ٥٠^\circ$ ؛ و $(\Delta ب) = ٥٦^\circ$ أوجد ب' ، د' /

٢٢ - Δ م ب د محيطه ١٢ سم ؛ و $(\Delta م) = ٤٧^\circ$ ؛ و $(\Delta ب) = ٥٣^\circ$ أوجد ب' /

٢٣ - Δ م ب د فيه ب د = ٥٥ سم ، و $(\Delta د) = ٢٧^\circ$ ، و $(\Delta م) = ٢٩^\circ$ أوجد طول مسقط م ب علي ب د ؛ طول العمود المرسوم من م علي ب د لأقرب سم

٢٤ - Δ م ب د فيه م' = ١٠ سم ، و $(\Delta ب) = ٥٠^\circ$ ، و $(\Delta د) = ٦٠^\circ$ أوجد طول كلا من نصفي قطري الدائرتين الخارجة والداخله للمثلث م ب د

٢٥ - م ب د ع متوازي أضلاع فيه م ب = ١٨ سم ؛ و $(\Delta د م ب) = ٣٦^\circ$ ، و $(\Delta ب م د) = ٤٤^\circ$ أوجد طول قطره م د ؛ مساحة سطح متوازي الأضلاع م ب د ع لأقرب وحدة

٢٦ - م ب د ع متوازي أضلاع فيه م د = ٢٠ سم ؛ و $(\Delta م ب د) = ٣٨^\circ$ حيث م نقطة تقاطع قطريه ؛ و $(\Delta م ب د) = ٦٢^\circ$ أوجد طول كلا من م ب ؛ ب م

٢٧ - م ب د ع شبه منحرف فيه م ب // ب د ؛ م ب = ١٥ سم ؛ و $(\Delta ب م د) = ١٠٠^\circ$ ؛ و $(\Delta ب م د) = ٦٥^\circ$ ؛ و $(\Delta م ب د) = ٣٢^\circ$ أوجد طول كلا من م ج ، ب د لأقرب سم ، مساحة سطح شبه المنحرف م ب د ع لأقرب سم

٢٨ - م ب د ع شكل رباعي دائري حيث م ب قطر الدائرة المارة برؤوسه وطول نصف قطرها ٧ سم ، و $(\Delta م ب د) = ٢٠^\circ$ ، و $(\Delta ب م د) = ٤٠^\circ$ أوجد مساحة سطح الشكل م ب د ع

٢٩ - م ب د ع هـ خمس منتظم طول ضلعه ١٨ سم أوجد طول قطره لأقرب سم

٣٠ - م ب ج د متساوي الساقين فيه و $(\Delta م) = ١٢٠^\circ$ ، وطول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه ٢٠ سم أوجد ب' ، ثم استنتج مساحة المثلث لأقرب سم


قانون جيب التمام (قاعدة جيب التمام)

في Δ ب د يكون :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$



البرهان

Δ ب د قائم الزاوية في ع

$$\therefore \angle B + \angle C = 90^\circ \Rightarrow \cos B = \sin C \Rightarrow b \cos B = a \sin C$$

$$\therefore b \cos B + c \cos C = a \cos C + c \cos C = a$$

$$b \cos B + c \cos C = a$$

$$\therefore \Delta$$
 ب د قائم الزاوية في ع ، $\angle B + \angle C = 90^\circ \Rightarrow \cos B = \sin C \Rightarrow b \cos B = a \sin C$

$$b \cos B + c \cos C = a$$

$$\therefore b \cos B + c \cos C = a$$

$$\therefore b \cos B + c \cos C = a$$

إذا علمت أطوال أضلاع مثلث أو النسبة بينها

$$\frac{b^2 - c^2 + a^2}{2ac} = \cos B$$

$$\frac{c^2 - b^2 + a^2}{2ab} = \cos C$$

$$\frac{a^2 - b^2 + c^2}{2bc} = \cos A$$

ومنها

ومنها

ومنها

إذا علم طولاً ضلعين في مثلث وقياس الزاوية

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

ملاحظات :

• لإيجاد قياس إحدى زوايا مثلث يفضل استخدام قانون جيب التمام لأنه يحدد نوع

الزاوية فإذا كانت حتما M موجبة كانت $M \leq 90^\circ$ حادة

أما إذا كانت حتما M سالبة كانت $M \geq 90^\circ$ منفرجة

متمدى توجبه الرياضيات

(١١)

إعداد / عادل إدوار

• أكبر زوايا المثلث قياساً تقابل أكبر الأضلاع طولاً ، أصغرها قياساً تقابل أصغر الأضلاع طولاً

• إذا كان : $\angle \text{ب} : \angle \text{ب} : \angle \text{ب} = 3 : 4 : 5$ نفرض أن : $\angle \text{ب} = 3$ ، $\angle \text{ب} = 4$ ، $\angle \text{ب} = 5$ ،
ثم نعوض في قانون جيب التمام لإيجاد قياسات زوايا $\triangle \text{ب ب ح}$

مثال ١ : مثلث ب ب ح فيه $\angle \text{ب} = 3$ سم ، $\angle \text{ب} = 5$ سم ، $\angle \text{ب} = 7$ سم ،
أوجد $\angle \text{ب}$ لأقرب سم

الحل

$$\angle \text{ب} = \angle \text{ب} + \angle \text{ب} - \angle \text{ب} \text{ حتا ح}$$

$$87 = 2(13) + 2(15) - 2(17) \times 13 \times 15 \text{ حتا ح}$$

$$374 = \angle \text{ب} = \sqrt{374} = 19 \text{ سم}$$

مثال ٢ : أوجد قياس أكبر زاوية في المثلث ب ب ج الذي فيه $\angle \text{ب} = 3$ سم ، $\angle \text{ب} = 5$ سم ، $\angle \text{ب} = 7$ سم

الحل

أكبر زاوية هي $\angle \text{ب}$ لأنها تقابل أكبر الأضلاع طولاً : $\angle \text{ب} = 7$ سم

$$\frac{1}{4} = \frac{7^2 - 5^2 + 3^2}{5 \times 3 \times 2} = \frac{\angle \text{ب} - \angle \text{ب} + \angle \text{ب}}{\angle \text{ب} \angle \text{ب} \angle \text{ب}} \text{ حتا ح} \therefore \angle \text{ب} = 120^\circ$$

مثال ٣ : مثلث ب ب ح فيه $\angle \text{ب} = \frac{1}{4}$ جا $\text{ب} = \frac{1}{4}$ جا ب ، أحسب $\angle \text{ب}$ (ج) ؟

الحل

$$\therefore \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} \therefore \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}}$$

$$\therefore \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} = \frac{\angle \text{ب}}{\angle \text{ب}} \therefore \angle \text{ب} = \frac{1}{4} = \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \therefore \angle \text{ب} = 3 \text{ م} ، \angle \text{ب} = 3 \text{ م} ، \angle \text{ب} = 4 \text{ م}$$

$$\therefore \text{حتا ح} = \frac{\angle \text{ب} - \angle \text{ب} + \angle \text{ب}}{\angle \text{ب} \angle \text{ب} \angle \text{ب}} = \frac{4^2 - 3^2 + 3^2}{3 \times 2 \times 2} = \frac{16 - 9 + 9}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

$\therefore \angle \text{ب} = \frac{1}{2}$ (سالبة) \therefore الزاوية $\angle \text{ب}$ منفرجة وباستخدام حاسبة الجيب

$$\therefore \angle \text{ب} = 28^\circ = 104^\circ$$

مثـال : إذا كان طولاً ضلعين فى مثلث هما $1 + \sqrt{3}$ ، $1 - \sqrt{3}$ والزاوية بينهما قياسها 120° أوجد بدون الحاسبة طول الضلع الثالث

الحـل

بفرض أن : $1 + \sqrt{3} = \text{ب}^{\prime}$ ، $1 - \sqrt{3} = \text{ب}^{\prime}$ ، $\angle = (\angle \text{ج}) = 120^\circ$

$$\therefore \text{ح}^{\prime} = \text{ب}^{\prime} + \text{ب}^{\prime} - \text{ب}^{\prime} \text{ ح}^{\prime} \text{ ح}^{\prime}$$

$$= (1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) - 2 \times (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) \times \cos 120^\circ$$

$$= 1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} - 2 \times (1 - 3) \times (-\frac{1}{2}) = 10$$

$$\therefore \text{ح}^{\prime} = 10 \therefore \text{ح}^{\prime} = 10 \therefore \text{ح}^{\prime} = 10$$

مثـال : مثلث Δ ب ح فيه $\text{ب}^{\prime} = 5$ سم ، مساحة سطحه $10\sqrt{3}$ سم^٢ ، $\angle = (\angle \text{ب}) = 120^\circ$ أوجد ج^{\prime} ، ب^{\prime} لأقرب سم ثم أوجد \angle ($\angle \text{ب}$)

الحـل

\therefore مساحة سطح Δ ب ح $= \frac{1}{2} \times \text{ب}^{\prime} \times \text{ح}^{\prime} \times \sin \angle$

$$10\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 5 \times \text{ح}^{\prime} \times \sin 120^\circ$$

$$\therefore \frac{10\sqrt{3}}{5} = \frac{1}{2} \times \text{ح}^{\prime} \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \text{ح}^{\prime} = \frac{10\sqrt{3} \times 2}{5 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = 8 \text{ سم}$$

$$\therefore \text{ب}^{\prime} = 5 \text{ سم} \quad \angle = (\angle \text{ب}) = 120^\circ$$

$$\text{ب}^{\prime} = 5 \text{ سم} \quad \angle = (\angle \text{ب}) = 120^\circ$$

$$\text{ب}^{\prime} = 5 \text{ سم} \quad \angle = (\angle \text{ب}) = 120^\circ$$

$\therefore \angle$ ب منفرجه $\therefore \angle$ ح حادة

$$\frac{11.36}{120^\circ} = \frac{5}{\text{ح}^{\prime}} \therefore \frac{11.36}{120^\circ} = \frac{5}{\text{ح}^{\prime}}$$

$$\therefore \text{ح}^{\prime} = \frac{5 \times 120^\circ}{11.36} = 52.8^\circ$$

متمدى توجبه الرياضيات

(١٣)

إعداد م/ عادل إدوار

مثال ٦- : في المثلث $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 15^\circ$ سم ، $\angle B = 25^\circ$ سم ، $\angle C = 35^\circ$ سم
أثبت أن ج هي قياس أكبر زاوية في المثلث وأنها تحقق العلاقة :
جتا ج - $\sqrt{3} \sin 15^\circ$ ج ا ج + ٨ = صفر

الحل

أكبر زاوية هي $\angle C$ لأنها تقابل أكبر الأضلاع طولاً : $\angle C = 35^\circ$ سم

$$\frac{1}{4} = \frac{2(35) - 2(25) + 2(15)}{25 \times 15 \times 2} = \frac{\angle C - \angle B + \angle P}{\angle B \angle P} = \text{جتا ج} \therefore \angle C = 120^\circ$$

\therefore الطرف الأيمن = جتا $120^\circ = \sqrt{3} \sin 15^\circ$ ج ا ج + ٨ = صفر

$$\frac{1}{4} = \sqrt{3} \sin 15^\circ \times \sqrt{3} \sin 15^\circ = 8 + 7.5 - 0.5 = \text{صفر}$$

تمارين

- ١ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 13^\circ$ سم ، $\angle B = 14^\circ$ سم ، $\angle C = 15^\circ$ سم أوجد $\angle P$
- ٢ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 17^\circ$ سم ، $\angle B = 14^\circ$ سم ، $\angle C = 15^\circ$ سم أوجد قياس أصغر زواياه
- ٣ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 12^\circ$ سم ، $\angle B = 13^\circ$ سم ، $\angle C = 10^\circ$ سم أوجد $\angle P$ ثم
أحسب طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه لأقرب سم
- ٤ - \triangle س ص ع فيه $\angle S = 15^\circ$ سم ، $\angle V = 12^\circ$ سم ، $\angle C = 87^\circ$ أوجد $\angle C$ لأقرب سم
- ٥ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 10^\circ$ سم ، $\angle B = 16^\circ$ سم ، $\angle C = 60^\circ$ أوجد $\angle C$ لأقرب سم
ثم أحسب مساحة $(\triangle P ب ج)$ لأقرب سم
- ٦ - $\triangle P$ ب ج فيه جتا $P = \frac{2}{3}$ ، $\angle B = 16^\circ$ سم ، $\angle C = 12^\circ$ سم إثبت أنه متساوي الساقين
- ٧ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 1^\circ$: $\angle B = 3^\circ$: $\angle C = 1^\circ$ أوجد قياس أكبر زواياه
- ٨ - $\triangle P$ ب ج فيه $\angle P = 2^\circ$ جتا ج إثبت أن $\triangle P ب ج$ متساوي الساقين
- ٩ - \triangle س ص ع فيه $\angle S = 14^\circ$ سم ، $\angle V = 60^\circ$ سم ، مساحة $(\triangle س ص ع) = 3\sqrt{49}$ سم
أوجد محيط $\triangle س ص ع$ لأقرب سم
- ١٠ - \triangle س ص ع فيه $\angle S = 4^\circ$ سم ، $\angle V = 5^\circ$ سم ، $\angle C = 6^\circ$ سم أوجد طول العمود المرسوم من رأس
أكبر زاوية للمثلث علي الضلع المقابل لأقرب رقم عشري
- ١١ - \triangle س ص ع أوجد قياس أكبر زواياه إذا علم أن أطوال ارتفاعاته هي 12° سم ، 15° سم ، 20° سم

- ١٢ - Δ P ب د فيه ب د = ٢٠ سم ، $\angle (ب) = ٢٩^\circ$ ، $\angle (د) = ٣٧^\circ$ ، ϵ منتصف ب د
أوجد طول كلا من \overline{P} ، \overline{P} ، لأقرب رقم عشري
- ١٣ - Δ س ص ع فيه ϵ حاس = ٣ حاص = ٢ ح ع أوجد قياس أكبر زواياه
- ١٤ - Δ س ص ع فيه ق $\angle (ص) = ٦٠^\circ$ ، $\angle (ع) = ٢$ ' أوجد $\angle (س)$ ، $\angle (س)$
- ١٥ - Δ P ب د فيه ب' $\angle (د - 'P) + 'P$ ' أوجد $\angle (ب)$
- ١٦ - P ب د ع متوازي أضلاع فيه P د = ١٦ سم ، ب ع = ٢٠ سم ، $\angle (ب) = ٥٤^\circ$
حيث م نقطة تقاطع القطرين أوجد طول P ع لأقرب سم
- ١٧ - P ب د ع متوازي أضلاع فيه P ب = ١٦ سم ، ب ع = ٢٥ سم ، ب د = ١٨ سم أوجد
طول P د لأقرب رقم عشري ، $\angle (ب) = ١١$ سم أوجد
- ١٨ - P ب د ع متوازي أضلاع فيه P ب = ٨ سم ، ب ع = ٩ سم ، ب د = ١١ سم أوجد
طول P د لأقرب سم ، مساحة متوازي الأضلاع P ب د ع لأقرب سم
- ١٩ - P ب د ع شكل رباعي فيه P ب = ١٨ سم ، ب د = ١٠ سم ، ع د = ١٦ سم ،
 ϵ P = ١٨ سم ، P د = ٢٢ سم إثبت أن الشكل P ب ج د ع رباعي دائري
- ٢٠ - P ب د ع شكل رباعي فيه P ب = ٣ سم ، ب د = ٧ سم ، ع د = ٥ سم ، ب ع = ٨ سم
 P د = ٨ سم إثبت أن الشكل أ ب ج د ع رباعي دائري
- ٢١ - P ب د ع متوازي أضلاع فيه $\angle (ب) = ١٢٠^\circ$ ، محيطه = ١٦ سم ، طول القطر الأكبر
 ϵ = ٧ سم أوجد طول كلا من \overline{P} ، \overline{P} ، لأقرب سم
- ٢٢ - P ب د ع شكل رباعي فيه P ب = ٨ سم ، ب ع = ١٠ سم ، $\angle (ب) = ١٠$ سم ،
 $\angle (ب) = ٩٠^\circ$ ، $\angle (ب) = ٣٠^\circ$ أوجد طول P د لأقرب سم
- ٢٣ - P ب د ع شكل رباعي فيه P ب = ٨ سم ، ب ع = ١٠ سم ، $\angle (ب) = ١٠$ سم ،
 $\angle (ب) = ٦٥^\circ$ ، $\angle (ب) = ٥٠^\circ$ أوجد $\angle (ب)$
- ٢٤ - Δ س ص ع فيه ϵ منتصف س ص إثبت أن : $\angle (ع) + \angle (ص) = \angle (ع) + \angle (س) + \angle (ع) + \angle (س)$
- ٢٥ - P ب د ع متوازي أضلاع إثبت أن : $\angle (ب) + \angle (د) = \angle (ب) + \angle (د)$
- ٢٦ - P ب د فيه ϵ منتصف ب د ، $\angle (ب) = ٥$ سم ، $\angle (ب) = ٦$ سم ، ϵ P = ٤.٣ سم أوجد P لأقرب سم

حل المثلث

معنى حل المثلث : المثلث يتكون من ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا

المقصود بحل المثلث هو معرفة أطوال أضلاعه وقياس زواياه ويستلزم معرفة قياس ثلاث عناصر من عناصره الست بشرط أن يكون أحد هذه العناصر الثلاث هو طول أحد الأضلاع

الحالة الأولى : حل المثلث إذا علم فيه قياسا زاويتين وطول ضلع

يستخدم قانون الجيب فى حل المثلث متى علم قياسا زاويتين فيه وطول أحد أضلاعه

فمثلاً فى Δ ب ح إذا علم : \angle ب ، \angle ح ، حـ ب ،

فيمكن إيجاد \angle حـ ب حيث : \angle حـ ب = $180^\circ - [\angle$ ب + \angle ح]

ومن قانون الجيب $\frac{\text{حـ ب}}{\sin \angle$ حـ ب} = $\frac{\text{حـ ح}}{\sin \angle$ ح} = $\frac{\text{حـ ب}}{\sin \angle$ ب} لإيجاد كلا من : \angle ب ، \angle ح

$$\text{حيث : } \angle \text{ ب} = \frac{\sin \angle \text{ حـ ب} \times \text{حـ ح}}{\sin \angle \text{ ح}} \quad , \quad , \quad , \quad \angle \text{ ح} = \frac{\sin \angle \text{ حـ ب} \times \text{حـ ب}}{\sin \angle \text{ ب}}$$

مث ١-ال: حل Δ ب ح الذى فيه \angle ب = 45° ، \angle ح = 60° ، $\text{حـ ب} = 10$ سم

الحـ ل

$$\angle \text{ حـ ب} = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ \quad (1)$$

$$\therefore \frac{\text{حـ ح}}{\sin 60^\circ} = \frac{\text{حـ ب}}{\sin 75^\circ} = \frac{10}{\sin 45^\circ} \quad \therefore \frac{\text{حـ ح}}{\sin 60^\circ} = \frac{\text{حـ ب}}{\sin 75^\circ} = \frac{10}{\sin 45^\circ}$$

$$\therefore \angle \text{ ب} = \frac{\sin 75^\circ \times 10}{\sin 45^\circ} = 13.4 \text{ سم} \quad (2)$$

$$\angle \text{ ح} = \frac{\sin 75^\circ \times 10}{\sin 60^\circ} = 9 \text{ سم} \quad (3)$$

مث ٢-ال: حل Δ ب ح الذى فيه \angle ب = 20° ، \angle ح = 41° ، $\text{حـ ب} = 17$ ، $\text{حـ ح} = 5.61$ سم

الحـ ل

$$\angle \text{ حـ ب} = 180^\circ - (20^\circ + 41^\circ) = 119^\circ \quad (1)$$

$$\therefore \frac{\text{حـ ح}}{\sin 119^\circ} = \frac{\text{حـ ب}}{\sin 119^\circ} = \frac{5.61}{\sin 20^\circ} \quad \therefore \frac{\text{حـ ح}}{\sin 119^\circ} = \frac{\text{حـ ب}}{\sin 119^\circ} = \frac{5.61}{\sin 20^\circ}$$

منتدى توجبه الرياضيات

(١٦)

إعداد / عادل إدوار

$$(٢) \quad \therefore \text{ب} / = \frac{٥٩ / ١٧ \times ٥,٦٤١}{\text{جا } ٢٠ / ٤١} = ٧,٣١ \text{ سم}$$

$$(٣) \quad \therefore \text{ج} / = \frac{٧٩ / ٢٣ \times ٥,٦٤١}{\text{جا } ٢٠ / ٤١} = ٨,٣٥ \text{ سم}$$

مثال ٣ - حل Δ ل م ن فيه ، و (ل) = $٥٢ / ٣٨$ ، و (ن) = $١٧ / ٤٤$ ، م = $٣٥٢,٧$

الحل

$$(١) \quad \therefore \text{و} (م) = (ل) - (ن) = ١٨٠ - (٥٢ / ٣٨ + ١٧ / ٤٤) = ٩٦ / ٥١$$

$$\therefore \frac{\text{م}}{\text{جام}} = \frac{\text{ل}}{\text{حال}} = \frac{\text{ن}}{\text{حان}}$$

$$\therefore \frac{٣٥٢,٧}{\text{جا } ٩٦ / ٥١} = \frac{\text{ل}}{\text{جا } ٥٢ / ٣٨} = \frac{\text{ن}}{\text{جا } ١٧ / ٤٤}$$

$$(٢) \quad \therefore \text{ل} / = \frac{٣٥٢,٧ \times \text{جا } ٥٢ / ٣٨}{\text{جا } ٩٦ / ٥١} = ٢٢٢,٩$$

$$(٣) \quad \therefore \text{ن} / = \frac{٣٥٢,٧ \times \text{جا } ١٧ / ٤٤}{\text{جا } ٩٦ / ٥١} = ٢٤٨$$

تمارين

١ - حل Δ ب ح الذي فيه م = ١٦ سم ، و (ب) = ٥٥ ، و (ح) = ٨٠

٢ - حل Δ ب ح الذي فيه م = ١٠ سم ، و (ب) = ٦٢ ، و (ح) = ٤٨

٣ - حل Δ ب ح الذي فيه ب = ٢٣ سم ، ح = ٣٧ سم ، و (ب) = ٦٠

٤ - حل Δ ب ح الذي فيه م = ١٦ سم ، ب = ٢٥ سم ، و (ح) = $٣٠ / ١٠٤$

٥ - حل Δ ب ح الذي فيه ب = ح ، و (ب) = ٨٠ ، مساحة سطح الدائرة الخارجة عنه = ١٥٤ سم^٢

٦ - حل Δ ب ح الذي فيه م = ٤ سم ، و (ب) = ٢ ، و (ب) = ٦٠ ، ثم أوجد مساحته

الحالة الثانية : حل المثلث إذا علم فيه طولاً ضلعين وقياس الزاوية المحصورة بينهما

ليكن معلوم فى Δ ب د طولاً \angle ب ، \angle د ، \angle ح

لذلك نطبق قانون جيب التمام : \angle ح = \angle ب + \angle د - \angle ح

ومنه نوجد \angle ح : حيث : \angle ح = $\frac{\angle$ ب + \angle د - \angle ح}{٢}

ثم نوجد \angle ب : حيث : \angle ب = $[\angle$ ح + \angle د] - 180°

مث ١ - سال : حل Δ ب د الذى فيه \angle م = 13° سم ، \angle ب = 15° سم ، \angle ج = 87°

الحل

\angle ح = \angle ب + \angle د - \angle ح

$87^\circ = 13^\circ + 15^\circ - \angle$ ح

\angle ح = 374° $\therefore \angle$ ح = 374° سم

ب د ح = $\frac{\angle$ ب + \angle د - \angle ح}{٢} = $\frac{13^\circ + 15^\circ - 374^\circ}{٢} \approx 0.7315$

$\therefore \angle$ ح = 59° \angle م = 42°

\angle ب = $50^\circ = [59^\circ + 87^\circ] - 180^\circ$

مث ٢ - سال : حل Δ ب د الذى فيه \angle م = 80° ، \angle ب = 50° ، \angle ج = 60°

الحل

\angle ح = \angle ب + \angle د - \angle ح

$60^\circ = 80^\circ + 50^\circ - \angle$ ح

\angle ح = 4964° $\therefore \angle$ ح = 4964°

وبتطبيق قانون الجيب $\frac{\angle$ ب}{ج ب} = $\frac{\angle$ ج}{ب ج} $\therefore \frac{50^\circ}{ج ب} = \frac{60^\circ}{ب ج}$

$$\therefore \text{جاء } \frac{50 \times \text{جا } 60^\circ}{2} = \text{جاء } \frac{50 \times 0.866}{2} = 21.65$$

$$\therefore \text{جاء } \frac{50 \times \text{جا } 60^\circ}{2} = 21.65$$

$$\therefore \text{جاء } \frac{50 \times \text{جا } 60^\circ}{2} = 21.65$$

مثال ٣: حل Δ س ص ع الذى فيه س' = ١٦، ص' = ٢٥، ق' = ٣٠ = ١٠٤°

الحل

$$\text{ع' = س' + ص' - ٢ س' ص' حتا ع'}$$

$$= (16) + (25) - 2 \times 16 \times 25 \times \text{حتا } 30^\circ = 10.81, 32$$

$$\therefore \text{ع' = } 10.81, 32 = \text{ع' } \therefore 32, 88 = 10.81, 32 \text{ ع'}$$

$$\text{حتا س' = } \frac{\text{ص'}^2 - \text{ع'}^2 + \text{س'}^2}{2 \text{ ص' ع'}} = \frac{25^2 - 16^2 + 32^2}{2 \times 25 \times 32} \approx 0.8823$$

$$\therefore \text{جاء } \frac{16}{28} = (\text{س'})$$

$$\therefore \text{جاء } \frac{16}{28} = (\text{س'})$$

تمارين

١ - حل Δ ب ح الذى فيه م' = ٢٥ سم، ح' = ١٤, ٧ سم، ب' = ١, ٢ = (ب')

٢ - حل Δ ب ح الذى فيه م' = ٤٨, ٥ سم، ب' = ٤٦ سم، ح' = ٥, ٦ = (ب')

٣ - حل Δ ب ح الذى فيه ب' = ٣٦ سم، م' = ٣٠ سم، ب' = ١٠ = ٧٨°

ثم أوجد الإرتفاع المرسوم من ب على ح

٤ - حل Δ ب ح الذى فيه م' = ٢١ سم، ح' = ٤، ط' = ٧ = (ب')

٥ - حل Δ ب ح الذى فيه م' = ١٣ سم، ب' = ٦٠° ومحيطه ٣٥ سم

٦ - حل Δ ب ح الذى فيه م' = ١٣ سم، ب' = ٢٤°، طول قطر الدائرة المارة

برؤوسه يساوى ٨ سم

الحالة الثالثة : حل المثلث إذا علمت أطوال أضلاعه الثلاثة
في Δ ب ح إذا علم : \angle ب ، \angle ح ، \angle ح

$$\text{أولاً : نوجد } \angle \text{ ب } (\angle \text{ ب }) \text{ حيث : } \frac{\angle \text{ ب } - \angle \text{ ح } + \angle \text{ ح}}{\angle \text{ ب } \angle \text{ ح}} = \angle \text{ ب}$$

$$\text{ثانياً : نوجد } \angle \text{ ح } (\angle \text{ ح }) \text{ حيث : } \frac{\angle \text{ ح } - \angle \text{ ب } + \angle \text{ ب}}{\angle \text{ ح } \angle \text{ ب}} = \angle \text{ ح}$$

$$\text{ثالثاً : نوجد } \angle \text{ ح } (\angle \text{ ح }) \text{ حيث : } \angle \text{ ح } = 180^\circ - [\angle \text{ ب } + \angle \text{ ب }]$$

مثال ١ : حل Δ ب ح الذي فيه $\angle \text{ ب } = 5^\circ$ سم ، $\angle \text{ ح } = 11^\circ$ سم ، $\angle \text{ ح } = 11^\circ$ سم

الحل

$$\text{حساب } \angle \text{ ب } (\angle \text{ ب }) \text{ : } \frac{5^\circ - 11^\circ + 11^\circ}{11 \times 11 \times 2} = \frac{\angle \text{ ب } - \angle \text{ ح } + \angle \text{ ح}}{\angle \text{ ب } \angle \text{ ح}} = \angle \text{ ب}$$

$$\text{حساب } \angle \text{ ح } (\angle \text{ ح }) \text{ : } \frac{11^\circ - 5^\circ + 5^\circ}{11 \times 5 \times 2} = \frac{\angle \text{ ح } - \angle \text{ ب } + \angle \text{ ب}}{\angle \text{ ح } \angle \text{ ب}} = \angle \text{ ح}$$

$$\angle \text{ ح } = 180^\circ - [5^\circ + 11^\circ] = 164^\circ$$

مثال ٢ : حل Δ ب ح الذي فيه $\angle \text{ ب } = 8^\circ$ سم ، $\angle \text{ ح } = 5^\circ$ سم ، $\angle \text{ ح } = 7^\circ$ سم

الحل

$$\text{حساب } \angle \text{ ب } (\angle \text{ ب }) \text{ : } \frac{5^\circ - 8^\circ + 7^\circ}{8 \times 7 \times 2} = \frac{\angle \text{ ب } - \angle \text{ ح } + \angle \text{ ح}}{\angle \text{ ب } \angle \text{ ح}} = \angle \text{ ب}$$

$$\text{حساب } \angle \text{ ح } (\angle \text{ ح }) \text{ : } \frac{7^\circ - 5^\circ + 8^\circ}{5 \times 8 \times 2} = \frac{\angle \text{ ح } - \angle \text{ ب } + \angle \text{ ب}}{\angle \text{ ح } \angle \text{ ب}} = \angle \text{ ح}$$

$$\angle \text{ ح } = 180^\circ - [5^\circ + 8^\circ] = 167^\circ$$

تمارين

- ١ - حل Δ ب ح الذي فيه $\angle م = ٨$ سم ، $\angle ب = ٥$ سم ، $\angle ح = ٧$ سم
- ٢ - حل Δ ب ح الذي فيه $\angle م = ٦$ سم ، $\angle ب = ٩$ سم ، $\angle ح = ٥$ سم
- ٣ - حل Δ ب ح الذي فيه $\angle م : \angle ب : \angle ح = ٤ : ٥ : ٧$ ومحيطه ٤٨ سم

الحالة الرابعة : حل المثلث إذا علم فيه طولاً ضلعين وقياس الزاوية المقابلة لإحدهما (الحالة المبهمة)

فى Δ ب ح إذا علم $\angle م$ ، $\angle ب$ ، $\angle ح$ نوجد قيمة $\angle ب = \angle ح$ و نلاحظ

أولاً : إذا كانت $\angle م$ حادة وكان		ثانياً : إذا كانت $\angle م$ قائمة أو منفرجة وكان	
١	إذا كان : $\angle م > \angle ب$ فإنه لا يمكن رسم مثلث	٢	إذا كان : $\angle م = \angle ب$ فإنه يمكن رسم مثلث وحيد قائم الزاوية
٣	إذا كان : $\angle م > \angle ب$ فإنه يمكن رسم مثلثان	٤	إذا كان : $\angle م \leq \angle ب$ فإنه يمكن رسم مثلث وحيد
١	إذا كان : $\angle م \geq \angle ب$ فإنه لا يمكن رسم مثلث	٢	إذا كان : $\angle م < \angle ب$ فإنه يمكن رسم مثلث وحيد

مثال : حل Δ ب ح الذي فيه $\angle م = ٧$ سم ، $\angle ب = ٤$ سم ، $\angle ح = ١١٢$ °

الحل

$\angle م$ منفرجة $\angle م > \angle ب$ ، $\angle م < \angle ب$: يوجد للمثلث حل وحيد

وبتطبيق قانون الجيب $\frac{\angle م}{\sin م} = \frac{\angle ب}{\sin ب} = \frac{\angle ح}{\sin ح}$

$\therefore \angle ب = \frac{\angle م \times \sin ب}{\sin م} = \frac{١١٢ \times \sin ٤}{\sin ٧}$

$\therefore \angle ب = ٣٢$ ° (١)

$\therefore \angle ح = ١٨٠ - [٣٢ + ١١٢] = ٣٦$ ° (٢)

$\therefore \angle ح = \frac{\angle م \times \sin ح}{\sin م} = \frac{٧ \times \sin ٣٦}{\sin ١١٢}$

$\therefore \angle ح = ٤,٤٤$ سم (٣)

إعداد / عادل إدوار

(٢١)

مذكره توجييه الرياضيات

مثلهـال : حل Δ م ب ج الذى فيه م = ٥ سم ، ب = ٧ سم ، $\angle م = ٦٠^\circ$
الحـل

$$\angle م = ٦٠^\circ \text{ (حاده) } , \quad ع = ب \times جام = ٧ \times ٦.١ \simeq ٦.١$$

$$\therefore م > ع \quad \therefore \text{لا يوجد حل للمثلث}$$

مثلهـال : حل Δ م ب ج الذى فيه م = $\sqrt{٣}$ ، ب = ٦ ، $\angle م = ٦٠^\circ$
الحـل

$$\angle م = ٦٠^\circ \text{ (حاده) } , \quad ع = م \times جاب = \sqrt{٣} \times ٦.١ = ٦.١$$

$\therefore ع = ب$ يوجد حل للمثلث وحيد قائم الزاوية

وبتطبيق قانون الجيب $\frac{ج}{\sin م} = \frac{ب}{\sin ج} = \frac{م}{\sin ب}$

$$\therefore جام = \frac{\sqrt{٣} \times ٦.١}{٦} = ١.٥ \quad \therefore \angle م = ٩٠^\circ \text{ (١)}$$

$$\therefore \angle ج = ١٨٠^\circ - [٩٠^\circ + ٦٠^\circ] = ٣٠^\circ \text{ (٢)}$$

$$\therefore \frac{ج}{\sin ٣٠^\circ} = \frac{٦}{\sin ٦٠^\circ} \quad \therefore ج = \frac{٦ \times \sin ٣٠^\circ}{\sin ٦٠^\circ} = ٣.٥ \text{ سم (٣)}$$

تمارين

(١) حل Δ م ب ج الذى فيه م = ١٢ سم ، ب = ١٥ ، $\angle م = ١٠٠^\circ$

(٢) حل Δ م ب ج الذى فيه م = ١٠ سم ، ب = ٩ ، $\angle م = ٥٧^\circ$

(٣) حل Δ س ص ع الذى فيه س = ٢١ سم ، ص = ٢٦ ، $\angle س = ٥٢^\circ$

(٤) حل Δ م ب ج الذى فيه م = ٦ سم ، ب = ٨ ، $\angle م = ٤٧^\circ$

(٥) حل Δ ل م ن الذى فيه ل = ١٠ سم ، م = ١٨ ، $\angle ل = ٣٥^\circ$